

## AFAtinib (a-FA-ti-nib)

*Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.*

**Autre nom(s):** Giotrif®

**Présentation:** Comprimés dans plusieurs concentrations et couleurs

### Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de cancer du poumon qui s'est disséminé dans d'autres parties du corps.

### Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement:
  - ◊ des troubles de foie, de reins, de cœur, de peau,
  - ◊ autres troubles accompagnés de diarrhée (tels que la maladie de Crohn ou les colites),
  - ◊ ou si vous avez des allergies.
- Ce médicament contient une petite quantité de lactose. Si vous ne pouvez pas tolérer du lactose, parlez à votre médecin ou pharmacien.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

### Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.

- S'il y a **des risques** que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez:
  - ▶ **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément pendant la prise de ce médicament.** Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **2 semaines** après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement à l'aide de ce médicament et pendant **deux semaines** après la fin du traitement.
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

## Comment ce médicament est-il donné?

- Prenez ce médicament une fois par jour sur un estomac vide, au moins 1 heure avant ou 3 heures après la nourriture ou les autres médicaments.
- Si vous vomissez après avoir pris la dose, ne prenez pas une autre dose pour remplacer la dose perdue; prenez simplement votre prochaine dose à l'heure prévue.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la immédiatement s'il s'est écoulé moins de 8 heures depuis la dose manquée, autrement sautez cette dose et prenez votre dose suivante comme prévu. Ne doublez pas la dose pour rattraper la dose oubliée.

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Pour les douleurs légères:
  - ◊ Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
  - ◊ L'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), le naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie.
  - ◊ Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
  - ◊ Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre.
  - ◊ **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.

- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

## Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison aucun médicament non utilisé. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

## Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Diarrhées (peuvent être graves)</b></p> <p>Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement.</p> <p><b>Si vous avez des diarrhées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments contre les diarrhées comme votre équipe de soins de santé vous en a prescrit.</li> <li>• Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. gomme à mâcher, boissons « diète », lactose, café et alcool).</li> <li>• Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas.</li> <li>• Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Diarrhées</a> pour en savoir davantage.*</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Ulcération de la bouche (peuvent être graves)</b></p> <p>Vous pourrez présenter des ulcérations rondes, douloureuses, blanches ou grises à l'intérieur de la bouche. Elles peuvent apparaître sur la langue, les lèvres, les gencives ou à l'intérieur de vos joues. Dans les cas les plus graves, elles peuvent entraîner des difficultés à avaler, à manger ou à se brosser les dents. Elles persistent généralement une ou deux semaines.</p> <p><b>Pour prévenir les ulcérations de la bouche :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez soin de votre bouche en vous brossant les dents délicatement et en utilisant de la soie dentaire.</li> <li>• Rincez-vous souvent la bouche. N'utilisez pas un rince-bouche comportant de l'alcool.</li> <li>• Essayez plutôt un rince-bouche maison</li> <li>• Mélangez 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1 cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 L) d'eau.</li> </ul> <p><b>Si vous avez des ulcérations dans la bouche :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous constatez l'apparition d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, ou si vous avez des douleurs quand vous avalez.</li> <li>• Évitez les aliments chauds, épicés, acides, résistants ou croquants. Votre médecin pourra vous prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcérations et prévenir les infections.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Soins de la bouche</a> pour en savoir davantage.*</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible</p>
<p><b>Éruptions cutanées, assèchement de la peau, démangeaisons cutanées</b></p> <p>Les éruptions cutanées peuvent être graves et, dans de rares cas, entraîner la présence de cloques sur la peau ou une desquamation. Si cet effet apparaît, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence.</p> <p><b>Pour prévenir et traiter l'assèchement de la peau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez un produit hydratant pour la peau.</li> <li>• Protégez votre peau contre le soleil et le froid</li> <li>• Appliquez un écran solaire offrant une protection contre les UVA et les UVB et un FPS d'au moins 30.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Modification de l'apparence des ongles (peuvent être graves)</b></p> <p>Vous pourrez présenter une modification de la couleur de vos ongles, des douleurs ou une sensibilité dans le lit de vos ongles, un gonflement des cuticules ou un déchaussement des ongles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'apparence de vos ongles redeviendra lentement normale après la fin du traitement.</li> <li>• Utilisez un agent hydratant pour vos ongles et vos cuticules.</li> <li>• Évitez le poli à ongles et les ongles artificiels jusqu'à ce que vos ongles aient repris une apparence normale.</li> <li>• Quand vous faites des corvées domestiques ou du jardinage, portez des gants.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Manque d'appétit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pourrez ne pas avoir envie de manger ou perdre du poids.</li> <li>• Essayez de manger les aliments que vous aimez et de prendre de petits repas pendant toute la journée.</li> <li>• Vous devrez peut-être prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids corporel.</li> <li>• Si vous manquez d'appétit, parlez-en à votre équipe de soins de santé.</li> <li>• Voir également la fiche <a href="#">Manque d'appétit</a> pour en savoir davantage.*</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p><b>Nausées et vomissements</b></p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement. Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter lorsqu'elles surviennent.</p> <p><b>Si vous avez des nausées ou des vomissements :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous.</li> <li>• Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur.</li> <li>• Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé.</li> </ul> <p>Voir également la fiche <a href="#">Nausées et vomissements</a> pour en savoir davantage.*</p>	

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Toux, essoufflement, saignements de nez</b></p> <p>Vous pourrez présenter une toux et vous sentir essoufflé sans aucun signe d'infection, par exemple des maux de gorge ou une congestion nasale.</p> <p><b>Dans de rares cas, ces effets secondaires peuvent être graves et s'accompagner de douleurs thoraciques, de difficulté à respirer ou de crachats de sang. Si cela se produit, demandez immédiatement des soins médicaux d'urgence.</b></p>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p><b>Difficulté à dormir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cet effet secondaire peut être provoqué par l'un de vos médicaments et il peut s'amenuiser quand votre organisme sera habitué au médicament ou à la fin de votre traitement.</li> <li>• Si cet effet vous incommode, parlez-en à votre médecin.</li> </ul>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p><b>Maux de tête, douleurs légères dans les articulations, douleurs ou crampes musculaires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin.</li> <li>• Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (TylenolMD), contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous.</li> <li>• Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (AdvilMD, MotrinMD), du naproxène (AleveMD) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.</li> <li>• Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers.</li> </ul>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Fièvre, frissons, infection</b></p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU</b></li> <li>• <b>38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure</b></li> </ul> <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons).</li> <li>• Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre.</li> <li>• Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température.</li> <li>• Lavez-vous souvent les mains.</li> <li>• Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie, procédure médicale ou avant d’aller chez le dentiste.</li> </ul> <p><b>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre.</b> Pour plus d'informations, consultez la fiche «<a href="#">Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs)</a> »*</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Amincissement ou perte des cheveux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servez-vous d'une brosse douce et évitez les fixatifs, les décolorants, les teintures et les permanentes.</li> <li>• Dans la plupart des cas, vos cheveux repousseront après le traitement, mais leur texture ou leur couleur peut changer.</li> </ul>	
<p><b>Constipation</b></p> <p><b>Pour prévenir la constipation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buvez beaucoup de liquides et maintenez une bonne alimentation. Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire.</li> <li>• Soyez actif. Des exercices périodiques peuvent vous garder en forme.</li> <li>• Essayez de consommer davantage de fibres (p. ex. fruits avec pelure, légumes verts et céréales entières). Si vous prenez des médicaments opiacés, demandez à votre équipe de soin de santé si vous devez consommer davantage de fibres.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Pour traiter la constipation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous n'avez pas eu de selles depuis deux ou trois jours, vous devrez peut-être prendre un laxatif. Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous pouvez faire.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Constipation</a> pour en savoir davantage.*</p>	
<p><b>Anomalie des épreuves du foie faites en laboratoire (peuvent être graves)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Parlez-en alors à votre équipe de soins de santé.</li> <li>• Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine.</li> </ul>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p><b>Déséquilibre en sel</b></p> <p>Cet effet peut provoquer des contractions musculaires, un état de faiblesse grave, des crampes, des épisodes de confusion et une irrégularité des pulsations cardiaques.</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p><b>Troubles de la vue (peuvent être graves)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pourrez avoir les yeux secs ou rouges, présenter une irritation, des douleurs, un larmoiement, une sensibilité à la lumière ou avoir la vue embrouillée.</li> <li>• Évitez de porter des verres de contact.</li> <li>• Vous pouvez essayer des larmes artificielles ou un onguent.</li> </ul>	Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible
<p><b>Étourdissements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pourrez vous sentir la tête légère.</li> <li>• En cas d'étourdissements, étendez-vous.</li> <li>• Relevez-vous et déplacez-vous lentement quand vous vous sentirez mieux.</li> <li>• Vous ne devez pas conduire un véhicule moteur ni utiliser de la machinerie si vous vous sentez étourdi.</li> </ul>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave



**D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:**

- signes de troubles rénaux tels que des douleurs lombaires, des enflures, une envie d'uriner moins fréquente et une prise de poids anormale;
- douleurs thoraciques, évanouissements ou enflure de vos jambes, de vos chevilles et de votre ventre;
- enflure et durcissement de la veine d'un bras ou d'une jambe;
- douleur abdominale intense qui rayonne dans le dos;
- paume des mains ou plante des pieds : douleurs, rougeurs, amincissement cutané, picotements, engourdissement et peau qui pèle.

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*