

Fiche d'information sur les médicaments

aflibercept (a-FLIB-er-sept)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Zaltrap™

Présentation: solution

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de cancer colorectal en combinaison avec une chimiothérapie.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement:
 - ◊ des problèmes de cœur, du foie ou des reins,
 - ◊ l'hypertension artérielle,
 - ◊ le diabète,
 - ◊ ou une prédisposition à l'hémorragie ou la diarrhée,
 - ◊ si vous allez avoir ou avez subi une chirurgie récente,
 - ◊ ou si vous avez des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/informed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.

April 2017

votre partenaire devez:

- ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement à l'aide de ce médicament.
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine.
- Votre médecin peut vous conseiller de prendre le lopéramide (ImodiumTM) pour diarrhée tardive causée par le chimiothérapie. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir une réserve de lopéramide disponibles, car la diarrhée doit être traitée dès que possible.
- Votre équipe de soins de santé peut vous demander de suivre les instructions pour le lopéramide (ImodiumTM):

Pour diarrhée tardive (plus de 24 heures après votre dose de chimiothérapie), au premier signe de selles molles ou lorsque les selles sont plus fréquentes que d'habitude, prenez 2 comprimés (4 mg) immédiatement, puis prenez 1 comprimé (2 mg) toutes les 2 heures.

Pendant la nuit, vous pouvez prendre 2 comprimés (4 mg) toutes les 4 heures. Continuez de prendre le lopéramide jusqu'à ce que votre diarrhée ait arrêté pendant 12 heures

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Pour les douleurs légères:
 - ◊ Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - ◊ L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie.
 - ◊ Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/informed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.

April 2017

- médicaments.
 - Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre.
 - **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Certains des effets secondaires peuvent être reliés à la chimiothérapie étant donné qu'ils ont été constatés chez des personnes qui prenaient du/de la/d' aflibercept avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques.

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)	
<p>Diarrhées (peuvent être graves)</p> <p>Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement.</p> <p>Si vous avez des diarrhées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit. ● Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. gomme à mâcher, boissons « diète », café et alcool). ● Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas. ● Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale. <p>Voir la fiche Diarrhées pour en savoir davantage.*</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Protéines dans l'urine</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Portez attention à un gonflement inhabituel de votre corps ou à un gain de 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)	
<p>poids rapide et inhabituel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la présence de protéines dans votre urine. 	d'amélioration ou grave
<p>Anomalie des épreuves du foie faites en laboratoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Parlez-en alors à votre équipe de soins de santé. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Nausées et vomissements</p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement. Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter lorsqu'elles surviennent.</p> <p>Pour prévenir les nausées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool. <p>Si vous avez des nausées ou des vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé. <p>Voir également la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.*</p>	Veuillez communiquer avec votre équipe de soin de santé si les nausées durent plus de 48 heures ou si vous vomissez plus de 24 heures.
<p>Ulcération de la bouche</p> <p>Vous pourrez présenter des ulcérations rondes, douloureuses, blanches ou grises à l'intérieur de la bouche. Elles peuvent apparaître sur la langue, les lèvres, les gencives ou à l'intérieur de vos joues. Dans les cas les plus graves, elles peuvent entraîner des difficultés à avaler, à manger ou à se brosser les dents. Elles persistent généralement une ou deux semaines.</p> <p>Pour prévenir les ulcérations de la bouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez soin de votre bouche en vous brossant les dents délicatement et en utilisant de la soie dentaire. 	Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)	
<ul style="list-style-type: none"> • Rincez-vous souvent la bouche. N'utilisez pas un rince-bouche comportant de l'alcool. • Essayez plutôt un rince-bouche maison • Mélangez 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1 cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 L) d'eau. <p>Si vous avez des ulcérations dans la bouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous constatez l'apparition d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, ou si vous avez des douleurs quand vous avalez. • Évitez les aliments chauds, épicés, acides, résistants ou croquants. Votre médecin pourra vous prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcérations et prévenir les infections. <p>Voir la fiche Soins de la bouche pour en savoir davantage.*</p>	

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux. • Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage). • Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué. <p>Voir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.*</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Tension artérielle élevée (peuvent être graves)</p>	<p>Contactez votre équipe de soins</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez périodiquement votre tension artérielle. Votre médecin pourra vous prescrire un médicament pour traiter l'hypertension artérielle. • Si vous avez des maux de tête graves, des étourdissements graves ou si vous perdez connaissance, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence étant donné qu'il peut s'agir d'un signe que votre tension artérielle est trop élevée ou trop faible. 	de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Saignements ou bleus inhabituels (peuvent être graves)</p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p>Fièvre, frissons, infection</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie, procédure médicale ou avant d'aller chez le dentiste. <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche « Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) »</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Manque d'appétit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez ne pas avoir envie de manger ou perdre du poids. • Essayez de manger les aliments que vous aimez et de prendre de petits repas pendant toute la journée. • Vous devrez peut-être prendre des suppléments alimentaires pour 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
<p>maintenir votre poids corporel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous manquez d'appétit, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Voir également la fiche Manque d'appétit pour en savoir davantage.* 	
<p>Douleurs ou crampes dans l'abdomen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous souffrez de constipation ou de diarrhées, elles peuvent provoquer des douleurs dans votre abdomen. • Si la douleur est grave et si elle s'accroît ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les autres causes possibles. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)	
<p>Maux de tête, douleurs légères dans les articulations, douleurs ou crampes musculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (TylenolMD), contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous. • Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (AdvilMD, MotrinMD), du naproxène (AleveMD) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Syndrome de gonflement douloureux des mains et des pieds</p> <p>Vous pourrez présenter des douleurs, un amincissement, une coloration rouge, des picotements, une insensibilisation et une desquamation de la peau de vos paumes et de la plante de vos pieds.</p> <p>Ces effets peuvent apparaître quelques jours ou quelques semaines après l'administration d'une dose, ou après le début du traitement.</p> <p>Pour aider à prévenir le syndrome de gonflement douloureux des mains et des pieds :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les activités qui provoquent des frottements, une pression ou une 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)	
<p>exposition à la chaleur de vos mains et vos pieds (p. ex. saisir des outils, se frotter vigoureusement les mains et prendre des bains chauds).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquez souvent un agent hydratant sur vos mains et vos pieds, plus particulièrement dans les replis de la peau. • Portez des vêtements et des chaussures amples et confortables. Reposez-vous et évitez de rester longtemps debout. <p>Voir également la fiche Syndrome de gonflement douloureux des mains et des pieds pour en savoir davantage.*</p>	

D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:

- Signes d'une allergie tels que la fièvre, une éruption cutanée, des démangeaisons, des rougeurs sur le visage et le cou, l'étourdissement, l'essoufflement, une sensation d'oppression thoracique ou de serrement dans la gorge;
- Douleurs intenses et soudaines dans la poitrine, dans le ventre ou les bras;
- Enflure au niveau des jambes, des chevilles ou du ventre;
- Bras ou jambes : douleurs, enflure et durcissement de la veine;
- Douleurs thoraciques, difficulté à respirer ou toux accompagnée de sang;
- Douleur abdominale vive et soudaine;
- Maux de tête intenses, évanouissement, crises épileptiques, confusion mentale, perte de la vue ou difficulté à parler ou se mouvoir;
- Signes de troubles rénaux tels que des douleurs lombaires, des enflures des membres, urines peu abondantes voire inexistantes, et une prise de poids anormale récente;
- Mauvaise cicatrisation des plaies;
- Douleurs dentaires, buccales ou aux mâchoires et enflures.

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.

