

Fiche d'information sur les médicaments

azaCITIDine (a-za-ci-ti-di-ne)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Vidaza (MD)

Présentation: Suspension blanche laiteuse pour injection

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de certaines formes de troubles sanguins, par exemple les syndromes myélodysplasiques (SMD) ou leucémie myéloïde aiguë (LMA).

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement des troubles cardiaques (par exemple une anomalie du rythme cardiaque), des troubles du rein, du foie, des poumons ou si vous avez des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque élevé d'apparition d'autres formes de cancer (généralement quelques années plus tard) ou de caillots sanguins. Certains médicaments administrés contre le cancer peuvent accroître ces risques, surtout s'ils sont administrés pendant une période prolongée. Vous devriez discuter avec votre médecin de vos préoccupations à propos de ce médicament.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- azaCITIDine peut être nocif pour le fœtus; vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte.
- Vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes enceinte. S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même et votre partenaire devez : ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **6 mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement à l'aide de ce médicament.
- Effets sur la fertilité: Probable

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté sous la peau.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Pour les douleurs légères :
 - ◊ Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - ◊ Avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), parlez-en à votre équipe de soins de santé étant donné que ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.
 - ◊ Si vous prenez régulièrement de l'aspirine, par exemple en raison d'un trouble cardiaque, vous ne devez pas cesser de le faire sans en parler tout d'abord à votre équipe de soins de santé.
 - ◊ Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre. **Téléphonez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires fréquents se produisent généralement plus de 1 sur chaque 10 patients. D'autres effets secondaires sont moins fréquents, mais peuvent être graves. Vous ne pouvez pas avoir pas tous les effets secondaires ci-dessous. Vous pouvez avoir des effets secondaires qui ne sont pas répertoriés.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p><i>Nausées et vomissements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez des liquides clairs et éviter les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Prenez des antinauséeux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre médecin. • Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.* 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><i>Saignements ou bleus inhabituels</i></p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p><i>Fièvre, frissons, infection</i></p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie ou avant d'aller chez le dentiste. <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche «Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) ».</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p>Constipation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adopter une alimentation équilibrée avec des fibres comme des grains entiers, des fruits et des légumes crus. • Boire beaucoup de liquides et essayer l'exercice léger régulièrement. • Consulter votre médecin si vous n'avez pas été à la selle depuis 3 jours ou plus. • Voir aussi le dépliant sur la Constipation.* 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Réactions au site d'injection (rougeurs, démangeaisons, bleus, légères éruptions cutanées ou enflure)</p>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Diarrhée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boire beaucoup de liquides clairs. Éviter les aliments chauds, piquants et frits, les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine et le jus d'orange et de prunes. • Adopter une alimentation faible en fibres (bananes, riz blanc, compote de pommes, rôties faites de pain blanc). • Prendre des médicaments contre la diarrhée si votre médecin vous en donne. • Voir aussi le dépliant sur la diarrhée.* 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se reposer souvent, faire une sieste au besoin. Se déplacer lentement au lever. • Manger des repas équilibrés et boire beaucoup de liquides. L'exercice léger peut aider. • Ne pas conduire un véhicule motorisé ni opérer de machinerie lourde si vous vous sentez fatigué. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Mal de tête, douleur légère aux articulations et musculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin, en suivant ses instructions. • Autrement, prenez de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) au besoin pour les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou pharmacien quelle est la dose appropriée dans votre cas. • Reposez-vous souvent, mais de l'exercice léger est possible. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p><i>Pertes d'appétit, aucun goût pour la nourriture, perte de poids</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangez des aliments que vous appréciez et tenter de prendre régulièrement de petits repas. • Utilisez des suppléments dans la mesure du possible. Consultez un diététiste. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p><i>Étourdissements, sensation ébrieuse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne conduisez pas de véhicule motorisé et n'opérez pas de machinerie lourde si vous êtes étourdi. • Tentez de vous lever et de bouger lentement. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p><i>Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez le soleil; appliquez une crème solaire, portez un chapeau et couvrez la peau exposée. • Utilisez un hydratant tous les jours. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
<p><i>Réaction allergique</i> (importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge; peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><i>Anomalies des épreuves du foie faites en laboratoire</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin contrôlera périodiquement ces examens. Si votre peau ou vos yeux présentent une coloration jaunâtre ou si la couleur de votre urine devient foncée, communiquez avec votre médecin. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p><i>Rupture de l'estomac ou de la paroi intestinale</i> (Douleur soudaine et intense au ventre ou à proximité de l'estomac)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><i>Problèmes cardiaques</i> (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure, essoufflement)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/infomed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.
 April 2016

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
Problèmes du pancréas (douleur accrue au centre du ventre qui peut irradier au dos, perte d'appétit ou de poids)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Problèmes pulmonaires (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Problèmes de reins (douleur au bas du dos, enflure du corps, d'une miction faible ou de l'absence d'urine, ou d'un gain de poids récent inhabituel)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Convulsions	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Le fait de tuer des cellules cancéreuses rapidement au commencement du traitement peut mener à une accumulation de déchets cellulaires <ul style="list-style-type: none"> • Si elle est légère, elle peut causer la goutte, avec des douleurs articulaires, mais si elle est marquée, elle peut causer de la fièvre, une insuffisance rénale et de la confusion, et être potentiellement mortelle. • Vous DEVEZ prendre les médicaments prescrits à titre préventif par votre médecin ET • Boire beaucoup de liquides (6 à 8 verres par jour) et uriner fréquemment. 	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Un caillot sanguin (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/infomed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.

April 2016

