

Fiche d'information sur les médicaments

étoposide (é-TOE-po-side)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Marque(s) générique(s) disponible(s), Vepesid®

Présentation: Solution injectable transparente ou jaune pâle qui peut être mélangée dans de plus grands sacs de liquide

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement du cancer du poumon, des testicules, les lymphomes et d'autres formes de cancer.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Si vous avez des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez ou avez déjà eu des infections, la maladie du rein ou de foie, le traitement de radiation, ou n'importe quelles allergies, dites-le à votre médecin.
- Etoposide peut être nocif pour le fœtus.
- Si vous allaitez, si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez devenir enceinte, dites-le à votre médecin.
- Les patients atteints d'un cancer sont exposés à des risques plus élevés de développer d'autres cancers/leucémies. De plus, certains médicaments, comme etoposide, contre le cancer peuvent accroître ces risques. Vous devriez en parler avec votre médecin.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- Vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes enceinte. S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même et votre partenaire devez: ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, distes-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement avec ce médicament.
- Effets sur la fertilité: Probable

Comment ce médicament est-il donné?

- L'étoposide pour injection est administrée par injection dans une veine.
- Prenez les capsules orales exactement comme instruit par votre docteur. Assurez-vous que vous comprenez les instructions.
- Avalez les capsules avec un verre d'eau sur un estomac vide, une heure avant ou deux heures après la nourriture ou d'autres médicaments.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Évitez de consommer des pamplemousses, grenades, caramboles, oranges de Seville ou des jus et produits dérivés pendant votre traitement. Ils pourraient interagir avec l'étoposide.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Capsules (orales) :
- Conservez ce médicament à la température ambiante, dans son emballage original, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Conservez ce médicament au réfrigérateur. Ne pas le congeler. Conservez-le hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous souffrez d'effets secondaires dérangeants et inhabituels, discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<i>Amincissement ou perte des cheveux</i> • Utilisez une brosse souple et douce; éviter les fixatifs, les décolorants, les teintures et les permanentes. • Vos cheveux repousseront habituellement après la fin du traitement, mais la texture ou la couleur pourrait changer.	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<i>Perte de poids</i> • Mangez des aliments que vous appréciez et tenter de prendre régulièrement de petits repas régulièrement. • Utilisez des suppléments dans la mesure du possible. Consultez un diététiste.	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<i>Diarrhée</i> • Peut survenir quelques jours à quelques semaines après la dose administrée ou après le début du traitement • Buvez beaucoup de liquides clairs. Éviter les aliments chauds, piquants et frits, les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine et le jus d'orange et de prunes. • Adoptez une alimentation faible en fibres (bananes, riz blanc, compote de pommes, rôties faites de pain blanc). • Prenez des médicaments contre la diarrhée si votre médecin vous en donne. • Voyez aussi le dépliant sur la diarrhée.*	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Fièvre, frissons, infection Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est : • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie : • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température.	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
• Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie ou avant d'aller chez le dentiste. Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche «Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) ».	
Nausées et vomissements • Peuvent survenir quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement. • Buvez des liquides clairs et éviter les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Prenez des antinauséeux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Communiquez avec votre médecin si les nausées durent plus d'une journée ou s'il y a des vomissements. • Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.*	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Saignements ou bleus inhabituels (selles noires, crachement de sang, points mauves ou rouges sur la peau, saignements qui ne cessent pas) • Peuvent survenir des jours à des semaines après votre dose ou le début de votre traitement • Peuvent être attribuables à un faible nombre de plaquettes dans le sang, mais peuvent survenir même si cette dernière est normale • Utilisez une brosse à dents à soies douces. Pendant le brossage, faites attention aux coupures ou aux lésions. • Consultez votre médecin avant toute opération ou toute visite chez le médecin. • Utilisez de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) pour réduire la fièvre, les maux de tête légers et la douleur. • Parlez à votre médecin d'abord avant de commencer à utiliser d'autres médicaments comme l'ibuprofène (Advil^{MD}) ou le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine, puisqu'ils peuvent augmenter le risque de saignement. Si vous prenez de l'aspirine régulièrement, parlez à votre médecin avant de cesser de la prendre. • Voyez aussi le dépliant sur la faible numération plaquettaire.*	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
Problèmes de foie (jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Réaction allergique (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge) • Peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament.	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Faible tension artérielle, étourdissements • Tentez de vous lever et de bouger lentement. • Ne conduisez pas de véhicule motorisé et n'opérez pas de machinerie lourde si vous êtes étourdi.	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Les effets du système nerveux central (CNS), y compris la cécité	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Problèmes pulmonaires (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Rougeurs ou éruptions cutanées à l'endroit où vous avez déjà reçu une radiation	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Importantes éruptions cutanées (peuvent comprendre des ampoules ou l'exfoliation)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information

présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.