

Fiche d'information sur les médicaments

apalutamide

 (a-pa-lu-ta-mide)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Erleada^{MD}

Présentation: Comprimé

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement du cancer de la prostate

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Informez votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez déjà eu des problèmes de santé importants, en particulier :
 - ◊ de l'hypertension artérielle ou une glycémie élevée
 - ◊ des taux élevés de matière grasse ou de cholestérol dans le sang
 - ◊ des problèmes cardiaques ou un rythme cardiaque irrégulier
 - ◊ des risques de chutes ou de fractures osseuses
 - ◊ de l'hypothyroïdie
 - ◊ des convulsions, un traumatisme crânien, un AVC ou des tumeurs au cerveau (cancéreuses ou non cancéreuses)
 - ◊ des allergies

N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Parlez à votre équipe de soins de santé des sujets suivants :

- De la façon dont ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Des symptômes tels que les bouffées de chaleur.
- De la façon dont ce médicament pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, le cas échéant.

Ce médicament peut être nocif pour un fœtus. Informez votre équipe de soins de santé si votre partenaire est enceinte ou devient enceinte pendant le traitement.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux contraceptifs efficaces** pendant **3 mois** après votre dernière dose de traitement. Informez votre équipe de soins de santé si votre partenaire est enceinte ou devient enceinte pendant le traitement.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est généralement pris oralement une fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé quand et comment prendre votre traitement.
- Avalez le médicament entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture. Si vous ne pouvez pas avaler ce médicament en entier, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.
- Prenez la dose à peu près à la même heure chaque jour.
- Si vous avez manqué une dose, prenez votre dose normale le plus rapidement possible le jour même. Reprenez votre calendrier habituel le jour suivant. Vous ne devriez pas prendre deux doses ou des comprimés supplémentaires pour compenser la dose manquée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire.
- L'apalutamide est généralement pris avec un autre médicament appelé analogue de la gonadolibérine (GnRH), sauf si vous avez subi une opération pour retirer vos testicules afin de réduire le taux de testostérone dans votre organisme. Votre professionnel de la santé vous expliquera exactement quand et comment prendre l'apalutamide et l'analogue de la gonadolibérine.
- Si vous ingérez une dose trop élevée de votre médicament par accident, ou si vous pensez qu'un enfant ou un animal domestique peut avoir avalé votre médicament, appelez le Centre antipoison de l'Ontario immédiatement au : 1 800 268-9017.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Ces interactions peuvent freiner l'efficacité du traitement ou causer des effets secondaires graves.
- Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :
 - médicaments sur ordonnance et en vente libre et de toute autre drogue, telle que le cannabis (à usage médical ou récréatif)
 - produits de santé naturels tels que les vitamines, tisanes, médicaments homéopathiques et autres compléments.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter de prendre un de ces traitements.

Ce que vous DEVEZ FAIRE lorsque vous prenez ce médicament :

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer ou de recevoir un traitement dentaire ou d'autres interventions médicales.
- PORTEZ des chaussures qui ont des semelles antidérapantes et qui soutiennent vos chevilles. Essayez aussi de vous lever doucement après avoir été assis ou allongé pour réduire le risque de chute.

Ce que vous NE DEVEZ PAS faire lorsque vous prenez ce médicament :

- NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en parler à votre équipe de soins de santé auparavant. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Ne jetez pas les médicaments non utilisés à la maison. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.
- Conservez ce médicament à température ambiante (15 °C à 30 °C), dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Gardez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Si vos comprimés d'apalutamide viennent dans un flacon, ce dernier contient un gel déshydratant pour tenir vos médicaments au sec. Ne retirez pas le gel déshydratant du flacon.

Comment manipuler les médicaments contre le cancer administrés par voie orale de manière sécuritaire?

Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.
- Avalez chaque comprimé en entier. Ne l'écrasez pas et ne le mâchez pas.

Si vous êtes un aidant :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché les médicaments contre le cancer administrés par voie orale.

S'il existe un risque que votre partenaire devienne enceinte :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas été en contact avec le médicament contre le cancer administré par voie orale.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.

Que faire en cas de contact du médicament contre le cancer administré par voie orale avec la peau ou avec les yeux?

En cas de contact avec la peau :

- Lavez votre peau avec beaucoup de savon et d'eau.
- Si votre peau devient rouge ou irritée, communiquez avec votre équipe de soins de santé.

En cas de contact avec les yeux :

- Rincez vos yeux à l'eau courante sans attendre. Laissez l'eau couler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez de l'apalutamide. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus au moins courants. Il est peu probable que vous ressentiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en ressentir d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous rencontrez des effets secondaires lorsque vous prenez de l'apalutamide.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne disparaît pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Essayez de faire 30 minutes d'activité physique modérée (vous arrivez à parler aisément pendant l'exercice) la plupart des jours. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités peu importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches telles que le ménage, les courses, ou les soins aux enfants ou aux animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou autre liquide chaque jour (sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Hypertension artérielle</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il n'y a généralement pas de signe d'hypertension artérielle. • Dans de rares cas, vous pourriez avoir des maux de tête, être essoufflé ou saigner du nez. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez votre pression artérielle régulièrement. • Votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. <p>En cas de maux de tête graves, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement, car cela peut être un signe d'hypertension artérielle.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau pourrait être craquelée, rugueuse ou peler à certains endroits. • Votre peau pourrait avoir une apparence rouge et chaude, comme avec un coup de soleil. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Votre peau pourrait démanger, brûler, piquer ou être très sensible au toucher. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir et traiter la peau sèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un hydratant pour la peau sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez 6 à 8 tasses de liquide non alcoolisé, sans caféine chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. <p>Les éruptions cutanées peuvent être graves dans de rares cas et entraîner la formation de cloques ou la desquamation de votre peau. Si cela se produit, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>	
<p>Diarrhée</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selles molles, liquides pouvant survenir des jours ou des semaines après le traitement. <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez la diarrhée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments anti-diarrhéique si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou vous a recommandé d'en prendre. • Ne mangez pas d'aliments ou de boissons contenant des édulcorants artificiels (comme du chewing-gum ou des boissons « diet »), du café et de l'alcool, jusqu'à ce que votre diarrhée ait cessé. • Mangez de nombreux petits repas et collations au lieu de deux ou trois gros repas. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'anti-diarrhéique, ou si elle est grave (plus de 7 fois par jour).</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Parlez à votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez devoir boire des liquides spéciaux avec du sel et du sucre, appelés thérapie par réhydratation orale. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'anti-diarrhéique, ou si vous avez la diarrhée plus de 7 fois par jour. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Diarrhée pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Nausées et vomissements</p> <p>(Généralement légers)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez aussi ressentir des étourdissements. • Vous pourriez ressentir des nausées dans les heures et les jours suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Prenez les médicaments anti-nausée qui vous sont prescrits, même si vous n'avez pas envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés et frits, ou dont l'odeur est forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. 	<p>Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures ou s'ils sont graves, communiquez avec votre équipe de soins de santé.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>En cas de nausées ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments anti-nausée de secours (au besoin) comme ils vous ont été prescrits. • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage. • Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Des nausées persistant pendant plus de 48 heures ◦ Des vomissements graves ou persistants pendant plus de 24 heures 	
<p>Perte d'appétit, perte de poids</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perte d'intérêt envers la nourriture ou absence de sensation de faim. • Perte de poids. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez des petits repas tout au long de la journée. • Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments pour vous aider à maintenir votre poids. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Perte d'appétit pour en savoir davantage.</p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.
<p>Douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opioïdes tels que la codéine, morphine, hydromorphone, oxycodone) comme prescrit. • Reposez-vous souvent et essayez une activité physique légère (comme la marche), cela pourrait vous aider. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Douleur pour en savoir davantage.</p>	
<p>Changements de vos niveaux d'hormones</p> <p>Votre traitement provoque des changements des niveaux de testostérone dans votre organisme. Cela peut influencer sur votre humeur, vos niveaux d'énergie ou votre apparence physique, entre autres.</p> <p>Vous pourriez avoir plusieurs symptômes, ou aucun. Vos symptômes pourraient également changer à différentes étapes de votre traitement.</p> <p>Signes à surveiller :</p> <p>Bouffées de chaleur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une bouffée de chaleur ressemble à une sensation de chaleur soudaine au niveau du visage et de la partie supérieure du corps. Elle peut survenir rapidement et sans prévenir. • Votre visage pourrait devenir rouge et vous pourriez transpirer. • Les bouffées de chaleur peuvent nuire à votre sommeil. <p>Autres symptômes d'un faible niveau de testostérone :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dysfonction érectile (difficulté à obtenir ou maintenir une érection) ou diminution du désir d'avoir des rapports sexuels • Poitrine enflée ou sensible • Faible énergie • Changements d'humeur, dépression • Amincissement des os et risque accru de fracture • Taux de cholestérol élevé et effets sur votre cœur 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir les bouffées de chaleur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éviter les éléments déclencheurs comme la nourriture épicée, l'alcool et la caféine (thé, café et boissons sucrées). • Faites de l'exercice régulièrement. Demandez à votre équipe de soins de santé quels exercices vous conviennent avant de commencer une activité physique. • Cesser de fumer peut aussi aider. <p>Si vous avez des bouffées de chaleur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour rester au frais, portez des vêtements légers, en coton ou plusieurs couches que vous pouvez facilement retirer. Utilisez un ventilateur. • Buvez beaucoup d'eau ou d'autres liquides (au moins 6 à 8 tasses) sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Placez une serviette sur vos draps avant de vous coucher afin de pouvoir la changer facilement si vous transpirez la nuit. <p>Les bouffées de chaleur peuvent s'améliorer avec le temps. Communiquez avec votre équipe de soins de santé si les bouffées de chaleur ou tout autre symptôme de faible taux de testostérone vous dérangent.</p>	
<p>Douleur osseuse; perte osseuse ou fractures osseuses</p> <p>Votre traitement pourrait entraîner une perte de la densité osseuse anticipée. Les os amincis sont faibles et fragiles. Ils peuvent se briser facilement en cas de chute ou de simples mouvements. Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre densité osseuse (mesurer si vos os sont solides) au moyen d'une scintigraphie osseuse.</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez avoir une douleur osseuse aiguë ou inhabituelle, en particulier au niveau du dos, des hanches ou des poignets. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas. Obtenez une aide médicale d'urgence si vous ressentez une douleur osseuse sévère ou si vous n'arrivez pas à bouger.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir la perte osseuse et les fractures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre équipe de soins de santé peut vous demander de modifier votre alimentation, ou de prendre des suppléments de calcium et de vitamine D, ou d'autres médicaments sur ordonnance. Parlez-en à votre équipe de soins de santé avant de prendre des suppléments. <p>Obtenez une aide médicale d'urgence si vous ressentez une douleur osseuse sévère ou si vous n'arrivez pas à bouger, il pourrait s'agir de signes d'une fracture osseuse.</p> <p>Voir la fiche Santé des os pour en savoir davantage.</p>	
<p>Légère enflure</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez avoir de légères enflures au niveau des bras ou des jambes. Dans de rares cas, cela peut être grave. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir les enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privilégiez une alimentation faible en sel. <p>En cas d'enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portez des vêtements amples. • En cas de jambes ou de pieds enflés, élevez vos pieds lorsque vous êtes assis. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Rythme cardiaque irrégulier, essoufflement, douleur à la poitrine, évanouissement ou enflures au niveau des jambes, des chevilles et du ventre
- Difficulté à voir, à parler ou à utiliser vos bras et jambes
- Convulsions
- Prise de poids inhabituelle qui pourrait être accompagnée de certains des symptômes suivants : fatigue ou manque d'énergie, peau sèche, ongles et cheveux cassants, sensibilité au froid
- Problèmes respiratoires, douleurs thoraciques ou crachements de sang
- Rougeur, cloques ou desquamation de grandes surfaces de votre peau ou à l'intérieur des lèvres, des yeux, de la bouche, des voies nasales ou des organes génitaux, ainsi que de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la toux, des courbatures et les ganglions enflés.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

April 2024 Updated "Less Common Side Effects" section / Mise à jour de la section << Effets secondaires moins courants >>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.