



## **Webinaire sur les symptômes de la constipation et de la diarrhée : Questions et réponses**

**Remarque :** Ces questions ont été posées lors du webinaire sur les symptômes de la constipation et de la diarrhée. Toute personne souhaitant appliquer ou consulter ces réponses pour la pratique doit faire preuve d'un jugement clinique indépendant dans le contexte de circonstances cliniques individuelles ou rechercher la supervision d'un clinicien spécialiste qualifié. Santé Ontario ne fait aucune représentation ou garantie de quelque nature que ce soit concernant leur contenu, leur utilisation ou leur application, et décline toute responsabilité quant à leur application ou leur utilisation de quelque manière que ce soit.

### **1. Quand faut-il envisager un traitement contre la malabsorption des acides biliaires?**

Le lopéramide à faible dose peut être considéré comme un traitement de première intention en cas de suspicion de malabsorption des acides biliaires. Dans les cas où un patient a subi une intervention chirurgicale avec altération du tractus gastro-intestinal, la cholestyramine peut être utilisée pour la malabsorption des acides biliaires.

### **2. Pouvez-vous fournir davantage de renseignements sur la diarrhée liée à l'immunothérapie par rapport à la diarrhée liée à la chimiothérapie?**

Veillez vous reporter à la figure 2 du [Guide de pratique clinique sur la gestion des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire](#) (en anglais seulement) pour plus de renseignements sur la façon de gérer la diarrhée liée à l'immunothérapie.

[L'algorithme de gestion des symptômes de la diarrhée](#) fournit des renseignements sur la gestion de la diarrhée chez les patients traités par chimiothérapie.