Fiche d'information sur les médicaments

PACLitaxel

 (pack-li-tax-cell)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Marque(s) générique(s) disponible(s), Taxol®

Présentation: claire/transparente solution mélangé dans les (plus) grands sacs de liquides

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement des cancers du sein, du poumon, des ovaires, le sarcome de Kaposi et d'autres formes de cancer.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez, ou avez déjà eu:
 - l'engourdissement ou picotement dans mains/pieds,
 - problèmes du coeur ou de foie, des numérations globulaires basses,
 - ou si vous présentez des allergies, dites-le à votre médecin et pharmacien.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Paclitaxel contient une petite quantité d'alcool et peut être donné avec des médicaments contre les allergies, qui peut causer de la somnolence. Éviter de conduire ou d'utiliser de machines si vous vous sentez étourdi ou somnolent après votre traitement.

N'oubliez pas de:

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez:
 - ▶ **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement à l'aide de ce médicament
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine.
- Dexaméthasone sera donné pour aider à empêcher une réaction allergique (par l'injection ou des comprimés).
- Si vous utilisez des comprimés, il est très important de prendre le dexaméthasone **exactement** comme prescrit par votre docteur.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- **Pour les douleurs légères ou la fièvre:**
 - Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre des médicaments pour les douleurs ou la fièvre. Ils peuvent masquer la fièvre.
 - Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
 - **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)	
<p>Amincissement ou perte des cheveux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servez-vous d'une brosse douce et évitez les fixatifs, les décolorants, les teintures et les permanentes. • Dans la plupart des cas, vos cheveux repousseront après le traitement, mais leur texture ou leur couleur peut changer. 	
<p>Picotements ou engourdissement dans les doigts et les orteils (peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez vous rétablir lentement après la fin de votre traitement. • Si vous avez de la difficulté à boutonner vos vêtements, à écrire, à ramasser de petits objets ou si vous avez des douleurs ou des difficultés à vous déplacer, parlez-en à votre équipe de soins de santé. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Maux de tête, douleurs légères dans les articulations, douleurs ou crampes musculaires (peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (TylenolMD), contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous. • Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (AdvilMD, MotrinMD), du naproxène (AleveMD) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires courants (25-49 sur 100 personnes)	
<p>Nausées et vomissements</p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement. Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter lorsqu'elles surviennent.</p> <p>Pour prévenir les nausées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool. <p>Si vous avez des nausées ou des vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé. <p>Voir également la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.</p>	<p>Veillez communiquer avec votre équipe de soin de santé si les nausées durent plus de 48 heures ou si vous vomissez plus de 24 heures.</p>
<p>Réaction allergique (peut être grave)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les symptômes les plus courants comprennent de la fièvre, des démangeaisons, des éruptions cutanées, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue et un sentiment d'oppression dans la poitrine. • Elle peut survenir pendant ou peu après l'administration du médicament. Dites-le à votre équipe de soins de santé si cela se produit. 	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p>Saignements ou bleus inhabituels (peuvent être graves)</p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p>Fièvre, frissons, infection</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure 	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires courants (25-49 sur 100 personnes)	
<p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie, procédure médicale ou avant d’aller chez le dentiste. <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche « Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) »</p>	
<p>Diarrhées (peuvent être graves)</p> <p>Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement.</p> <p>Si vous avez des diarrhées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit. • Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. gomme à mâcher, boissons « diète », café et alcool), jusqu'à ce que votre diarrhée ait cessé. • Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas. • Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale. <p>Voir la fiche Diarrhées pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 sur 100 personnes)	
<p>Anomalie des épreuves du foie faites en laboratoire (peut être grave)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Parlez-en alors à votre équipe de soins de santé. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Gonflement léger dans les bras et les jambes</p> <p>Pour prévenir le gonflement léger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoptez une alimentation à faible teneur en sel. • Évitez les vêtements serrés. <p>Si vous présentez un gonflement dans les jambes, gardez vos pieds élevés quand vous êtes assis.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Ulcération de la bouche (peut être grave)</p> <p>Vous pourrez présenter des ulcérations rondes, douloureuses, blanches ou grises à l'intérieur de la bouche. Elles peuvent apparaître sur la langue, les lèvres, les gencives ou à l'intérieur de vos joues. Dans les cas les plus graves, elles peuvent entraîner des difficultés à avaler, à manger ou à se brosser les dents. Elles persistent généralement une ou deux semaines.</p> <p>Pour prévenir les ulcérations de la bouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez soin de votre bouche en vous brossant les dents délicatement et en utilisant de la soie dentaire. • Rincez-vous souvent la bouche. N'utilisez pas un rince-bouche comportant de l'alcool. • Essayez plutôt un rince-bouche maison • Mélangez 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1 cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 L) d'eau. <p>Si vous avez des ulcérations dans la bouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous constatez l'apparition d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, ou si vous avez des douleurs quand vous avalez. • Évitez les aliments chauds, épicés, acides, résistants ou croquants. Votre médecin pourra vous prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcérations et prévenir les infections. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 sur 100 personnes)	
Voir la fiche Soins de la bouche pour en savoir davantage.	
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux. • Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage). • Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué. <p>Voir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.</p>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Réactions à l'endroit de l'injection (peuvent être graves)</p> <p>Portez attention aux rougeurs, aux démangeaisons, aux meurtrissures, aux éruptions cutanées légères ou à un gonflement.</p>	-

D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:

- Rythme cardiaque irrégulier, essoufflement ou douleurs thoraciques;
- Douleurs intenses et soudaines dans votre ventre ou vos bras;
- Confusion soudaine, difficulté à parler ou à bouger vos bras ou vos jambes
- Toux accompagnée de sang ou difficulté à respirer;
- Bras ou jambes : douleurs ou enflure d'une veine;
- Tout changement de votre vision;
- Ballonnement important ou sensation de plénitude;
- Douleur abdominale qui rayonne dans votre dos;
- Perte de conscience ou crise épileptique;
- Éruption cutanée grave qui cause des ampoules ou une peau qui pèle.