

Fiche d'information sur les médicaments

pegfilgrastim (peg-fil-gras-tim)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Neulasta^{MD}, Lapelga^{MC}, Fulphila^{MC}, Nyvepria^{MC}

Présentation: Solution claire, incolore pour injection à l'aide d'une seringue préremplie

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Le pegfilgrastim est utilisé pour stimuler la croissance des globules blancs qui vous aide à lutter contre les infections.
- Le pegfilgrastim est disponible en tant que médicament biosimilaire. Consultez notre brochure sur les [médicaments biosimilaires](#) pour plus d'information.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- une maladie cardiaque;
- une anémie falciforme;
- des allergies.

N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de la part de votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre capacité à avoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce médicament n'a pas été étudié chez les femmes enceintes et ses effets sur un fœtus ne sont pas connus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez parler avec votre équipe de soins de santé avant d'utiliser ce médicament.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est généralement administré par injection sous la peau, une fois par cycle de chimiothérapie. Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître le calendrier de votre traitement.
- Si vous (ou votre soignant) administrez l'injection, votre équipe soignante vous apprendra (ou à votre soignant) comment faire l'injection. Assurez-vous de bien comprendre la bonne méthode de préparation et d'injection du médicament. Parlez-en à votre infirmière ou pharmacien pour obtenir des renseignements supplémentaires.
- Vous devez attendre au moins 24 heures après votre chimiothérapie avant d'injecter du pegfilgrastim.
- Au moins 12 jours devraient s'écouler entre votre dose de pegfilgrastim et votre prochaine séance de chimiothérapie.
- Vous pouvez sortir le médicament du réfrigérateur environ 30 minutes avant de l'utiliser, afin que l'injection soit plus confortable.
- Si vous avez raté votre dose de pegfilgrastim, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.
- Si vous avez pris une trop grande quantité de votre médicament, ou si vous pensez qu'un enfant ou un animal pourrait avoir ingéré votre médicament, appelez immédiatement le Centre antipoison de l'Ontario au : 1 800 268-9017.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou d'autres produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments ou des produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer des effets secondaires graves.
- Informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :
 - des médicaments, avec ou sans ordonnance, ainsi que toute autre drogue, telle que le cannabis/la marijuana (médicale ou récréative);
 - des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.
- Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un de ces produits.

À FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- COMMUNIQUEZ avec votre équipe de soins de santé sur les risques de développer d'autres cancers après ce traitement.
- INFORMEZ votre équipe de soins de santé si vous présentez des signes d'infection.

À NE PAS FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez le médicament au réfrigérateur, et ne le congelez pas. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Conservez le médicament dans son emballage pour le protéger de la lumière jusqu'au moment de l'utiliser.
- On ne doit jamais réutiliser les capuchons, les aiguilles, ni les seringues. Ils doivent toujours être éliminés dans un contenant à l'épreuve des perforations destiné aux objets pointus ou tranchants fourni par votre pharmacien.
- Demandez à votre pharmacien comment éliminer correctement ces articles, y compris les contenants pleins.
- Ne jetez pas les médicaments non utilisés à votre domicile. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du pegfilgrastim. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez du pegfilgrastim.

Si vous présentez des signes ou symptômes d'une **infection** (si votre température prise par la bouche [température buccale] est 38,3 °C [100,9 °F] ou plus à tout moment OU 38 °C [100,4 °F] ou plus pendant au moins une heure, frissons ou maux de gorge), communiquez avec votre médecin et obtenez **immédiatement** une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Légères douleurs aux articulations, aux muscles, au dos ou aux os</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleur aux muscles, aux articulations ou aux os. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider. • Prenez des médicaments (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. • Vérifiez toujours votre température pour savoir si vous avez de la fièvre avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. <ul style="list-style-type: none"> ◦ la fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat; ◦ si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir que vous avez une infection. <p>Comment vérifier si vous avez de la fièvre :</p> <p>Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous vous sentez chaud ou mal (p. ex., frissons, maux de tête, douleur légère).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de : <ul style="list-style-type: none"> ◦ 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU ◦ 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la douleur pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- difficultés à respirer, toux ou présence de sang dans la toux;
- gonflement, prise de poids soudaine, difficulté à respirer, évanouissement, ballonnements sévères dans le ventre et sensation de satiété, ou sensation de grande fatigue;
- éruption cutanée ressemblant à des taches ou des bosses violettes ou rouges, des petits points, des taches ou de l'urticaire; cette éruption cutanée peut également provoquer des démangeaisons;
- fièvre, éruption cutanée douloureuse et rouge qui grossit rapidement;
- éruption cutanée, sensation d'oppression dans la poitrine ou la gorge pendant ou peu de temps après l'administration du médicament;
- réactions au site de l'injection telles que des rougeurs, gonflements, des démangeaisons ou des ecchymoses;
- chevilles enflées, présence de sang dans l'urine, urine de couleur brune, ou réduction ou interruption de la miction;
- douleur dans la partie supérieure de l'abdomen ou de l'épaule gauche;
- douleur intense à la poitrine, au ventre ou aux articulations;
- ecchymoses ou saignements inhabituels (comme des saignements de nez ou des gencives, des selles noires ou du sang dans les selles.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022

December 2022 Updated/revised info sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.