

ponatinib

Prononciation: po-NA-Ti-nib

Autre nom(s): Iclusig^{MD}

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

- Pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) ou de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA)

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement :
 - ◊ des troubles cardiaques
 - ◊ des troubles du foie (y compris l'hépatite)
 - ◊ des troubles du pancréas
 - ◊ une hypertension artérielle
 - ◊ un accident vasculaire cérébral, des caillots sanguins
 - ◊ du diabète, ou
 - ◊ des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Ce médicament contient une petite quantité de lactose. Si vous ne pouvez pas tolérer du lactose, parlez à votre médecin ou pharmacien.

Comment ce traitement est-il administré?

- Avalez en entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Vous ne devez pas écraser ni mâcher les comprimés.
- Vous ne devez manger ou boire de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement pour ne pas accroître les effets secondaires.

- Si vous oubliez une dose, sautez cette dose et prenez la dose suivante tel que prévu. Ne prenez pas une dose supplémentaire pour compenser la dose oubliée.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Vous ne devez manger ou boire de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement pour ne pas accroître les effets secondaires.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

Pour les douleurs légères ou la fièvre:

- Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre des médicaments pour les douleurs ou la fièvre. Ils peuvent masquer la fièvre.
- Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
- L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
- **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocif pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez:
 - ▶ **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose (recommandation générale). On ne sait pas si ponatinib affecte le fonctionnement de la pilule contraceptive. Envisager une autre méthode de contraception. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement à l'aide de ce médicament.
- Effets sur la fertilité : Probable

Comment dois-je conserver et manipuler les médicaments de ce traitement en toute sécurité?

Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne jetez pas à la maison aucun médicament non utilisé. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	Quand contacter un médecin?
Effet secondaire et mesure à prendre	
<p>Concentrations anormales des enzymes pancréatiques (lipase, amylase)</p> <p>Votre médecin pourra contrôler périodiquement ces concentrations à l'aide d'une analyse sanguine.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Éruptions cutanées, assèchement de la peau, démangeaisons cutanées (peuvent être sévères)</p> <p>Les éruptions cutanées peuvent être graves et, dans de rares cas, entraîner la présence de cloques sur la peau ou une desquamation. Si cet effet apparaît, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence.</p> <p>Pour prévenir et traiter l'assèchement de la peau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un produit hydratant pour la peau. • Protégez votre peau contre le soleil et le froid • Appliquez un écran solaire offrant une protection contre les UVA et les UVB et un FPS d'au moins 30. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Faible numération plaquettaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portez attention aux signes de saignements (comme des saignements inhabituels du nez ou des gencives) ou aux hématomes qui apparaissent facilement (ce symptôme est rare). • Dans de très rares cas, ces symptômes sont graves. Si vous avez des selles de couleur noire, de l'urine rouge ou rose, du mucus rouge ou brun quand vous toussiez, des maux de tête graves/de la confusion ou un saignement qui ne s'arrête pas, vous devez en parler à votre équipe de santé ou obtenir une aide médicale d'urgence. <p>Voir la fiche Faible numération plaquettaire pour en savoir davantage.</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	Quand contacter un médecin?
Effet secondaire et mesure à prendre	
<p>Fièvre, frissons, infection</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez févreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie, procédure médicale ou avant d'aller chez le dentiste. <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche Neutropénie (faible taux de neutrophiles).</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>
<p>Douleurs ou crampes dans l'abdomen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous souffrez de constipation ou de diarrhées, elles peuvent provoquer des douleurs dans votre abdomen. • Si la douleur est grave et si elle s'accroît ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les autres causes possibles. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Gonflement léger dans les bras et les jambes (peuvent être sévères, y compris les fluides autour du cœur ou des poumons)</p> <p>Pour prévenir le gonflement léger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoptez une alimentation à faible teneur en sel. • Évitez les vêtements serrés. <p>Si vous présentez un gonflement dans les jambes, gardez vos pieds élevés quand vous êtes assis.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	Quand contacter un médecin?
Effet secondaire et mesure à prendre	
<p>Maux de tête, douleurs légères dans les articulations, douleurs ou crampes musculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}), contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous. • Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Constipation</p> <p>Pour prévenir la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez beaucoup de liquides et maintenez une bonne alimentation. Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire. • Soyez actif. Des exercices périodiques peuvent vous garder en forme. • Essayez de consommer davantage de fibres (p. ex. fruits avec pelure, légumes verts et céréales entières). Si vous prenez des médicaments opiacés, demandez à votre équipe de soin de santé si vous devez consommer davantage de fibres. <p>Pour traiter la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous n'avez pas eu de selles depuis deux ou trois jours, vous devrez peut-être prendre un laxatif. Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous pouvez faire. <p>Voir la fiche Constipation pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	Quand contacter un médecin?
Effet secondaire et mesure à prendre	
<p>Blocage d'une artère (vaisseau sanguin)</p> <p>Cet effet peut survenir dans votre cœur, votre poitrine, votre cerveau, votre abdomen ou vos membres. Il peut être grave et bloquer une grosse artère et provoquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un accident vasculaire cérébral : vous pourrez avoir des épisodes de confusion et présenter une perte soudaine de la vue ou des difficultés à utiliser vos bras ou vos jambes. • Une crise cardiaque : vous pourrez éprouver des douleurs à la poitrine, un essoufflement, des douleurs dans l'abdomen ou les bras. 	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux. • Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage). • Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué. <p>Voir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Anomalie des épreuves du foie faites en laboratoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Parlez-en alors à votre équipe de soins de santé. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	Quand contacter un médecin?
Effet secondaire et mesure à prendre	
<p>Tension artérielle élevée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez périodiquement votre tension artérielle. Votre médecin pourra vous prescrire un médicament pour traiter l'hypertension artérielle. • Si vous avez des maux de tête graves, des étourdissements graves ou si vous perdez connaissance, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence étant donné qu'il peut s'agir d'un signe que votre tension artérielle est trop élevée ou trop faible. • Peut rarement être grave et entraîner des problèmes rénaux. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Nausées et vomissements (généralement légers)</p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement.</p> <p>Si vous avez des nausées ou des vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool. • Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé. <p>Voir également la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Troubles de la vue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez avoir les yeux secs ou rouges, présenter une irritation, des douleurs, un larmoiement, une sensibilité à la lumière ou avoir la vue embrouillée. • Évitez de porter des verres de contact. • Vous pouvez essayer des larmes artificielles ou un onguent. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible (heures de bureau).</p>
<p>Picotements ou engourdissement dans les doigts et les orteils</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez vous rétablir lentement après la fin de votre traitement. • Si vous avez de la difficulté à boutonner vos vêtements, à écrire, à ramasser de petits objets ou si vous avez des douleurs ou des difficultés à vous déplacer, parlez-en à votre équipe de soins de santé. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:

- Pouls irrégulier, essoufflement, douleurs dans la poitrine, évanouissements ou gonflement des jambes, des chevilles et du ventre
- Enflure et durcissement de la veine dans un bras ou une jambe
- Douleur sévère soudaine dans le haut du dos, qui monte dans votre cou ou descend dans votre dos, alors que vous ne vous êtes pas blessé
- Faiblesse d'un côté du corps
- Troubles de la vision ou difficulté à avaler
- Palpitations inhabituelles au niveau de la poitrine ou du ventre
- Difficulté à respirer ou crachats comportant du sang
- Cheveux qui se brisent facilement, sensibilité au froid.
- Douleurs articulaires, fièvre, confusion et/ou problèmes rénaux (difficulté à uriner, gonflement, prise de poids inhabituelle)
- Avoir soif ou uriner plus souvent que d'habitude
- Maux de tête graves, évanouissement, confusion, convulsions, perte de vision

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

December 2025 Changed to new format (Passé au nouveau format)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.