

Traitement AC-PACL(DD)+TRAS

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce traitement contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le traitement
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Quel est ce traitement?

AC-PACL(DD)+TRAS est le nom de code donné à votre régime de traitement du cancer du sein.

Un régime est une association de médicaments visant à traiter le cancer.

Ce nom de régime est composé d'une ou plusieurs lettres tirées des noms des 4 médicaments composant votre traitement. Ce nom de régime est également composé de lettres décrivant la dose ou d'autres renseignements sur le mode d'administration de ce médicament.

Voici les noms des médicaments composant votre régime une explication sur la signification des autres lettres :

AC = doxorubicine (également appelé **Adriamycin^{MD}**) et **Cyclophosphamide**
PACL = **PACLi**taxel (également appelé **Taxol^{MD}**)
DD = **Dose-Densité**, ce qui signifie que le traitement est administré toutes les deux semaines. Chaque période de deux semaines est appelée un cycle.
 +
TRAS = **TRAS**tuzumab (également appelé **Herceptin^{MD}**, **Ogivri^{MC}**, **Trazimera^{MC}** ou **Herzuma^{MD}**)

Le trastuzumab peut être administré selon un calendrier différent de celui décrit ci-dessous. Demandez à votre équipe de soins de santé quel calendrier (1 ou 2) ci-dessous s'applique à votre traitement.


La première partie du traitement (**AC-PACL(DD)+TRAS**) dure **16 semaines** (calendrier 1) ou **20 semaines** (calendrier 2). Le traitement est divisé en 8 cycles. Chaque cycle dure **2 ou 3 semaines**. Les deux calendriers sont détaillés ci-dessous.

Une fois le traitement AC-PACL(DD)+TRAS terminé, un traitement **uniquement à base de trastuzumab (TRAS)** se poursuit **toutes les 3 semaines** pendant environ **1 an** au total.

Calendrier 1:

La première partie du traitement dure **16 semaines** pour la plupart des patients. Elle est divisée en **8 cycles**. Chaque cycle dure **2 semaines**.

Voici une image d'un calendrier typique pour le traitement à base d'AC-PACL(DD)+TRAS :



Pendant chaque cycle de 2 semaines, vous recevrez un traitement à base d'AC ou de PACL+TRAS lors du jour 1 à l'hôpital.

Voici à quoi ressemble chaque cycle:

Jour 1 Jour d'administration du traitement : Rendez-vous à l'hôpital pour le traitement à base d'AC ou de PACL+TRAS	2 Pas de traitement à base d'AC ou de PACL+TRAS	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14


Après 8 cycles, un traitement à base de **trastuzumab (TRAS)** se poursuit toutes les 3 semaines pendant environ 1 an au total.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le traitement à base de TRAS seul, consultez la [fiche d'information sur le trastuzumab destinée aux patients](#).

Calendrier 2 :

La première partie du traitement dure **20 semaines** pour la plupart des patients. Elle est divisée en **8 cycles**. Les cycles de traitement à base d'AC durent **2 semaines** et les cycles de traitement à base de PACL+TRAS durent **3 semaines**.

Voici une image du calendrier pour le traitement à base d'AC-PACL(DD)+TRAS :



Pendant chaque cycle de 2 semaines, vous recevrez un traitement à base d'AC lors du jour 1 à l'hôpital.

Voici à quoi ressemblent les cycles 1 à 4 :

Jour 1 Jour d'administration du traitement : Rendez-vous à l'hôpital pour le traitement à base d'AC.	2 Pas de traitement à base d'AC	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Pendant chaque cycle de 3 semaines, vous recevrez un traitement à base de PACL+TRAS lors du jour 1, puis seulement à base de PACL lors des jours 8 et 15 à l'hôpital.

Voici à quoi ressemblent les cycles 5 à 8:

Jour 1 Jour d'administration du traitement : Rendez-vous à l'hôpital pour le traitement à base de PACL+TRAS	2 Pas de traitement à base de PACL ou de TRAS	3	4	5	6	7
8 Jour d'administration du traitement : Rendez-vous à l'hôpital pour le traitement à base de PACL	9 Pas de traitement à base de PACL ou de TRAS	10	11	12	13	14
15 Jour d'administration du traitement : Rendez-vous à l'hôpital pour le traitement à base de PACL	16 Pas de traitement à base de PACL ou de TRAS	17	18	19	20	21

Après 8 cycles, **un traitement uniquement à base de trastuzumab (TRAS)** se poursuit toutes les 3 semaines pendant environ 1 an au total.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le traitement à base de TRAS, consultez la [fiche d'information sur le trastuzumab destinée aux patients](#).



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

Les médicaments dans votre traitement sont injectés dans une veine (intraveineuse ou IV) à l'hôpital.

Votre équipe de soins pourrait vous suggérer la mise en place d'un cathéter central inséré par voie périphérique (**CCIP**) ou d'un cathéter **Port-a-Cath**.

- Il s'agit de dispositifs intraveineux spéciaux pour administrer les médicaments et les liquides dans des veines plus larges.
- L'utilisation d'un CCIP ou d'un Port-a-Cath peut être plus sécuritaire pour certains médicaments qui peuvent entraîner des réactions lorsqu'ils sont administrés par voie intraveineuse dans votre main.
- Si vous avez un CCIP ou un Port-a-Cath vous n'avez pas besoin que l'on place une aiguille (IV) dans votre bras à chaque fois que vous venez pour recevoir votre traitement.

- ✓ Parlez à votre équipe de soins de santé des avantages et des risques que posent un **CCIP** ou un **Port-a-Cath** pour savoir si l'une de ces options vous convient.

Vous devrez également vous soumettre à un test sanguin avant chaque traitement pour s'assurer que vous pouvez recevoir le traitement en toute sécurité.

Quels autres médicaments sont administrés avec ce traitement?

Prévention de la nausée et des vomissements

Vous recevrez des médicaments pour éviter la nausée (envie de vomir) et les vomissements.

- Ces traitements sont des antinauséeux et comprennent des médicaments tels que l'ondansétron (Zofran^{MD}), le granisétron (Kytril^{MD}), l'aprépitant (Emend^{MD}) ou d'autres.

Prévention des réactions allergiques

Avant l'administration du paclitaxel (PACL), un médicament vous sera prescrit pour prévenir toute réaction allergique.

- Il existe différents types de médicaments pour empêcher les réactions allergiques. Ils sont appelés :
 - ◊ antihistaminiques (comme la diphenhydramine ou Benadryl^{MD})
 - ◊ analgésiques/antipyrétiques (comme l'acétaminophène ou Tylenol^{MD})
 - ◊ antagonistes des récepteurs H2 (comme la ranitidine ou la famotidine)
 - ◊ corticostéroïdes (comme la prednisone)

Prévention des infections

Vous recevrez également un médicament après votre jour de traitement pour augmenter votre leucocytémie (nombre de neutrophiles). Cela contribue à prévenir les infections et garantir que vous pourrez recevoir le prochain traitement en toute sécurité.

- Ce médicament peut s'appeler filgrastim (Neupogen^{MD}, Grastofil^{MD}) ou pegfilgrastim (Lapelga^{MC}, Neulasta^{MD}).

À FAIRE pendant le traitement

- ✓ PARLEZ à votre équipe de soins de santé de tout autre problème de santé que vous avez, comme des troubles cardiaques, hépatiques ou rénaux, ou toute allergie.
- ✓ CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale.
- ✓ BUVEZ beaucoup de liquides (sauf indication contraire) et urinez souvent pendant les deux ou trois jours suivant votre traitement à base d'AC pour éviter une irritation de la vessie. Il est normal que **vosre urine soit rouge jusqu'à deux jours suivant votre traitement à base d'AC**. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre urine reste rouge pendant plus de deux jours.
- ✓ PARLEZ à votre équipe de soins de santé de votre risque de développer d'autres cancers et des troubles cardiaques à la suite de ce traitement.
- ✓ PENSEZ À DEMANDER à quelqu'un de vous conduire à l'hôpital puis chez vous les jours de traitement. Vous pourriez ressentir une somnolence ou des étourdissements après votre traitement.
- ✓ SIGNALEZ à votre équipe de soins de santé toute nouvelle douleur ou tout nouvel engourdissement ou fourmillement dans vos mains ou pieds. Cela est d'autant plus important si vous avez du mal à exécuter des tâches comme fermer vos boutons, écrire, vous déplacer, ou si vous ressentez une douleur ou un engourdissement aigus.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- × NE PRENEZ PAS d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments sans ordonnance (vente libre) ou des produits de santé naturels sans consulter votre équipe de soins de santé.
- × NE COMMENCEZ PAS de traitement complémentaire ou alternatif, comme de l'acupuncture ou des médicaments homéopathiques sans consulter votre équipe de soins de santé.
- × NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS D'ALCOOL pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé, car cela pourrait accentuer les effets indésirables et nuire à l'efficacité de votre traitement.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Oui, ce traitement peut interagir avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments ou des produits de santé naturels. Les interactions pourraient faire échouer le traitement et causer des effets secondaires graves.

Informez votre équipe de soins si vous prenez :

- des médicaments avec ou sans ordonnance;
- des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un d'entre eux.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

OU

 - 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous **DEVEZ** immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous. L'**acétaminophène (Tylenol^{MD})** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Les changements de vos cycles menstruels (règles), le cas échéant.
- Les symptômes de ménopause comme les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale ou les changements d'humeur, le cas échéant.
- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre fertilité (capacité à concevoir un enfant).

Ce traitement peut être nocif pour un enfant à naître. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de tomber enceinte, vous et votre partenaire devez utiliser **2 méthodes de contraception efficaces** en même temps pendant le traitement. Discutez avec votre équipe de soins de santé des options de contraception qui vous conviennent le mieux et de la durée pendant laquelle vous devez les utiliser après votre dernière dose de traitement.
- N'utilisez pas de contraceptif hormonal (comme la pilule contraceptive), sauf si votre équipe de soins de santé vous indique que vous pouvez le faire en toute sécurité. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la méthode contraceptive la plus sûre pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement. Discutez avec votre équipe de soins de santé pour savoir combien de temps vous devez attendre avant de commencer à allaiter après votre dernière dose de traitement, si cela s'applique à vous.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez un traitement AC+PACL(DD)+TRAS, des plus courants aux moins courants. Vous pourriez ne pas observer tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Une fois le traitement AC-PACL(DD)+TRAS terminé, un traitement uniquement à base de trastuzumab (TRAS) se poursuit toutes les 3 semaines pendant environ 1 an au total. La plupart des patients se sentent mieux et ne présentent pas un grand nombre d'effets secondaires lorsqu'ils suivent un traitement uniquement à base de trastuzumab. **Pour obtenir de plus amples renseignements sur le traitement uniquement à base de trastuzumab (TRAS), consultez la [fiche d'information sur le trastuzumab destinée aux patients](#).**

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous ressentez des effets secondaires durant le traitement AC-PACL(DD)+TRAS.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Perte de la densité ou chute des cheveux Signes à surveiller - Vos cheveux commencent à être plus fins ou à tomber pendant ou après le traitement. - Dans la plupart des cas, vos cheveux repousseront après le traitement, mais la texture ou la couleur peuvent changer. - Dans de très rares cas, la perte des cheveux peut être permanente. Que faire? - Utilisez une brosse douce. - Évitez les vaporisateurs capillaires, décolorations, colorations et permanentes.	Parlez à votre équipe de soins de santé si cela vous perturbe.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Faible nombre de neutrophiles (globules blancs) dans le sang (neutropénie) Lorsque votre nombre de neutrophiles est faible, vous courez un risque d'infection accru. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la neutropénie (faible taux de neutrophiles) pour de plus amples renseignements. Signes à surveiller • Si vous avez l'impression d'être chaud ou vous sentez mal (par exemple si vous avez des frissons ou commencez à tousser), vous devez vérifier votre température pour déterminer si vous avez de la fièvre. • Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD} (acétaminophène) ou Advil^{MD} (ibuprofène)). • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou froid juste avant de prendre votre température. Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de : • 38,3°C (100,9°F) ou plus en tout temps OU • 38°C (100,4°F) ou plus pendant au moins une heure. Que faire? En cas de faible taux de neutrophiles • Lavez-vous les mains souvent pour prévenir les infections. • Consultez votre équipe de soins de santé avant toute vaccination, opération, intervention médicale ou visite chez le dentiste. • Gardez un thermomètre numérique à la maison pour pouvoir vérifier facilement si vous avez de la fièvre. Si vous avez de la fièvre: Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.	Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Faible numération plaquettaire Lorsque votre numération plaquettaire est faible, vous courez un risque de saignements et d'hématomes. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la faible numération plaquettaire pour de plus amples renseignements. Signes à surveiller • Restez à l'affût de signes de saignements : ◦ Saignements des gencives ◦ Saignements du nez inhabituels ou abondants ◦ Apparition d'ecchymoses supérieure à la normale ◦ Selles de couleur noire, ou sang dans les selles ◦ Mucus rouge ou brun quand vous toussiez ◦ Étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vue ◦ Saignements vaginaux abondants ◦ Urine rouge ou rose (sauf pendant les deux jours qui suivent votre traitement à base d'AC) Que faire? En cas de faible numération plaquettaire: • Indiquez à votre pharmacien que votre numération plaquettaire peut être faible avant de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre. • Consultez votre équipe de soins de santé avant d'aller chez le dentiste. • Essayez d'éviter les coupures et hématomes. • Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités conviennent à votre situation. • Une faible numération plaquettaire peut retarder votre traitement. Votre équipe de soins de santé peut recommander une transfusion sanguine. Si vous avez des signes de saignement: • Si vous saignez un peu, nettoyez la zone au savon et à l'eau ou à l'aide d'une solution saline de rinçage. Appliquez la pression pendant au moins 10 minutes.	Consultez votre équipe de soins de santé si vous présentez des signes de saignement. Si vous avez un saignement grave ou qui ne s'arrête pas, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Si vous avez un saignement grave ou qui ne s'arrête pas, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.	
Nausée et vomissements (Plus probable avec le traitement à base de AC) Signes à surveiller • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir, vous pouvez également vous sentir étourdi. • Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. Que faire? Pour prévenir la nausée: • Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter. • Prenez des médicaments antinauséeux en prévention selon les recommandations, même si vous n'avez pas envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et mangez des petits repas légers. Prenez l'air et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez d'alcool. En cas de nausée ou vomissements: • Prenez vos médicaments de traitement antinauséeux (au besoin) selon les recommandations. • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la nausée et les vomissements pour de plus amples renseignements. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé: ◦ si la nausée persiste au-delà de 48 heures; ◦ si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères (plus probable avec le traitement à base de PACL); Maux de tête (moins courant) Signes à surveiller • Maux de tête, nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires, ou sensation de douleur généralisée. Que faire? • Prenez des médicaments (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. • Avant de prendre d'autres médicaments comme l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine, lisez la section intitulée : « Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? ». Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui nécessite un traitement, ou peuvent aggraver votre risque d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la douleur pour de plus amples renseignements.	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Réaction allergique; réaction au point d'injection (Ces symptômes peuvent être graves) Signes à surveiller • Fièvre, démangeaisons, éruptions cutanées, gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, et serrement dans la gorge et la poitrine. (Plus probable avec le traitement à base de PACL+TRAS). • Ces symptômes peuvent se manifester pendant ou peu après l'administration de votre traitement et peuvent être graves. • Dans de rares cas, vous pouvez constater une rougeur légère ou un léger inconfort au point où l'on vous a injecté votre traitement à base de doxorubicine. Que faire? • Parlez-en immédiatement à votre infirmier si vous présentez des symptômes de réaction allergique pendant ou juste après votre traitement. • Demandez des conseils à votre équipe de soins de santé en cas de réaction cutanée. Si vous constatez une rougeur légère ou un léger inconfort au point où l'on vous a injecté vos traitements à base d'AC, vous devrez peut-être appliquer des compresses froides/glacées. Parlez à votre équipe de soins de santé pour savoir quel traitement est adapté à votre cas.	En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.
Diarrhée Signes à surveiller • Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou semaines suivant votre traitement.	Parlez à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? Si vous avez la diarrhée • Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé. • Évitez les aliments ou boissons avec édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool. • Mangez plusieurs repas légers au lieu de deux ou trois gros repas. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. • Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire 6 à 8 tasses de liquides par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, procédé appelé réhydratation par voie orale. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de 7 fois par jour). Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la diarrhée pour de plus amples renseignements.	médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de 7 fois par jour).
Fourmillement ou engourdissement des doigts et orteils (neuropathie) (Plus probable avec le traitement à base de PACL) Signes à surveiller • Vous pourriez ressentir des fourmillements ou un engourdissement dans vos doigts ou orteils après la prise de paclitaxel (pendant les 8 dernières semaines de votre traitement). • Parfois ces symptômes peuvent être douloureux et s'apparenter à une sensation de brûlure aiguë. Que faire? • Consultez votre équipe de soins de santé si vous observez des symptômes de neuropathie. • L'engourdissement peut s'améliorer petit à petit après la fin de votre traitement.	Parlez à votre équipe de soins de santé, particulièrement si vous avez du mal à exécuter des tâches comme fermer vos boutons, écrire, vous déplacer, ou si vous ressentez une douleur ou un engourdissement aigus.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Dans de rares cas, ces problèmes peuvent se poursuivre après la fin du traitement. Si vous continuez à ressentir des symptômes gênants, parlez-en à votre équipe de soins de santé.	

Effets secondaires moins courants (moins de 25 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Légères enflures Signes à surveiller - Vous pouvez constater une légère enflure ou bouffissure au niveau des bras et des jambes. Dans de rares cas, elles peuvent être graves. Que faire? Pour prévenir les enflures : - Mangez des aliments peu salés. En cas d'enflures : - Portez des vêtements amples. - Pour les jambes et pieds enflés, élevez vos pieds quand vous êtes assis.	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Troubles hépatiques (Plus probable avec le traitement à base de PACL) Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre fonction hépatique à l'aide d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne causent généralement aucun symptôme.	Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (moins de 25 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Signes à surveiller Dans de rares cas, vous pouvez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Ces signes peuvent être graves. Que faire? En cas de symptômes de troubles hépatiques, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.	
Fatigue Signes à surveiller - Sensation de fatigue et manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. Que faire? - Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) tous les jours ou presque. - Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité. - Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. - Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage, ou pour vous occuper des enfants et animaux de compagnie. - Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a demandé de boire plus ou moins). - Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous êtes fatigué. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.	Parlez à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (moins de 25 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Douleurs ou crampes d'estomac Signes à surveiller • Douleurs ou crampes au niveau du ventre. • La constipation ou la diarrhée peuvent causer des douleurs abdominales. Que faire? • Si la douleur est intense, s'aggrave ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé s'il pourrait y avoir d'autres causes.	Parlez à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Perte d'appétit Signes à surveiller • Perte d'intérêt pour la nourriture ou aucune sensation de faim. • Perte de poids. Que faire? • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez des petits repas tout au long de la journée. • Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids. • Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la perte d'appétit pour de plus amples renseignements.	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Changements des ongles Signes à surveiller • La couleur de vos ongles pourrait changer, ou vous pourriez ressentir de la douleur, avoir les cuticules enflées, ou constater un décollement des ongles. • Vos ongles reviendront progressivement à la normale après la fin du traitement.	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (moins de 25 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? • Hydratez vos ongles et cuticules. • N'utilisez pas de vernis à ongles ou de faux ongles jusqu'à ce que vos ongles aient retrouvé leur état normal. • Portez des gants pour les tâches ménagères ou le jardinage.	
Altération du goût Signes à surveiller • Les aliments et boissons peuvent avoir un goût différent qu'à l'ordinaire. Que faire? • Mangez des aliments faciles à mâcher, comme des œufs brouillés, des pâtes, des soupes, des légumes cuits. • Goûtez les aliments à différentes températures, car leur saveur peut changer. • Goûtez les aliments sous différentes formes : frais, surgelés ou en conserve. • Goûtez des aliments non épicés, épicés ou assaisonnés.	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Étourdissement Signes à surveiller • Vous pourriez vous sentir étourdi ou sur le point de vous évanouir. Que faire? • Allongez-vous pour éviter de tomber. • Levez-vous et commencez à bouger doucement une fois que vous vous sentez mieux. • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez étourdi.	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (moins de 25 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Troubles de la vessie (Avec l'administration du traitement à base d'AC) Signes à surveiller • Envie soudaine et urgente d'uriner. • Douleur dans votre ventre ou bas ventre ou douleur quand vous urinez. • Dans les cas graves, vous pourriez avoir du sang dans les urines. Que faire? • Buvez au moins 6 à 8 tasses (2 litres) de liquides par jour lorsque vous recevez votre traitement à base d'AC, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé de boire plus ou moins. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre urine est rouge pendant plus de deux jours après votre traitement à base d'AC ou si vous observez des symptômes de troubles de la vessie. En cas de symptômes graves, obtenez une aide médicale d'urgence.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé. En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.
Plaies buccales Signes à surveiller • Vous pourriez constater des plaies rondes, douloureuses, blanches ou grises à l'intérieur de votre bouche sur la langue, les lèvres, les gencives, ou à l'intérieur de vos joues. • Dans les cas les plus graves, elles peuvent vous gêner pour avaler, manger ou vous brosser les dents. • Elles peuvent durer trois jours ou plus. Que faire? Prévention des plaies buccales : • Prenez soin de votre bouche en brossant vos dents doucement et en passant régulièrement du fil dentaire. • Rincez souvent votre bouche à l'aide d'un rince-bouche maison.	Parlez à votre équipe de soins de santé dès que vous observez des plaies buccales ou labiales ou si vous avez de la difficulté à manger, boire ou avaler.

Effets secondaires moins courants (moins de 25 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
• Pour préparer un rince-bouche maison, mélangez une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 l) d'eau. • N'utilisez pas de rince-bouches commerciaux, particulièrement ceux contenant de l'alcool, qui peuvent irriter votre bouche. Si vous avez des plaies buccales : • Évitez les aliments chauds, épicés, acides, durs ou craquants. • Votre médecin peut vous prescrire un rince-bouche spécial pour soulager les plaies buccales et éviter les infections. • Parlez à votre équipe de soins de santé dès que vous observez des plaies buccales ou labiales ou si vous avez de la difficulté à manger, boire ou avaler. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur les soins bucco-dentaires pour de plus amples renseignements.	

D'autres effets secondaires rares, mais graves peuvent apparaître avec ce traitement.

Si vous ressentez **n'importe lequel** des symptômes suivants, parlez-en immédiatement à votre équipe de soins de santé ou obtenez une aide médicale d'urgence :

- Arythmie cardiaque, essoufflement ou douleurs dans la poitrine
- Douleur soudaine et intense dans votre ventre ou votre bras
- Confusion soudaine, difficulté à parler ou difficulté à bouger les bras ou les jambes
- Présence de sang dans la toux ou difficultés respiratoires
- Douleur et gonflement d'une veine dans un bras ou une jambe
- Tout changement de votre vision
- Ballonnements intenses ou sensation de ventre plein
- Douleur à l'estomac qui s'étend jusqu'au dos
- Évanouissement ou convulsions
- Éruption cutanée intense qui entraîne la formation d'ampoules ou la desquamation de la peau

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez : <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>

Remarques

January 2024 Updated "How will this treatment affect sex, pregnancy and breast feeding?" section (Mise à jour de la section « Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement? »)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le « Formulaire ») ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.