

Kadcyla® trastuzumab emtansine

(tras-TOO-zue-mab em-

TAN-seen)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): T-DM1

Présentation: Solution transparente incolore

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour traiter certains types de cancer du sein

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous avez des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez ou avez déjà eu :
 - ◊ des troubles cardiaques, hépatiques ou pulmonaires;
 - ◊ des troubles respiratoires au repos;
 - ◊ des problèmes de saignement;
 - ◊ des problèmes nerveux tels que des engourdissements ou picotements des mains et des pieds;
 - ◊ des allergies.
- Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous avez déjà eu de graves réactions lors d'un traitement avec des produits de trastuzumab (comme Herceptin^{MD}, Herzuma^{MD}, Trazimera^{MD}, Kanjinti^{MD}, Ogivri^{MD}).
- Votre équipe de soins de santé peut réaliser des analyses pour examiner votre fonction cardiaque avant de commencer un traitement. Cela vise à garantir que vous pouvez recevoir Kadcyla^{MD} trastuzumab emtansine en toute sécurité.

N'oubliez pas :

- Informez votre équipe de soins de santé de tout autre médicament que vous prenez.
- Continuez de prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Parlez à votre équipe de soins de santé des sujets suivants :

- Comment ce médicament peut affecter votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament peut affecter votre capacité à avoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce médicament peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ou votre partenaire êtes enceinte, devenez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** simultanément jusqu'à **7 mois** après votre dernière dose.
- N'utilisez pas de contraceptif hormonal (comme la pilule contraceptive), sauf si votre équipe de soins de santé vous indique que vous pouvez le faire en toute sécurité. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la bonne contraception pour vous.
- Vous ne devez pas allaiter pendant ce traitement et pendant au moins **7 semaines** après la prise de votre dernière dose.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté par voie intraveineuse (injecté dans une veine).
- Il est généralement administré tous les 21 jours. Parlez à votre équipe de soins de santé de votre calendrier de traitement.
- Ce médicament est administré (infusé) sur une période plus longue pendant le premier cycle. Si tout se passe bien, il sera administré sur une période plus courte pendant les autres cycles.
- Si vous avez manqué un rendez-vous de traitement, demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagit-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Les interactions peuvent empêcher le traitement de fonctionner ou provoquer de graves effets secondaires.
- Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :
 - médicaments sur ordonnance ou en vente libre (sans ordonnance) et toute autre drogue, comme le cannabis (médical ou récréatif)
 - produits de santé naturelle comme les vitamines, les tisanes, les traitements d'homéopathie et autres suppléments
- Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter tout traitement.

Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- Prenez toujours votre température pour voir si vous avez de la fièvre avant de prendre tout médicament contre la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène [Tylenol^{MD}] ou l'ibuprofène [Advil^{MD}]).
 - La fièvre peut être un signe d'infection nécessitant un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre digital (électronique) à la maison et prenez votre température si vous avez chaud ou mal (par exemple, frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre température buccale est de:
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus à tout moment

OU

 - 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.

Si vous avez de la fièvre :

- **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à la joindre, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence.**
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre mais que vous présentez des symptômes légers comme des maux de tête ou une douleur légère :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel médicament vous convient.
L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou ASA (Aspirin^{MD}), car ils peuvent accroître votre risque de saignement ou interagir avec votre traitement contre le cancer.
- Parlez à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà de **l'aspirine à faible dose** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il se peut que vous puissiez continuer à en prendre en toute sécurité.

À FAIRE pendant ce traitement :

- **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, de subir une opération, une chirurgie dentaire ou toute autre procédure médicale.
- **PARLEZ** à votre équipe de soins de santé de votre risque de développer des troubles cardiaques à la suite de ce traitement.
- **SIGNALEZ** à votre équipe de soins de santé l'apparition de toute nouvelle douleur ou de tout nouvel engourdissement ou fourmillement dans vos mains ou pieds. Cela est d'autant plus important si vous avez du mal à réaliser des tâches (par exemple, fermer des boutons, écrire, marcher) ou si vous ressentez de graves douleurs ou engourdissements.
- **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale. Vous pourriez vous sentir fatigué ou étourdi après votre traitement.

À NE PAS FAIRE pendant ce traitement :

- **NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS** d'alcool pendant ce traitement sans en discuter au préalable avec votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et empêcher votre traitement de fonctionner.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau ci-dessus indique les effets secondaires que vous pourriez rencontrer pendant le traitement au trastuzumab emtansine. Il dresse la liste des effets secondaires des plus fréquents aux moins fréquents. Il est improbable que vous éprouviez tous ces effets secondaires, et vous pourriez en avoir d'autres qui ne sont pas indiqués.

Passez en revue le tableau des effets secondaires pour savoir à quoi vous attendre et quand obtenir de l'aide. Consultez ce tableau si vous rencontrez des effets secondaires pendant votre traitement au trastuzumab emtansine.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou de manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'améliore pas avec le sommeil ou le repos. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Visez 30 minutes d'exercice modéré (vous devez être capable de parler confortablement pendant l'exercice) la plupart des jours. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer toute activité physique. • Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Reportez les activités les moins importantes. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Demandez de l'aide à votre famille ou vos amis avec le ménage, l'épicerie, et les soins des enfants et des animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou autre liquide chaque jour (sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Nausée et vomissements</p> <p>(Généralement légers)</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez aussi avoir la tête qui tourne. • Vous pourriez ressentir de la nausée dans les heures qui suivent votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter une fois qu'elle se manifeste. • Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. <p>En cas de nausées ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments antinauséux de secours (au besoin) comme ils vous ont été prescrits. • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage. • Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Des nausées persistant pendant plus de 48 heures ◦ Des vomissements graves ou persistants pendant plus de 24 heures 	<p>Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures ou s'ils sont graves, communiquez avec votre équipe de soins de santé.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Troubles hépatiques</p> <p>Votre équipe de soins de santé pourrait vérifier votre fonction hépatique au moyen d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne causent généralement pas de symptômes.</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans de rares cas, votre peau ou vos yeux pourraient présenter une coloration jaunâtre, votre urine pourrait devenir foncée et vous pourriez ressentir de la douleur du côté droit de votre abdomen. Cela peut être grave. <p>Que faire?</p> <p>Si vous ressentez des symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>	<p>Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>
<p>Douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires; Maux de tête</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des • légers maux de tête <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opiacés tels que la codéine, morphine, hydromorphone, oxycodone) comme prescrit. • Lisez la section ci-dessus : Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine? Ces médicaments peuvent dissimuler une infection qui nécessite un traitement, ou peuvent aggraver votre risque d'hémorragie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reposez-vous souvent et essayez une activité physique légère (comme la marche), cela pourrait vous aider. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Douleur pour en savoir davantage.</p>	
<p>Faible quantité de neutrophiles (globules blancs) dans le sang (neutropénie)</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Lorsque vous avez peu de neutrophiles, vous risquez de contracter des infections plus facilement. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Neutropénie (faible taux de neutrophiles) pour en savoir davantage.</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> Si vous avez chaud ou mal (par exemple si vous avez des frissons ou une nouvelle toux), vous devez prendre votre température pour voir si vous avez de la fièvre. Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (par exemple, Tylenol^{MD}, acétaminophène, Advil^{MD} ou ibuprofène) Ne consommez pas d'aliments ni de boissons chauds ou froids juste avant de prendre votre température. <p>Vous avez de la fièvre si votre température buccale est de:</p> <ul style="list-style-type: none"> 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. 	<p>Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la joindre pour obtenir des conseils, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous avez un faible taux de neutrophiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavez-vous souvent les mains pour éviter les infections. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale. • Gardez un thermomètre numérique à la maison pour pouvoir prendre votre température facilement. <p>Si vous avez de la fièvre :</p> <p>Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à la joindre, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.</p>	
<p>Faible numération plaquettaire dans le sang</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Lorsque votre taux de plaquettes est faible, vous présentez un risque de saignements et de bleus. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Faible numération plaquettaire pour en savoir davantage.</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surveillez les signes de saignement : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Saignement des gencives ◦ Saignements du nez inhabituels ou importants ◦ Apparition d'ecchymoses plus fréquentes que la normale ◦ Selles de couleur noire, ou sang dans les selles ◦ Toux avec crachat de couleur rouge ou brune 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé en cas de signes de saignement. En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas (saignement important), vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> ○ Étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vision ○ Saignements vaginaux importants ○ Urine de couleur rouge ou rose <p>Que faire?</p> <p>Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous avez une faible numération plaquettaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signalez à votre pharmacien que votre taux de plaquettes peut être faible avant de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous rendre chez le dentiste. • Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents souple. • Éviter les coupures et ecchymoses. • Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités vous pouvez pratiquer en toute sécurité. • Vous pourriez devoir repousser votre traitement si vous avez une faible numération plaquettaire. Votre équipe de soins de santé peut vous recommander une transfusion sanguine. <p>Si vous observez des signes de saignement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de léger saignement, nettoyez la zone à l'aide de savon et d'eau ou de solution de rinçage saline (eau salée). Appliquez une pression pendant au moins 10 minutes. <p>En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas (saignement important), vous devez obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>	

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Neuropathie (fourmillements et engourdissements des orteils ou des doigts)</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez constater des fourmillements ou engourdissements de vos orteils ou vos doigts après le début de votre traitement. • Cela peut être douloureux et donner une sensation de brûlure, qui peut être grave. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parlez-en à votre équipe de soins de santé en cas de symptômes de neuropathie. • Les fourmillements et l'engourdissement peuvent s'améliorer doucement après la fin de votre traitement. <p>Dans de rares cas, ils peuvent se poursuivre longtemps après la fin du traitement. Si vous continuez à ressentir des symptômes gênants, demandez conseil à votre équipe de soins de santé.</p>	<p>Communiquez avec votre équipe de soins de santé, particulièrement si vous avez de la difficulté à accomplir des tâches comme fermer des boutons, écrire, bouger, ou si vous ressentez une douleur ou un engourdissement graves.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Constipation</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des selles moins régulières que la normale. • De petites selles qui ressemblent à des granulés. • Le besoin de pousser fort pour faire sortir les selles. • Des douleurs ou crampes abdominales. • Des ballonnements, la sensation d'être plein, ou inconfortable. • Des fuites de selles liquides. • Beaucoup de gaz ou d'éruclations. • Des nausées et vomissements. <p>Que faire?</p> <p>Pour éviter la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de manger des aliments à haute teneur en fibre comme des fruits, des légumes-feuilles et des céréales complètes. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Soyez actif. L'activité physique peut vous aider à réguler votre transit. • Si vous prenez des opiacés contre la douleur, demandez à votre équipe de santé si manger plus de fibre est adapté. <p>Pour traiter la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis deux ou trois jours, vous pourriez avoir besoin d'un laxatif pour vous aider à avoir un transit régulier. Demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Constipation pour en savoir davantage.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Ulcères buccaux</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des ulcères ronds, douloureux, gris ou blancs peuvent apparaître dans votre bouche sur la langue, les lèvres, les gencives ou à l'intérieur de vos joues. • Dans des cas plus graves, il peut être difficile d'avaler, de manger ou de se brosser les dents. • Ils peuvent durer 3 jours ou plus. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir les ulcères buccaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez soin de votre bouche en vous brossant les dents doucement et en passant de la soie dentaire régulièrement. • Rincez-vous souvent la bouche à l'aide d'un rince-bouche maison. • Pour préparer un rince-bouche maison, mélangez une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 l) d'eau. • N'utilisez pas de rince-bouches vendus dans le commerce, en particulier ceux qui contiennent de l'alcool, car ils peuvent irriter votre bouche. <p>En cas d'ulcères buccaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les aliments chauds, épicés, acidulés, durs ou croquants. • Votre médecin pourrait prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcères buccaux et prévenir l'infection. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez des ulcères buccaux ou sur vos lèvres, ou si vous avez de la difficulté à manger, boire ou avaler. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche soins bucco-dentaires pour en savoir davantage.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez des ulcères buccaux ou sur vos lèvres, ou si vous avez de la difficulté à manger, boire ou avaler.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Toux et essoufflement</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez tousser ou être essoufflé. • Voici des symptômes courants qui accompagnent la toux : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Respiration sifflante ◦ Nez qui coule ◦ Maux de gorge ◦ Brûlures d'estomac ◦ Perte de poids ◦ Frissons et fièvre • Dans de rares cas, elle peut être grave et s'accompagner de douleur dans la poitrine, de difficultés respiratoires, ou de crachat de sang. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez votre température pour voir si vous avez de la fièvre. Lire la section ci-dessus : Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? • Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à la joindre, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence. • Si vous avez une toux grave accompagnée de douleur dans la poitrine, de difficultés respiratoires ou que vous crachez du sang, obtenez une aide médicale immédiatement. 	<p>Communiquez avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à joindre votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils, et que vous avez de la fièvre ou des symptômes graves, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>
<p>Bouche sèche</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez avoir la bouche sèche ou une sensation de bouche ou gorge pâteuse, • Votre salive pourrait être épaisse et filamenteuse. • Vous pourriez avoir les lèvres et les coins de la bouche craquelés. • Vous pourriez avoir de la difficulté à mâcher, avaler ou parler. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consommez de la gomme ou des pastilles sans sucre (comme ceux contenant du xylitol) au besoin pour maintenir l'hydratation de votre bouche. • Consommez de la glace pilée ou des bâtonnets de glace à l'eau sans sucre pour soulager votre bouche sèche. • Rincez-vous souvent la bouche (à intervalles d'une ou deux heures) à l'aide d'un bain de bouche maison. • Pour préparer un rince-bouche maison, mélangez une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 l) d'eau • N'utilisez pas de rince-bouches vendus dans le commerce, en particulier ceux qui contiennent de l'alcool, car ils peuvent assécher votre bouche • Vaporisez votre bouche à l'eau, ou avec des produits de salive artificielle (comme Moi-Stir Spray® ou Biotene®) au besoin pour l'hydrater. • Appliquez un lubrifiant buccal (comme Biotene Oral balance gel®) après vous être brossé les dents, au moment d'aller vous coucher, et au besoin. • Utilisez un vaporisateur à vapeur la nuit pour empêcher votre bouche de s'assécher pendant votre sommeil. • Parlez à votre équipe de soins de santé pour savoir quel produit vous convient. <p>Voyez la fiche soins bucco-dentaires pour en savoir davantage.</p> <p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre bouche sèche ne s'améliore pas ou si les symptômes sont graves.</p>	
<p>Difficulté à dormir</p> <p>Vos médicaments peuvent vous causer de la difficulté à dormir. Cela peut s'améliorer à mesure que votre corps s'habitue au médicament ou quand votre traitement se terminera.</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez avoir de la difficulté à vous endormir ou à rester endormi. • La qualité de votre sommeil peut changer au cours de votre traitement. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Par exemple, vous pourriez mal dormir pendant plusieurs nuits, puis bien dormir la nuit suivante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez vous réveiller trop tôt ou ne pas vous sentir reposé après une nuit de sommeil. • Vous pourriez vous sentir fatigué ou somnolent pendant la journée. <p>Que faire?</p> <p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>	
<p>Diarrhée</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selles molles, liquides, mal formées qui peuvent durer des jours ou des semaines après la fin du traitement. <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez la diarrhée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou vous a conseillé d'en prendre. • Ne mangez pas d'aliments ni de boissons contenant des édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), ni de café ou d'alcool. • Mangez de petits repas et des collations au lieu de deux ou trois gros repas. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Parlez à votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous aurez peut-être besoin de boire des liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, appelés réhydratation par voie orale. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'antidiarrhéique, ou si vous avez la diarrhée plus de 7 fois par jour. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'antidiarrhéique, ou si elle est grave (plus de 7 fois par jour).</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Diarrhée pour en savoir davantage.</p>	
<p>Étourdissements</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez vous avoir des sensations de vertige ou vous évanouir. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allongez-vous immédiatement pour ne pas tomber. • Levez-vous doucement et commencez à bouger une fois que vous vous sentez mieux. • Ne conduisez pas de véhicule à moteur et n'utilisez pas de machines si vous ressentez un étourdissement. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>
<p>Réactions au point d'injection</p> <p>À quoi s'attendre?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau pourrait présenter des rougeurs, démangeaisons, ecchymoses ou des enflures au site d'injection. • Les réactions au point d'injection sont généralement légères et disparaissent en un à trois jours. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parlez-en à votre personnel infirmier immédiatement si vous ressentez des brûlures, des picotements ou autres douleurs au moment de l'injection de trastuzumab emtansine dans votre veine. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vos réactions au site d'injection sont graves ou ne s'améliorent pas. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous rencontrez l'un des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Des douleurs à la poitrine, des évanouissements ou des enflures inattendues au niveau des jambes, des chevilles et du ventre.
- Des symptômes de réaction allergique (pendant l'administration du médicament ou juste après) : rougeur, fièvre, démangeaisons, éruption cutanée, lèvres visage ou langue enflés, oppression de la gorge ou de la poitrine
- Difficulté à penser ou à parler, confusion, changements de personnalité, trouble de la mémoire, convulsions
- Douleur aux yeux, sensibilité à la lumière, vision trouble, ou tout changement à votre vision

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

July 2021 Updated/Revised info sheet

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.