

## Fiche d'information sur les médicaments

**aldesleukine** (all-des-LEU-kine)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

**Autre nom(s):** Proleukin®

**Présentation:** Solution transparente incolore ou jaune pâle mélangée dans les (plus) grands sacs de liquides

**Pourquoi ce médicament est-il utilisé?**

- Pour le traitement des mélanomes

**Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?**

- Si vous avez des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez ou avez déjà eu des troubles pulmonaires ou cardiaques, des troubles du système immunitaire, un psoriasis, une hypothyroïdie, des troubles du rein ou du foie, une infection, une transplantation, des troubles psychiatriques, des convulsions (ou des antécédents de convulsions), la varicelle (ou si vous avez récemment été en contact avec une personne qui avait la varicelle), le zona, ou une allergie, dites-le à votre médecin.
- Les patients atteints d'un cancer sont exposés à des risques plus élevés de développer des caillots sanguins. Certains médicaments contre le cancer peuvent accroître ces risques. Parlez-en avec votre médecin.

**Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?**

- Aldesleukin peut être nocif pour le fœtus. Vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes enceinte. S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même et votre partenaire devez : ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six (6) mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement avec ce médicament.
- Effets sur la fertilité: Inconnu

## Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine.
- Vous recevrez un ou plusieurs médicaments avant l'administration d'aldesleukine pour prévenir les réactions.

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Pour les douleurs légères :
  - ◊ Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
  - ◊ Avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), du naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou de l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), parlez-en à votre équipe de soins de santé étant donné que ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.
  - ◊ Si vous prenez régulièrement de l'aspirine, par exemple en raison d'un trouble cardiaque, vous ne devez pas cesser de le faire sans en parler tout d'abord à votre équipe de soins de santé.
  - ◊ Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre. **Téléphonez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.

## Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires suivants ont été observés chez des patients qui prenaient aldesleukin avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques, et certains de ces effets secondaires peuvent donc être associés à votre chimiothérapie.

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous souffrez d'effets secondaires dérangeants et inhabituels, discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants</b>	
<p><b>Faible tension artérielle (étourdissements, évanouissements), accumulation de liquide dans le corps (gonflement)</b> Peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><b>Diarrhée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut survenir quelques jours à quelques semaines après la dose administrée ou après le début du traitement.</li> <li>• Boire beaucoup de liquides clairs. Éviter les aliments chauds, piquants et frits, les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine et le jus d'orange et de prunes.</li> <li>• Adopter une alimentation faible en fibres (bananes, riz blanc, compote de pommes, rôties faites de pain blanc).</li> <li>• Prendre des médicaments contre la diarrhée si votre médecin vous en donne.</li> <li>• Voir aussi le dépliant sur la diarrhée.*</li> </ul>	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p><b>Nausées et vomissements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent survenir quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et éviter les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer.</li> <li>• Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte.</li> <li>• Prenez des antinauséux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter.</li> <li>• Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre médecin.</li> <li>• Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.*</li> </ul>	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p><b>Toux, essoufflement</b></p>	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p><b>Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons (peuvent être sévères)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Évitez le soleil; appliquez une crème solaire, portez un chapeau et couvrez la peau exposée.</li> <li>• Utilisez un hydratant tous les jours.</li> <li>• <i>Une éruption cutanée sévère peut se produire sur le corps/ membres des cloques ou desquamation de la peau, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence.</i></li> </ul>	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants</b>	
<p><b>Anomalies des épreuves du foie faites en laboratoire</b> (peuvent être severes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre médecin contrôlera périodiquement ces examens. Si votre peau ou vos yeux présentent une coloration jaunâtre ou si la couleur de votre urine devient foncée, communiquez avec votre médecin.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b>Saignements ou bleus inhabituels</b></p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p><b>Fièvre, frissons, infection</b></p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU</b></li> <li>• <b>38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure</b></li> </ul> <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez févreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons).</li> <li>• Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre.</li> <li>• Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température.</li> <li>• Lavez-vous souvent les mains.</li> <li>• Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie ou avant d'aller chez le dentiste.</li> </ul> <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche «<a href="#">Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs)</a> ».</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Effets sur le cerveau</b> (confusion, somnolence, convulsions dans des cas rares)</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants</b>	
<p><b><i>Anomalies des épreuves du rein faites en laboratoire</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre médecin peut surveiller votre fonction rénale régulièrement</li> <li>• Obtenir des soins médicaux d'urgence si vous présentez des signes de problèmes rénaux comme l'enflure du corps, d'une miction faible ou de l'absence d'urine, ou d'un gain de poids récent inhabituel</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b><i>Fatigue</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se reposer souvent, faire une sieste au besoin. Se déplacer lentement au lever.</li> <li>• Manger des repas équilibrés et boire beaucoup de liquides. L'exercice léger peut aider.</li> <li>• Ne pas conduire un véhicule motorisé ni opérer de machinerie lourde si vous vous sentez fatigué.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b><i>Ulcères buccaux</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardez une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les dents régulièrement avec une brosse à soies souples ou une Toothette<sup>MD</sup></li> <li>• Utilisez un rince-bouche sans alcool régulièrement, surtout après les repas.</li> <li>• Essayez de se rincer la bouche avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude : une demie cuillerée à thé dans une tasse (250 mL) d'eau.</li> <li>• Évitez les aliments chauds, épicés, acidulés, durs ou croquants.</li> <li>• Consultez votre médecin ou votre infirmière dès que vous remarquez des ulcères dans la bouche ou sur les lèvres, ou si vous avez du mal à avaler. Votre médecin pourrait prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcères buccaux et prévenir l'infection.</li> <li>• Voyez également le dépliant sur les Soins buccaux.*</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)</p>
<p><b><i>Pertes d'appétit, aucun goût pour la nourriture, perte de poids</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangez des aliments que vous appréciez et tenter de prendre régulièrement de petits repas.</li> <li>• Utilisez des suppléments dans la mesure du possible. Consultez un diététiste.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b><i>Rythme cardiaque irrégulier</i></b></p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères</b>	
<p><b>Problèmes pulmonaires</b> (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><b>Problèmes cardiaques</b> (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure des jambes/chevilles/ventre, essoufflement)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><b>Trouble de saignement ou de coagulation</b> (peut comprendre des saignements de plus d'un site, des bleus, des signes de caillots, des problèmes de reins, de foie et de poumons, de la fièvre, de la confusion)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><b>Réaction allergique</b> (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge; peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><b>Blocage d'une artère</b> (vaisseau sanguin) dans le cœur, le cerveau, la poitrine, l'abdomen ou les membres. Le blocage peut entraîner un <b>accident vasculaire cérébral</b> (perte soudaine de la vue, de la parole ou de l'usage des membres) ou une <b>crise cardiaque</b> (douleurs dans la poitrine, essoufflement) ou des douleurs dans la poitrine, l'abdomen ou les membres</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><b>Rupture de l'estomac ou de la paroi intestinale</b> (Douleur soudaine et intense au ventre ou à proximité de l'estomac)</p> <p><b>Obstruction intestinale</b> (intense douleur au ventre, ballonnements, grave constipation)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p><b>Picotement ou engourdissement des doigts et des orteils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent revenir lentement à la normale après la fin du traitement.</li> <li>• Communiquez avec le médecin ou l'infirmière si vous avez du mal à attacher des boutons, à écrire, à prendre de petits objets, si vous éprouvez de la douleur ou bien des ennuis avec le mouvement.</li> </ul>	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p><b>Problèmes du pancréas</b> (douleur accrue au centre du ventre qui peut irradier au dos, perte d'appétit ou de poids)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères</b>	
<p><b><i>Le fait de tuer des cellules cancéreuses rapidement au commencement du traitement peut mener à une accumulation de déchets cellulaires</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si elle est légère, elle peut causer la goutte, avec des douleurs articulaires, mais si elle est marquée, elle peut causer de la fièvre, une insuffisance rénale et de la confusion, et être potentiellement mortelle.</li> <li>• Vous DEVEZ prendre les médicaments prescrits à titre préventif par votre médecin ET</li> <li>• Boire beaucoup de liquides (6 à 8 verres par jour) et uriner fréquemment.</li> </ul>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b><i>Inflammation des vaisseaux sanguins de la peau</i></b> (taches rouges ou mauves sur la peau) <b><i>ou du cerveau (rare)</i></b></p>	<p>Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)</p>
<p><b><i>Un caillot sanguin</i></b> (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*