



amivantamab

Prononciation: a mih VAN ta mab

Autre nom(s): Rybrevant^{MD}

Présentation: liquide jaune pâle mélangé dans de plus grands sacs de liquide

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

L'amivantamab est utilisé pour traiter un certain type de cancer du poumon appelé cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- des problèmes pulmonaires ou respiratoires;
- des problèmes de peau (comme le psoriasis ou la rosacée);
- des troubles oculaires ou si vous utilisez des lentilles de contact;
- des caillots sanguins (surtout dans vos jambes ou vos poumons);
- des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est administré par voie intraveineuse (injecté dans une veine). Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître le calendrier de votre traitement.
- L'amivantamab peut être administré sur une plus longue période pendant le premier cycle. Si vous ne présentez aucune réaction indésirable au cours de ces perfusions, le médicament sera administré sur une plus courte période pour les cycles suivants.
- Vous recevrez ce traitement avec d'autres médicaments pour aider à prévenir les réactions allergiques ou les éruptions cutanées.
- Si vous avez manqué votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

Autres médicaments qui pourraient être administrés avec ce traitement

Prévention des réactions allergiques

Avant l'administration de votre traitement, des médicaments pourraient vous être prescrits pour prévenir toute réaction allergique.

- Il existe différents types de médicaments pour empêcher les réactions allergiques. Ils sont appelés :
 - antihistaminiques (comme la diphenhydramine ou Benadryl^{MD});
 - analgésiques/antipyrétiques (comme l'acétaminophène ou Tylenol^{MD});
 - corticostéroïdes (comme la dexaméthasone)

Pour prévenir les éruptions cutanées

Des médicaments pourraient vous être administrés pendant votre traitement au moyen d'amivantamab pour prévenir les éruptions cutanées ou pour empêcher leur aggravation.

- Ces médicaments peuvent inclure ceux qui suivent :
 - un corticostéroïde appliqué sur votre peau, comme la crème d'hydrocortisone;
 - un antibiotique, comme la clindamycine (appliquée sur votre peau) ou la doxycycline (prise par voie orale).

À FAIRE pendant le traitement



- ✓ CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner ou opérer, avant de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- ✓ PENSEZ À DEMANDER à quelqu'un de vous conduire à l'hôpital puis de vous ramener chez vous les jours de traitement. Vous pourriez ressentir une somnolence ou des étourdissements après votre traitement.
- ✓ PROTÉGEZ votre peau du soleil. Portez une chemise à manches longues, un pantalon et un chapeau. Appliquez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30. Votre peau pourrait être plus sensible au soleil, ce qui pourrait précipiter l'apparition de gros coups de soleil ou d'éruptions cutanées. Vous devrez le faire pendant le traitement et pendant les deux mois suivants votre traitement.
- ✓ APPLIQUEZ des hydratants régulièrement sur votre peau et vos ongles pendant le traitement et pendant les deux mois suivants la fin du traitement. Assurez-vous d'utiliser un émollient (comme une crème ou une pommade) qui est sans alcool et sans parfum.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- ✗ NE PRENEZ PAS d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre (sans ordonnance) ou des substances, ou bien des produits de santé naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ NE COMMENCEZ PAS de traitements complémentaires ou parallèles, comme l'acupuncture ou des produits homéopathiques sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ N'UTILISEZ PAS de produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- ✗ NE conduisez PAS et n'utilisez pas de machines si votre vision est floue ou altérée de quelque manière que ce soit.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Bien que ce médicament soit peu susceptible d'interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments, médicaments traditionnels et produits de santé naturels, informez votre équipe de soins de santé de tous les éléments suivants :

- des médicaments avec ordonnance et en vente libre (sans ordonnance);
- toute autre drogue ou substance, comme le cannabis ou la marijuana (médicale ou récréative);
- des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments ou des médicaments traditionnels.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un de ces produits.



Consultez votre équipe de soins de santé AVANT de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Médicaments traditionnels
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues et substances, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps
- OU
- 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirine^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- La façon dont ce traitement pourrait influer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce traitement pourrait influer sur votre fertilité (capacité à concevoir un enfant), si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour un enfant à naître. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et au moins jusqu'à **trois mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- Ne faites pas de don de sperme pendant le traitement et jusqu'à **trois mois** après la dernière dose.
- N'allaitez pas durant ce traitement et pendant au moins **trois mois** après votre dernière dose.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez avoir lorsque vous recevez un traitement au moyen d'amivantamab. Ce tableau les énumère des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas recensés.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour connaître les symptômes auxquels vous devez prêter attention et pour connaître le moment de demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous suivez un traitement au moyen de l'amivantamab.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Éruption cutanée, peau sèche et démangeaisons (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certaines zones de votre peau pourraient être rugueuses, craquelées ou desquamées. • Vous pourriez voir apparaître des rougeurs et avoir une sensation de chaleur, comme après un coup de soleil. • Vous pourriez avoir des sensations de démangeaisons, de brûlures, de piqûres ou de sensibilité extrême au toucher de la peau. <p>Que faire?</p> <p>Prévention et traitement de la peau sèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une crème hydratante sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez une protection solaire contre les rayons UVA et UVB avec un indice de facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez chaque jour six à huit tasses de liquides sans alcool et sans caféine, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. <p>Poursuivez cette routine de soins de la peau pendant les deux mois suivant la fin de votre traitement.</p>	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Dans de rares cas, l'éruption cutanée peut être grave et peut faire cloquer ou peler votre peau. Si c'est le cas, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	
<p>Réaction allergique</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> De la fièvre, des démangeaisons, une éruption cutanée, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement dans la poitrine ou dans la gorge. Cela peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration de votre traitement et cela peut être grave. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informez immédiatement votre infirmière si vous ressentez des signes de réaction allergique pendant ou juste après votre traitement. Consultez votre équipe de soins de santé si vous présentez une légère réaction cutanée 	En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence.
<p>Changements au niveau des ongles</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Voici les effets secondaires qui peuvent se manifester : <ul style="list-style-type: none"> des changements de couleur des ongles; de la douleur, de la sensibilité ou de l'enflure autour des ongles; le décollement des ongles. Les ongles reprendront lentement leur apparence normale après la fin du traitement. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Hydratez vos ongles et vos cuticules. Continuez à le faire pendant les deux mois suivant la fin de votre traitement. N'utilisez pas de vernis à ongles ni d'ongles artificiels jusqu'à ce que vos ongles reprennent leur apparence normale. Portez des gants lorsque vous faites le ménage ou du jardinage. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Maux de tête, douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires ou sensation de douleur généralisée. • Maux de tête légers. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments contre la douleur comme de l'acétaminophène au besoin ou selon votre prescription (opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone). • Lisez la section ci-dessus : « Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? » avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui nécessite un traitement ou aggraver votre risque d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider. <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Douleur.</p> <p>Si vous présentez soudainement des maux de tête graves, obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence.</p>	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
<p>Faibles taux d'albumine dans votre sang</p> <p>L'albumine est une protéine présente dans le sang. Elle aide à maintenir la pression dans les vaisseaux sanguins et à faire circuler des substances, comme les hormones et les médicaments, dans votre corps. Votre équipe de soins de santé peut vérifier vos taux d'albumine au moyen d'un test sanguin. Un faible taux d'albumine peut ne pas causer de symptômes à moins qu'il ne soit très faible.</p>	Si vous avez l'un de ces symptômes, parlez à votre équipe de soins de santé. Si vous avez des ballonnements abdominaux, obtenez des soins

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatigue (sensation de fatigue) • Faiblesse ou crampes musculaires • Perte d'appétit • Enflure des chevilles ou des jambes • Gonflement de l'abdomen (si vous avez également des problèmes de foie) <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez l'un de ces symptômes, parlez à votre équipe de soins de santé. Si vous avez des ballonnements abdominaux, obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>	médicaux d'urgence sans délai.
<p>Fatigue</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou de manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) presque tous les jours. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à votre famille ou à vos amis de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage ou pour s'occuper des enfants et animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins six à huit verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a recommandé d'en boire plus ou moins). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué. 	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
<p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Fatigue.</p>	

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Légères enflures</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez constater une légère enflure ou bouffissure au niveau des bras et des jambes. Dans de rares cas, ces symptômes peuvent être graves. <p>Que faire?</p> <p>Prévention des enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mangez des aliments peu salés. <p>En cas d'enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> Portez des vêtements amples. Pour les jambes et pieds enflés, élévez vos pieds quand vous êtes assis. 	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
<p>Ulcères buccaux</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ulcères ronds et douloureux, blancs ou gris à l'intérieur de votre bouche qui peuvent survenir sur la langue, les lèvres ou à l'intérieur de vos joues. Dans les cas plus graves, il peut être difficile de déglutir, de manger ou de vous brosser les dents. Ils peuvent perdurer pendant trois jours ou plus. <p>Que faire?</p> <p>Prévention des ulcères buccaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez soin de votre bouche en vous brossant les dents doucement et en passant la soie dentaire régulièrement. Rincez souvent votre bouche avec un rince-bouche maison. Pour faire un rince-bouche maison, mélangez 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1 cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 l) d'eau. N'utilisez pas de rince-bouche commerciaux pour ne pas vous abîmer la bouche, surtout ceux qui contiennent de l'alcool. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez un ulcère buccal, une lésion à la lèvre ou si cela fait mal de manger, boire ou avaler.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Si vous avez des ulcères buccaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les aliments chauds, épicés, acides, durs ou croustillants. • Votre médecin peut vous prescrire un rince-bouche spécial pour atténuer les ulcères buccaux et prévenir les infections. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez un ulcère buccal ou une lésion à la lèvre ou si cela fait mal de manger, boire ou avaler. <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Santé orale (soins de la bouche).</p>	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Nausées et vomissements</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez également vous sentir étourdi. • Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter. • Si on vous a donné des médicaments antinauséeux, prenez-les selon ce qui a été prescrit, même si vous n'avez pas envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. 	Contactez votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>En cas de nausée ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments antinauséeux (au besoin) selon ce qui a été prescrit. • Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée <u>Nausée et vomissements</u>. • Parlez à votre équipe de soins de santé si : <ul style="list-style-type: none"> ◦ la nausée persiste au-delà de 48 heures; ◦ les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures. 	
<p>Constipation</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Défécation moins fréquente qu'à l'accoutumée. • Selles dures et petites comme des boulettes. • Nécessité de pousser fort et de faire un effort pour expulser des selles. • Maux ou crampes d'estomac. • Ventre ballonné, sensation de ventre plein ou d'inconfort. • Fuites de selles liquides. • Éructations et flatulences importantes. • Nausées ou vomissements. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangez plus d'aliments riches en fibres comme les fruits avec la peau, les légumes-feuilles et les céréales entières. • Buvez au moins six à huit tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. • Soyez actif. Une activité physique peut vous aider à aller régulièrement à la selle. • Si vous prenez des médicaments opioïdes contre la douleur, demandez à votre équipe de soins de santé si vous pouvez manger plus de fibres. 	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Traitement de la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis deux à trois jours, vous aurez peut-être besoin de prendre un laxatif (un médicament qui vous aidera à aller à la selle). Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous pouvez faire. <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Constipation.</p>	
<p>Quantité excessive ou insuffisante de sel dans votre corps</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Spasmes musculaires, crampes, faiblesse, contractions musculaires ou convulsions. Battements de cœur irréguliers, confusion ou changements de tension artérielle. <p>Que faire?</p> <p>En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence.
<p>Toux et essoufflement</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pourriez présenter une toux et vous sentir essoufflé. Voici les symptômes habituellement associés à la toux : <ul style="list-style-type: none"> respiration sifflante ou enrouée; écoulement nasal; maux de gorge; brûlures d'estomac; perte de poids; fièvre et frissons. Dans de rares cas, ces symptômes peuvent être graves et associés à une douleur dans la poitrine, à des difficultés respiratoires ou à une expectoration contenant du sang suite à une toux. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, et que vous faites de la fièvre ou avez de graves symptômes, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez votre température pour savoir si vous avez de la fièvre. Lisez la section ci-dessus : « Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? » • Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir des soins médicaux d'urgence. • Si vous présentez une toux grave accompagnée de douleurs à la poitrine, de difficultés respiratoires ou que vous expectorez du sang suite à une toux, obtenez immédiatement des soins médicaux. 	
<p>Troubles hépatiques</p> <p>Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre fonction hépatique à l'aide d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne causent habituellement aucun symptôme.</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans de rares cas, vous pouvez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Ces signes peuvent être graves. <p>Que faire?</p> <p>En cas de symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence.</p>	Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.
<p>Perte d'appétit</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perte d'intérêt pour la nourriture et aucune sensation de faim. • Perte de poids. 	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Essayez de manger vos aliments préférés. Mangez de petits repas tout au long de la journée. Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids. Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Perte d'appétit.</p>	
<p>Diarrhée</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou les semaines suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez la diarrhée :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé. Évitez les aliments ou boissons avec édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool jusqu'à ce que la diarrhée cesse. Mangez plusieurs petits repas au lieu de deux ou trois gros repas. Buvez au moins six à huit tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire six à huit tasses de liquides par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, procédé appelé réhydratation par voie orale. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de sept fois par jour). <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Diarrhée.</p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de sept fois par jour).

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Troubles oculaires</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vos yeux peuvent être secs, irrités ou douloureux. • Ils peuvent être rouges et larmoyants. • Ils peuvent être sensibles à la lumière. • Votre vision peut être floue ou elle peut présenter des changements. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrêtez de porter des lentilles de contact. • Portez des lunettes de soleil avec protection contre les rayons UV. • Utilisez des lunettes de protection (lunettes ou casque avec visière) lorsque vous pratiquez des sports, tondez la pelouse ou faites quoi que ce soit qui pourrait projeter des particules ou des vapeurs dans vos yeux. • Vous pouvez essayer des larmes artificielles (gouttes pour les yeux) ou de la pommade. • Votre équipe de soins de santé peut vous envoyer consulter un spécialiste des yeux (ophtalmologiste) si vous présentez de nouveaux symptômes oculaires ou si ceux-ci s'aggravent. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus vite possible (aux heures d'ouverture).

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé contre le cancer ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- douleur, enflure et durcissement d'une veine dans vos jambes ou vos bras.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

December 2025 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.