

## Fiche d'information sur les médicaments

**anagrélide** (an-AG-gré-lide)

*Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.*

**Autre nom(s):** Agrylin®

**Présentation:** capsule

**Pourquoi ce médicament est-il utilisé?**

- Pour le traitement d'une affection caractérisée par un nombre excessif de plaquettes dans le sang. Les plaquettes contribuent à la coagulation du sang.

**Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?**

Dites à votre médecin ou pharmacien si vous avez ou avez eu déjà eu:

- des troubles de foie,
- des reins,
- des poumons,
- des troubles cardiaques (notamment une irrégularité des pulsations cardiaques),
- de faibles concentrations de sel (par exemple, potassium, magnésium, calcium) dans votre sang
- des allergies
- Ce médicament contient une petite quantité de lactose. Si vous ne pouvez pas tolérer le lactose, parlez-en à votre équipe de soin de santé.
- Chez les patients produisant trop de plaquettes, le risque de formation de caillots de sang ou de développement de certains types de cancers est accru. Certains traitements peuvent accroître ce risque. Discutez-en avec votre équipe de soins de santé.

## Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a **un risque** que vous-même ou votre partenaire puissiez être enceinte, vous devez:
- ► **Vous devez utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer d'utiliser des méthodes de contraception pendant au moins **six mois** après votre dernière dose, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. Pour choisir les meilleures méthodes pour vous ou votre partenaire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez ce médicament.
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

## Comment ce médicament est-il donné?

- Avalez en entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Vous ne devez pas écraser ni ouvrir les capsules.
- Si vous oubliez une dose, sautez cette dose et prenez la dose suivante tel que prévu. Ne prenez pas une dose supplémentaire pour compenser la dose oubliée.
- Prenez exactement tel que prescrit par votre docteur. Assurez-vous que vous comprenez les instructions.
- Anagrelide se prend généralement plusieurs fois par jour.

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Pour les douleurs légères:

- Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
  - L'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), le naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie.
  - Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
  - Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre.
  - **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.
  - Vous ne devez pas manger ou boire de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville, étant donné qu'ils peuvent accroître la quantité de médicament dans votre sang et augmenter les effets secondaires.

## Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison aucun médicament non utilisé. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

## Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quand contacter un médecin?                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| <b>Maux de tête, douleurs légères dans les articulations, douleurs ou crampes musculaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin.</li> <li>• Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>),</li> </ul> | Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave |

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/informed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.

August 2017

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quand contacter un médecin?                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| <p>contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (AdvilMD, MotrinMD), du naproxène (AleveMD) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.</li> <li>• Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <p><b>Diarrhées</b></p> <p>Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement.</p> <p><b>Si vous avez des diarrhées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit.</li> <li>• Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. gomme à mâcher, boissons « diète », café et alcool).</li> <li>• Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas.</li> <li>• Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Diarrhées</a> pour en savoir davantage.*</p> | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p> |
| <p><b>Rythme cardiaque élevé ou irrégulier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informez immédiatement votre équipe de soins de santé et demandez immédiatement des soins médicaux d'urgence</b> si votre rythme cardiaque est irrégulier ou anormalement rapide, ou si vous ressentez une gêne ou une douleur à la poitrine, un essoufflement grave, si vous avez l'impression de vous évanouir (perte de connaissance) ou si vous vous sentez très étourdi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>                         |

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quand contacter un médecin?                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| <b>Fatigue</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux.</li> <li>• Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé.</li> <li>• Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin.</li> <li>• Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage).</li> <li>• Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Fatigue</a> pour en savoir davantage.*</p> | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p> |
| <b>Gonflement léger dans les bras et les jambes</b> <p><b>Pour prévenir le gonflement léger :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoptez une alimentation à faible teneur en sel.</li> <li>• Évitez les vêtements serrés.</li> </ul> <p><b>Si vous présentez un gonflement dans les jambes</b>, gardez vos pieds élevés quand vous êtes assis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p> |
| <b>Douleurs ou crampes dans l'abdomen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous souffrez de constipation ou de diarrhées, elles peuvent provoquer des douleurs dans votre abdomen.</li> <li>• Si la douleur est grave et si elle s'accroît ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les autres causes possibles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p> |
| <b>Nausées et vomissements (généralement légers)</b> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement.</p> <p><b>Si vous avez des nausées ou des vomissements:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous.</li> <li>• Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p> |

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quand contacter un médecin?                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool.</li> <li>• Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé.</li> </ul> <p>Voir également la fiche <a href="#">Nausées et vomissements</a> pour en savoir davantage.*</p>                                      |                                                                         |
| <b>Étourdissements</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pourrez vous sentir la tête légère.</li> <li>• En cas d'étourdissements, étendez-vous.</li> <li>• Relevez-vous et déplacez-vous lentement quand vous vous sentirez mieux.</li> <li>• Vous ne devez pas conduire un véhicule moteur ni utiliser de la machinerie si vous vous sentez étourdi.</li> </ul>                                                     | Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave |
| <b>Toux, essoufflement</b> <p>Vous pourrez présenter une toux et vous sentir essoufflé sans aucun signe d'infection, par exemple des maux de gorge ou une congestion nasale.</p> <p><b>Dans de rares cas, ces effets secondaires peuvent être graves et s'accompagner de douleurs thoraciques, de difficulté à respirer ou de crachats de sang. Si cela se produit, demandez immédiatement des soins médicaux d'urgence.</b></p> | Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave |
| <b>Gaz</b> <p>Vous pourrez présenter un gonflement, des douleurs dans l'abdomen et avoir des gaz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave |

**D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:**

- une coloration jaunâtre de la peau ou des yeux, urine plus foncée ou des douleurs du côté droit de l'abdomen
- un gonflement des jambes, des chevilles et de l'abdomen; des douleurs dans la poitrine qui peuvent se propager aux bras
- des douleurs, un gonflement et le durcissement d'une veine dans un bras ou une jambe
- la diminution ou l'interruption du débit urinaire ou un gain de poids inhabituel
- des épisodes de confusion et présenter une perte soudaine de la vue ou des difficultés à utiliser vos bras ou vos jambes

- vomir du sang ou ce qui ressemble à des grains de café
- des selles noires ou comportant du sang rouge

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*