

belzutifan

Prononciation: bell-ZOO-ti-fan

Autre nom(s): Welireg^{MD}

Présentation: comprimé

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

Le belzutifan est utilisé pour traiter certains types de cancers du rein ou du pancréas.

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Informez votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des problèmes de santé majeurs comme :

- des problèmes pulmonaires ou cardiaques;
- de faibles niveaux d'oxygène dans le sang;
- de faibles niveaux de globules rouges (anémie);
- des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est habituellement pris par voie orale une fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé comment et quand vous devez prendre votre médicament.
- Avalez les comprimés entiers avec un grand verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Évitez d'écraser, de mâcher ou de diviser les comprimés de belzutifan.
- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le même jour. Ensuite, prenez votre prochaine dose comme prévu le lendemain. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, ne répétez pas la dose. La prochaine dose doit être prise le lendemain.

Mise en garde: Si vous prenez trop de ce médicament, par accident, ou si vous soupçonnez un enfant ou un animal de compagnie d'avoir ingéré votre médicament, appelez immédiatement le centre antipoison de l'Ontario au 1 800 268-9017.

À FAIRE pendant le traitement

- ✓ **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner ou opérer, avant de recevoir des soins dentaires ou encore avant toute autre intervention médicale.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- × **NE PRENEZ PAS** d'autres médicaments comme des vitamines, des médicaments en vente libre (vendus sans ordonnance) ou des produits de santé naturels sans avoir consulté votre équipe de soins de santé.
- × **NE COMMENCEZ PAS** de traitements complémentaires ou alternatifs, comme l'acupuncture ou des médicaments homéopathiques sans consulter votre équipe de soins de santé.
- × **NE CONSOMMEZ PAS** les produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou **NE BUVEZ PAS** d'alcool pendant votre traitement sans avoir consulté votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- × **NE CONDUISEZ PAS, N'UTILISEZ PAS** de machines et **N'EFFECTUEZ AUCUNE** tâche qui nécessite d'être attentif et vigilant si vous avez des vertiges.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Oui, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments, médicaments traditionnels et produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer de graves effets secondaires.

Informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :

- des médicaments délivrés sur ordonnance (vendus sans ordonnance) et en vente libre (vendus sans ordonnance);
- toute autre drogue ou substance, comme le cannabis ou la marijuana (à des fins thérapeutiques ou récréatives);
- des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments ou des médicaments traditionnels.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'usage de l'un de ces produits.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Médecines traditionnelles
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - ◊ La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - ◊ Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - ◊ 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps
- OU
- ◊ 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirine^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Consultez votre équipe de soins de santé au sujet de :

- la façon dont ce traitement pourrait avoir des effets sur votre santé sexuelle;
- la façon dont ce traitement pourrait avoir des effets sur votre capacité à concevoir un enfant, le cas échéant.

Ce traitement peut être nocif pour un fœtus. Consultez votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez simultanément utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** pendant au moins **1 semaine** après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé afin de connaître les meilleures solutions contraceptives qui s'appliquent à votre cas.
- Ce traitement peut réduire l'efficacité de la contraception hormonale, comme la pilule contraceptive. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé afin de connaître les meilleures solutions contraceptives qui s'appliquent à votre cas.
- N'allaitez pas pendant ce traitement et pendant au moins **1 semaine** après la prise de votre dernière dose.

Comment dois-je conserver et manipuler les médicaments de ce traitement en toute sécurité?

- Conservez les comprimés de belzutifan à température ambiante, dans leur emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Gardez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas les comprimés de belzutifan non utilisés dans votre domicile. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Comment toucher votre médicament oral contre le cancer en toute sécurité?

Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.
- Avalez chaque comprimé en entier. N'écrasez pas et ne mâchez pas les comprimés.

Si vous êtes un aidant :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas touché le médicament.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.
- Ne touchez pas les médicaments oraux contre le cancer si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

Que faire si le médicament entre en contact avec votre peau ou vos yeux?

En cas de contact avec la peau :

- Lavez votre peau avec beaucoup d'eau et de savon.
- Si votre peau rougit ou devient irritée, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

En cas de contact avec les yeux :

- Rincez immédiatement vos yeux à grande eau. Laissez l'eau s'écouler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du belzutifan. Ce tableau les énumère des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas recensés.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour connaître les symptômes auxquels vous devez prêter attention et pour savoir à quel moment demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez du belzutifan.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Anémie (diminution du nombre de globules rouges)</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez vous sentir plus fatigué ou plus faible que d'habitude. • Votre peau sera pâle et vos mains et vos pieds seront froids. • Vous pourriez vous sentir essoufflé ou étourdi. • Cela peut se produire entre quelques jours et quelques semaines après le début du traitement. <p>Que faire?</p> <p>Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez de l'anémie (un faible taux de globules rouges) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reposez-vous souvent et ayez une bonne alimentation. • Des exercices légers, comme la marche, peuvent aider. • Vous aurez peut-être besoin de médicaments ou d'une transfusion sanguine. • Si c'est très grave, votre médecin pourrait devoir apporter des modifications à votre régime de traitement. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou de absence d'énergie qui dure longtemps et ne baisse pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) presque tous les jours. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Évitez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage, ou pour s'occuper des enfants et des animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins six à huit verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a recommandé d'en boire plus ou moins). • Évitez de conduire ou de faire fonctionner des machines si vous êtes fatigué. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Fatigue pour obtenir de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>Douleurs articulaires ou musculaires légères, crampes ou maux de tête</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires, ou sensation de douleur généralisée. • Légers maux de tête. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. • Lisez la section ci-dessus : « Que faire si vous vous sentez mal, si vous avez des douleurs, si vous avez des maux de tête ou si vous faites de la fièvre? » avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui nécessite un traitement ou aggraver votre risque d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider. <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Douleur.</p>	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Légères enflures</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez constater une légère enflure ou bouffissure au niveau des bras et des jambes. Dans de rares cas, elles peuvent être graves. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Prévention des enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangez des aliments peu salés. <p>En cas d'enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portez des vêtements amples. • Pour les jambes et pieds enflés, élevez vos pieds quand vous êtes assis. 	
<p>Nausées et vomissements</p> <p>(Ces symptômes sont d'habitude légers)</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez également avoir des vertiges. • Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter. • Si on vous a donné des médicaments antinauséeux, prenez-les selon ce qui a été prescrit, même si vous n'avez pas envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et prenez des repas légers. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>En cas de nausée ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments antinauséux (au besoin) selon ce qui a été prescrit. • Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Nausée et vomissements. • Consultez votre équipe de soins de santé si : <ul style="list-style-type: none"> ◦ la nausée persiste au-delà de 48 heures; ◦ les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures. 	
<p>Constipation</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selles moins fréquentes que d'habitude. • Selles dures et sous forme de boulettes. • Nécessité de pousser fort et de faire un effort pour faire sortir les selles. • Maux ou crampes d'estomac. • Ventre ballonné, sensation de trop-plein ou inconfort. • Écoulement de selles liquides. • Érucations et flatulences importantes. • Nausées ou vomissements. <p>Que faire?</p> <p>Prévention de la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangez plus d'aliments riches en fibres comme les fruits avec la peau, les légumes-feuilles et les céréales entières. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquides par jour, sauf avis contraire de votre équipe de soins de santé. • Soyez actif. Une activité physique peut vous aider à aller régulièrement à la selle. • Si vous prenez des opioïdes antidouleurs, demandez à votre équipe de soins de santé si vous pouvez manger plus de fibres. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Traitement de la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis 2 à 3 jours, vous aurez peut-être besoin de prendre un laxatif (un médicament qui vous aidera à aller à la selle). Prenez conseil auprès de votre équipe de soins de santé <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Constipation pour obtenir de plus amples renseignements.</p>	
<p>Toux et essoufflement</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez avoir la toux et une sensation d'essoufflement. • Les symptômes généralement liés à la toux sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ◦ respiration sifflante ou souffle court; ◦ écoulement nasal; ◦ maux de gorge; ◦ brûlures d'estomac; ◦ perte de poids; ◦ fièvre et frissons. • Dans de rares cas, ces symptômes peuvent être graves et liés à une douleur dans la poitrine, à des difficultés respiratoires ou à une expectoration contenant du sang suite à une toux. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez votre température pour savoir si vous faites de la fièvre. Lisez la section ci-dessus : « Que faire si vous vous sentez mal, si vous avez des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? » • En cas de fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement solliciter de l'aide médicale d'urgence. • Si vous avez une toux grave avec une douleur dans la poitrine, si vous avez des difficultés respiratoires ou si vous tousez du sang, sollicitez immédiatement de l'aide médicale. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, et si vous faites de la fièvre ou si avez de graves symptômes, vous DEVEZ immédiatement obtenir de l'aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Manque d'appétit</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perte d'intérêt pour la nourriture ou absence de sensation de faim. • Perte de poids. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez des repas légers tout au long de la journée. • Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids. • Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Perte d'appétit pour obtenir de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>De faibles niveaux d'oxygène dans le corps (hypoxie)</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Votre équipe de soins de santé surveillera régulièrement vos niveaux d'oxygène.</p> <p>Dans certains cas, votre équipe de soins de santé peut vous demander de vérifier vos niveaux d'oxygène à la maison à l'aide d'un oxymètre (un petit appareil en forme de pince habituellement fixé à l'extrémité de votre doigt). Consultez votre équipe de soins de santé afin de comprendre les niveaux d'oxygène qui sont normaux pour vous et les niveaux qui peuvent être trop bas.</p>	<p>Obtenez immédiatement de l'aide médicale d'urgence si vous n'êtes pas en mesure de joindre votre équipe de soins de santé ou si vous êtes confus et que ces symptômes ne disparaissent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voici les symptômes qui se produisent habituellement : <ul style="list-style-type: none"> ◦ essoufflement; ◦ respiration rapide; ◦ douleur thoracique (à la poitrine); ◦ étourdissement; ◦ acouphènes. <p>Que faire?</p> <p>Si vous présentez des symptômes de faibles niveaux d'oxygène, essayez de consulter votre équipe de soins de santé.</p> <p>Sollicitez immédiatement de l'aide médicale d'urgence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si vous n'êtes pas en mesure de parler à votre équipe de soins de santé; • si vous êtes confus et que ces symptômes ne disparaissent pas. Cela pourrait être un signe d'hypoxie grave. 	
<p>Étourdissements</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez vous sentir étourdi ou sur le point de vous évanouir. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allongez-vous pour éviter de tomber. • Levez-vous et commencez à bouger doucement une fois que vous vous sentez mieux. • Ne conduisez pas et ne faites pas fonctionner des machines si vous vous sentez étourdi. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Diarrhée</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou les semaines qui suivent votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez la diarrhée :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé. Évitez les aliments ou boissons ayant des édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool, jusqu'à ce que la diarrhée cesse. Mangez plusieurs repas légers au lieu de deux ou trois gros repas. Buvez au moins six à huit tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire six à huit tasses de liquides par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, procédé appelé réhydratation par voie orale. Consultez votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de sept fois par jour). <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Diarrhée pour obtenir de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de sept fois par jour).</p>
<p>Maladies du foie</p> <p>Votre équipe de soins de santé peut vérifier l'état de votre fonction hépatique à l'aide d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne causent d'habitude aucun symptôme.</p>	<p>Obtenez immédiatement de l'aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans de rares cas, vous pouvez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines anormalement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Ces signes peuvent être graves. <p>Que faire?</p> <p>En cas de symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence.</p>	
<p>Saignement; faible numération plaquettaire</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Lorsque la numération plaquettaire est faible, vous courez un risque de saignements et d'hématomes. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Faible numération plaquettaire pour obtenir de plus amples renseignements.</p> <p>Quels sont les signes à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surveillez attentivement les signes de saignements : <ul style="list-style-type: none"> ◦ saignements des gencives; ◦ saignements du nez inhabituels ou abondants; ◦ apparition d'hématomes supérieure à la normale; ◦ selles de couleur noire, ou sang dans les selles; ◦ mucus rouge ou brun quand vous toussiez; ◦ étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vue; ◦ saignements vaginaux abondants; ◦ urine de couleur rouge ou rose. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous avez des signes de saignement. En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas, vous DEVEZ immédiatement obtenir de l'aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez une faible numération plaquettaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indiquez à votre pharmacien que votre numération plaquettaire peut être faible avant de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous rendre chez le dentiste. • Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents souple. • Essayez d'éviter les coupures et hématomes. • Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités conviennent à votre situation. <p>Si vous avez des signes de saignement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous saignez un peu, nettoyez la zone au savon et à l'eau ou à l'aide d'une solution saline de rinçage. Exercez une pression sur la zone de saignement pendant au moins 10 minutes. <p>Si vous avez un saignement grave (très abondant) ou qui ne s'arrête pas, vous devez immédiatement solliciter de l'aide médicale d'urgence.</p>	

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- yeux qui semblent secs, qui sont irrités, douloureux, sensibles à la lumière ou vision floue;
- douleur, au niveau d'une veine; enflure et durcissement d'une veine.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

July 2025 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.