

## Fiche d'information sur les médicaments

**bicalutamide** (bi-ca-lu-ta-mide)

*Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.*

**Autre nom(s):** Marques génériques disponibles, Casodex<sup>MD</sup>

**Présentation:** comprimé

**Pourquoi ce médicament est-il utilisé?**

- Ce médicament est administré seul ou en association avec d'autres pour le traitement du cancer de la prostate.

**Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?**

- Informez votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez déjà eu des troubles de santé importants, plus particulièrement:
  - ◊ un diabète,
  - ◊ des poumons ou du foie
  - ◊ perte de la densité osseuse ou ostéoporose
  - ◊ irrégularité des pulsations cardiaques ou problèmes cardiaques
  - ◊ ou si vous avez des allergies
- Ce médicament contient une petite quantité de lactose. Si vous ne pouvez pas tolérer du lactose, parlez à votre docteur.
- Les patients atteints d'un cancer sont exposés à des risques plus élevés de développer des caillots sanguins. Certains médicaments contre le cancer peuvent accroître ces risques. Parlez-en avec votre médecin.

**N'oubliez pas de:**

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

avril 2024

Page 1 of 10

## Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- Bien que cela puisse ne pas vous concerner, s'il y a **une possibilité** que votre partenaire puisse devenir enceinte, vous-même et votre partenaire devez :
  - Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer d'utiliser des méthodes de contraception pendant au moins **130 jours** après votre dernière dose, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. Pour choisir les meilleures méthodes pour vous ou votre partenaire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Informez votre équipe de soins de santé si votre partenaire est enceinte ou devient enceinte pendant le traitement au bicalutamide.
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

## Comment ce médicament est-il donné?

- Prenez exactement tel que prescrit par votre médecin.
- Avalez en entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Vous ne devez pas écraser ni mâcher les comprimés.
- Si vous oubliez une dose, sautez cette dose et prenez la dose suivante tel que prévu. Ne prenez pas une dose supplémentaire pour compenser la dose oubliée.
- Le bicalutamide est généralement pris une fois par jour, à peu près au même moment de la journée.
- La consommation d'alcool pendant la prise de bicalutamide peut produire des bouffées de chaleur faciale excessives. Si cet effet vous incommode, évitez de boire de l'alcool.

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- **Pour les douleurs légères ou la fièvre:**
  - Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre des médicaments pour les douleurs ou la fièvre. Ils peuvent masquer la fièvre.
  - Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
  - L'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), le naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

## Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison aucun médicament non utilisé. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

## Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quand contacter un médecin?                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Effets Secondaires Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| <p><b>Bouffées ou sensation de chaleur</b></p> <p>Vous pourrez transpirer davantage et avoir de la difficulté à dormir en raison de cet effet secondaire.</p> <p><b>Pour prévenir les bouffées de chaleur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Évitez les déclencheurs comme les aliments épicés, l'alcool et la caféine (thé, café et boissons gazeuses).</li> <li>• Faites régulièrement de l'exercice. Avant de commencer à faire de nouveaux exercices, demandez à votre équipe de soins de santé quels sont les exercices appropriés pour vous.</li> <li>• Il peut être utile de cesser de fumer.</li> </ul> <p><b>Si vous avez des bouffées de chaleur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restez au frais, portez des vêtements légers ou en plusieurs couches que vous pouvez retirer facilement et buvez beaucoup de liquide sauf si on vous a demandé de ne pas le faire.</li> </ul> <p>Les bouffées de chaleur pourront diminuer avec le temps. Si cet effet vous incommoder, parlez-en à votre équipe de soins de santé.</p> <p><b>Autres symptômes provoqués par la baisse de la concentration de testostérone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminution de la fonction ou du désir sexuel</li> <li>• Gonflement et sensibilité des seins</li> <li>• Diminution de l'énergie</li> <li>• Modifications de l'humeur, dépression</li> <li>• Perte de la densité osseuse et risque de fracture accru</li> </ul> <p>Si ces sensations vous incommode, parlez-en à votre équipe de soins de santé.</p> | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p> |

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

avril 2024

Page 4 of 10

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quand contacter un médecin?                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| <b>Maux de tête, douleurs légères dans les articulations, douleurs ou crampes musculaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin.</li> <li>• Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>), contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous.</li> <li>• Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), du naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.</li> <li>• Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers.</li> </ul> | Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave. |

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quand contacter un médecin?                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| <b>Constipation</b> <p><b>Pour prévenir la constipation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buvez beaucoup de liquides et maintenez une bonne alimentation. Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire.</li> <li>• Soyez actif. Des exercices périodiques peuvent vous garder en forme.</li> <li>• Essayez de consommer davantage de fibres (p. ex. fruits avec pelure, légumes verts et céréales entières). Si vous prenez des médicaments opiacés, demandez à votre équipe de soin de santé si vous devez consommer davantage de fibres.</li> </ul> <p><b>Pour traiter la constipation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous n'avez pas eu de selles depuis deux ou trois jours, vous devrez peut-être prendre un laxatif. Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous pouvez faire.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Constipation</a> pour en savoir davantage.</p> | Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave. |

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quand contacter un médecin?                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Fatigue</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux.</li> <li>• Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé.</li> <li>• Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin.</li> <li>• Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage).</li> <li>• Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Fatigue</a> pour en savoir davantage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>                                                                                                                                            |
| <p><b>Infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous avez chaud ou vous sentez mal (par exemple si vous avez des frissons ou une nouvelle toux), vous <b>devez</b> prendre votre température pour voir si vous avez de la fièvre.</li> <li>• Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (par exemple, Tylenol<sup>MD</sup>, acétaminophène, Advil<sup>MD</sup> ou ibuprofène).</li> <li>• Ne consommez pas d'aliments ni de boissons chaudes ou froides juste avant de prendre votre température.</li> </ul> <p>Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps</li> </ul> <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavez-vous souvent les mains pour éviter les infections.</li> <li>• Consultez votre médecin avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale.</li> <li>• Gardez un thermomètre numérique chez vous pour pouvoir prendre votre température facilement.</li> </ul> | <p>Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la joindre pour obtenir des conseils, vous <b>DEVEZ</b> obtenir une aide médicale d'urgence.</p> |

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

avril 2024

Page 6 of 10

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quand contacter un médecin?                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| <p><b>Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la joindre pour obtenir des conseils, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| <p><b>Nausées et vomissements</b></p> <p>(Généralement légers)</p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement.</p> <p><b>Si vous avez des nausées ou des vomissements:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous.</li> <li>• Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur.</li> <li>• Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool.</li> <li>• Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé.</li> </ul> <p>Voir également la fiche <a href="#">Nausées et vomissements</a> pour en savoir davantage.</p> | <p>Veillez communiquer avec votre équipe de soin de santé si les nausées durent plus de 48 heures ou si vous vomissez plus de 24 heures.</p> |
| <p><b>Anémie (diminution du nombre de globules rouges)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pourrez vous sentir plus fatigué ou faible que la normale, et votre peau sera plus pâle.</li> <li>• Cet effet secondaire peut survenir quelques jours ou quelques semaines après que vous aurez commencé à prendre votre médicament.</li> <li>• Reposez-vous souvent et maintenez une bonne alimentation.</li> <li>• Des exercices légers comme une marche peuvent être utiles.</li> <li>• Vous aurez peut-être besoin de médicaments ou d'une transfusion sanguine.</li> <li>• Si l'anémie est très prononcée, votre médecin pourra vous demander d'interrompre la prise du médicament qui abaisse le nombre de vos globules rouges.</li> </ul>                                                                                                                                           | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>                                                              |

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quand contacter un médecin?                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <p><b>Toux, essoufflement</b></p> <p>Vous pourrez présenter une toux et vous sentir essoufflé sans aucun signe d'infection, par exemple des maux de gorge ou une congestion nasale.</p> <p><b>Dans de rares cas, ces effets secondaires peuvent être graves et s'accompagner de douleurs thoraciques, de difficulté à respirer ou de crachats de sang. Si cela se produit, demandez immédiatement des soins médicaux d'urgence.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p> |
| <p><b>Gonflement léger dans les bras et les jambes</b></p> <p><b>Pour prévenir le gonflement léger :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoptez une alimentation à faible teneur en sel.</li> <li>• Évitez les vêtements serrés.</li> </ul> <p><b>Si vous présentez un gonflement dans les jambes, gardez vos pieds élevés quand vous êtes assis.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p> |
| <p><b>Diarrhées</b></p> <p>Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement.</p> <p><b>Si vous avez des diarrhées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit.</li> <li>• Ne mangez pas d'aliments ou de boissons contenant des édulcorants artificiels (comme du chewing-gum ou des boissons « diet »), du café et de l'alcool, jusqu'à ce que votre diarrhée ait cessé.</li> <li>• Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas.</li> <li>• Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Diarrhées</a> pour en savoir davantage.</p> | <p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p> |

| Effets secondaires et que faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quand contacter un médecin?                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <b>Troubles de la vessie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pourrez ressentir un besoin fréquent d'uriner ou avoir une sensation de brûlure ou des douleurs au moment d'uriner, votre urine pourra comporter du sang et vous pourrez avoir des fuites urinaires en raison de difficultés à maîtriser votre vessie.</li> <li>Dans certains cas, vous pourrez aussi faire de la fièvre.</li> </ul> | Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible.               |
| <b>Douleurs ou crampes dans l'abdomen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous souffrez de constipation ou de diarrhées, elles peuvent provoquer des douleurs dans votre abdomen.</li> <li>Si la douleur est grave et si elle s'accroît ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les autres causes possibles.</li> </ul>                                         | Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave. |
| <b>Étourdissements</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pourrez vous sentir la tête légère.</li> <li>En cas d'étourdissements, étendez-vous.</li> <li>Relevez-vous et déplacez-vous lentement quand vous vous sentirez mieux.</li> <li>Vous ne devez pas conduire un véhicule moteur ni utiliser de la machinerie si vous vous sentez étourdi.</li> </ul>                                          | Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave. |

**D'autres effets secondaires rares sont possibles.**

**Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:**

- démangeaisons, rougeurs, gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, oppression dans la poitrine et la gorge
- douleurs osseuses importantes ou inhabituelles ou difficulté à bouger
- besoin plus fréquent que d'habitude d'uriner et sensation de soif intense
- irrégularité des pulsations cardiaques, évanouissements ou gonflement des jambes, des chevilles et de l'abdomen
- essoufflement, douleur dans la poitrine ou toux sanglante
- douleur au bras ou à la jambe, gonflement et durcissement de la veine du bras ou de la jambe
- sentiment de confusion, perte soudaine de la vue, difficulté à s'exprimer ou à utiliser les bras ou les jambes
- coloration jaunâtre de vos yeux ou de votre peau, coloration foncée de l'urine ou douleurs du côté droit de l'abdomen
- douleur abdominale importante, vomissement de sang ou d'une substance brune ressemblant à du marc de café, ou selles colorées de sang rouge vif, noires ou goudroneuses

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

avril 2024

Page 9 of 10

### Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : \_\_\_\_\_

Pendant la journée, je dois joindre : \_\_\_\_\_

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés  
: \_\_\_\_\_

### Autres remarques :

---

---

---

---

---

---

---

### April 2024 Updated/revised information sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*