



blinatumomab

Prononciation: bli-na-tu-mo-mab

Autre nom(s): Blincyto^{MD}

Présentation: Solution mélangée dans de grands sacs de liquide solution

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

Pour traiter un type de cancer du sang appelé leucémie lymphoblastique aiguë (LLA).

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- Problèmes neurologiques, par exemple, problèmes de nerfs ou convulsions
- Précédente radiothérapie ou chimiothérapie ou
- Des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Blinatumomab est administré par injection par voie intraveineuse (injecté dans une veine). Votre perfusion débutera le jour 1 à l'hôpital et se poursuivra sur place jusqu'à ce que votre équipe de soins de santé décide qu'il est possible de la poursuivre à domicile. Vous recevrez une perfusion continue de blinatumomab pendant 28 jours, suivie de 2 semaines de pause (où le médicament n'est pas administré). Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour discuter de votre calendrier de traitement.
- Si vous avez manqué votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

Autres médicaments qui pourraient être administrés avec ce traitement

Prévention des réactions allergiques

Avant l'administration de votre premier traitement, on vous donnera un corticostéroïde (comme la dexaméthasone) pour prévenir toute réaction allergique avant qu'elle ne commence.

Prévention du syndrome de lyse tumorale (SLT)

Le SLT peut survenir lorsqu'un grand nombre de cellules cancéreuses meurent rapidement et que votre corps ne peut pas les éliminer assez rapidement. Le SLT peut vous rendre très malade. Demandez à votre équipe de soins de santé si vous êtes à risque pour le SLT.

Si vous êtes à risque pour le SLT, des médicaments pourraient vous être prescrits avant votre traitement au blinatumomab pour aider à le prévenir.

- Ces médicaments sont appelés hypo-uricémiants (comme l'allopurinol), ou autres.

Prévention des infections, comme le zona

Avant l'administration de votre traitement, des médicaments pourraient être prescrits pour prévenir toute infection par le virus du zona.

- Ils sont appelés les antiviraux (comme l'acyclovir ou le valacyclovir).

Prévention des infections par des bactéries

Avant l'administration de votre traitement, des médicaments pourraient être prescrits pour prévenir toute infection.

- Ils sont appelés les antibiotiques (comme le triméthoprim-sulfaméthoxazole).

Prévention des poussées d'hépatite B

Si vous avez déjà été infecté par l'hépatite B, il y a un risque que ce traitement puisse provoquer une poussée (réapparition). Informez votre équipe de soins de santé si vous avez eu une hépatite B. Il se peut que vous deviez prendre des médicaments pour prévenir une poussée d'hépatite B.

Autres renseignements importants à connaître sur ce traitement

Le blinatumomab fait travailler plus fort votre système immunitaire. C'est votre système immunitaire qui se bat contre les infections et votre cancer.

Lorsqu'il travaille plus fort, cela peut également endommager les cellules saines. Cela peut entraîner des effets secondaires qui sont différents de ceux d'autres traitements contre le cancer, comme la chimiothérapie.

Le **syndrome de libération de cytokine (SLC)** peut se produire lorsque votre système immunitaire répond agressivement au blinatumomab. Le SLC se produit généralement au cours des premiers jours des cycles 1 et 2. Les symptômes peuvent être légers, mais aussi devenir rapidement graves et mortels.

Le SLC peut être traité. Il est important de le dépister tôt afin que le traitement ait les meilleures chances de bien fonctionner. Parlez-en à votre équipe de soins de santé **dès maintenant** si vous avez l'un des signes du SLC suivants :

- Fièvre de plus de 38 °C
- Difficulté à respirer
- Battements de cœur rapides ou irréguliers
- Symptômes s'apparentant à la grippe (comme des frissons, des douleurs musculaires et de la fatigue)
- Nausées, vomissements ou diarrhée graves

Le **syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices (ICANS)** est un effet secondaire du blinatumomab qui affecte votre système nerveux (cerveau et nerfs). Il peut survenir de lui-même ou avec un SLC. Cela se produit généralement dans les 2 semaines suivant le début du traitement, ou quelques jours après le développement du syndrome de libération de cytokine (SLC). Il se produit rarement plus tard pendant le traitement.

L'ICANS peut être soigné; il est très important de le prendre en charge aussitôt que possible. Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès maintenant si vous avez l'un des signes de l'ICANS suivants :

- Maux de tête nouveaux ou pires que la normale
- Somnolence ou faiblesse
- Tremblements ou secousses
- Changement de l'écriture
- Difficulté à parler ou à avaler
- Convulsions

Vous recevrez une **carte de portefeuille** qui contient des informations et des instructions pour les autres fournisseurs de soins de santé concernant votre traitement et les effets secondaires possibles. **Montrez cette carte à tous les fournisseurs de soins de santé**, en particulier si vous devez vous rendre à la salle d'urgence.

À FAIRE pendant le traitement

- ✓ **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- ✓ **INFORMEZ** votre équipe de soins de santé si vous présentez ou avez eu une infection grave. Cela comprend le virus de l'herpès (comme le zona) ou une hépatite B.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- ✗ **N'UTILISEZ PAS** de produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou **NE BUVEZ PAS** d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- ✗ **NE PRENEZ PAS** d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre ou des produits de santé naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ **NE COMMENCEZ PAS** de thérapies complémentaires ou parallèles, comme l'acuponcture ou des médicaments homéopathiques sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ **NE CONDUISEZ PAS, N'UTILISEZ PAS** de machines et **N'EFFECTUEZ AUCUNE** tâche qui nécessite d'être attentif et vigilant si vous vous sentez étourdi, confus ou si vous avez des convulsions pendant votre traitement au blinatumomab.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Oui, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer des effets secondaires graves.

Informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :

- des médicaments, avec ou sans ordonnance, ainsi que toute autre drogue, telle que le cannabis/la marijuana (médicale ou récréative);
- des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter la prise de l'un de ces produits.

Si vous prenez un anticoagulant (comme la warfarine), votre équipe de soins de santé pourrait avoir besoin d'examen sanguins supplémentaires et peut modifier votre dose.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez une sensation de chaleur ou de malaise (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

OU

 - 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé par rapport aux sujets suivants :

- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce médicament peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez simultanément utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** pendant au moins **48 heures** après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaites pas pendant ce traitement et pendant au moins **48 heures** après la dernière dose de ce médicament.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous recevez un traitement au blinatumomab. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous recevez un traitement au blinatumomab.

Certains effets secondaires peuvent devenir graves ou mettre la vie en danger très rapidement. Vous devez en parler à votre équipe de soins de santé **immédiatement** si :

- Vous remarquez **tout nouvel effet secondaire**, surtout s'il est grave.
- Vous remarquez que vos effets secondaires s'aggravent.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Réactions allergiques (Peut être grave) Quels signes sont à surveiller? • De la fièvre, des démangeaisons, une éruption cutanée, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement dans la poitrine ou dans la gorge. • Cela peut survenir pendant ou peu de temps après que votre traitement vous a été administré, et peut être grave. Que faire? • Informez immédiatement votre infirmière si vous ressentez des signes de réaction allergique pendant ou juste après votre traitement. • Consultez votre équipe de soins de santé si vous présentez une légère réaction cutanée.	En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Maux de tête, douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères Quels signes sont à surveiller? • Maux de tête légers • Nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires, ou sensation de douleur généralisée. Que faire? • Prenez des médicaments (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. • Lisez la section ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, j'ai des douleurs, des maux de tête ou je fais de la fièvre? » avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui nécessite un traitement ou aggraver votre risque d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la douleur pour de plus amples renseignements.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Faible nombre de neutrophiles (globules blancs) dans le sang (neutropénie) (Peut être grave) Lorsque votre nombre de neutrophiles est faible, vous courez un risque d'infection accru. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la neutropénie (faible taux de globules blancs) pour de plus amples renseignements.	Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Quels signes sont à surveiller? • En cas de sensation de chaleur ou de malaise (par exemple, si vous avez des frissons ou que vous commencez à tousser), vous devez vérifier votre température pour déterminer si vous faites de la fièvre. • Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD} [acétaminophène] ou Advil^{MD} [ibuprofène]). • Ne mangez pas et ne buvez rien de chaud ou froid juste avant de prendre votre température. Vous faites de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de : • 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU • 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. Que faire? Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez un faible taux de neutrophiles : • Lavez-vous les mains souvent pour prévenir les infections. • Consultez votre équipe de soins de santé avant toute vaccination, opération, intervention médicale ou visite chez le dentiste. • Gardez un thermomètre numérique à la maison pour pouvoir vérifier facilement si vous faites de la fièvre. Si vous faites de la fièvre : Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Faible numération plaquettaire (Peut être grave) Lorsque votre numération plaquettaire est faible, vous courez un risque de saignements et d'hématomes. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la faible numération plaquettaire pour de plus amples renseignements. Quels signes sont à surveiller? • Restez à l'affût de signes de saignements : ◦ saignements des gencives ◦ saignements du nez inhabituels ou abondants ◦ apparition d'hématomes supérieure à la normale ◦ selles de couleur noire, ou sang dans les selles ◦ mucus rouge ou brun quand vous toussiez ◦ étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vue ◦ saignements vaginaux abondants Que faire? Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez une faible numération plaquettaire : • Indiquez à votre pharmacien que votre numération plaquettaire peut être faible avant de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous rendre chez le dentiste. • Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents souple. • Essayez d'éviter les coupures et hématomes. • Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités conviennent à votre situation. • Une faible numération plaquettaire peut retarder votre traitement. Votre équipe de soins de santé peut recommander une transfusion sanguine.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous avez des signes de saignement. En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Si vous avez des signes de saignement : • Si vous saignez un peu, nettoyez la zone au savon et à l'eau ou à l'aide d'une solution saline de rinçage. Exercez une pression sur la zone de saignement pendant au moins 10 minutes. Si vous avez un saignement grave (très abondant) ou qui ne s'arrête pas, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Troubles hépatiques Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre fonction hépatique à l'aide d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne causent généralement aucun symptôme. Quels signes sont à surveiller? • Dans de rares cas, vous pouvez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Ces signes peuvent être graves. Que faire? En cas de symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence.	Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Légères enflures Quels signes sont à surveiller? • Vous pouvez constater une légère enflure ou bouffissure au niveau des bras et des jambes. Dans de rares cas, elles peuvent être graves. Que faire? Prévention des enflures : • Mangez des aliments peu salés. En cas d'enflures : • Portez des vêtements amples. • Pour les jambes et pieds enflés, élevez vos pieds quand vous êtes assis.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Toux et essoufflement Quels signes sont à surveiller? • Vous pourriez présenter une toux et vous sentir essoufflé. • Les symptômes généralement associés à la toux sont les suivants : ◦ respiration sifflante ou souffle court ◦ écoulement nasal ◦ maux de gorge ◦ brûlures d'estomac ◦ perte de poids ◦ fièvre et frissons • Dans de rares cas, ces symptômes peuvent être graves et associés à une douleur dans la poitrine, à des difficultés respiratoires ou à une expectoration contenant du sang suite à une toux.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, et que vous faites de la fièvre ou avez de graves symptômes, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? • Prenez votre température pour savoir si vous faites de la fièvre. Lisez la partie ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou si je fais de la fièvre? » • En cas de fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence. • Si vous présentez une toux grave avec une douleur dans la poitrine, avez des difficultés respiratoires ou que vous toussiez du sang, obtenez immédiatement une aide médicale.	
Éruptions cutanées, peau sèche et démangeaisons Quels signes sont à surveiller? • Certaines zones de votre peau pourraient être rugueuses, craquelées ou desquamées. • Vous pourriez voir apparaître des rougeurs et avoir une sensation de chaleur, comme après un coup de soleil. • Vous pourriez avoir des sensations de démangeaisons, de brûlures, de piqûres ou de sensibilité extrême au toucher de la peau. Que faire? Prévention et traitement de la peau sèche : • Utilisez un soin hydratant sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez une protection solaire contre les rayons UVA et UVB avec un indice de facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez chaque jour 6 à 8 tasses de liquides sans alcool et sans caféine, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Dans de rares cas, l'éruption cutanée peut être grave et peut faire cloquer ou peler votre peau. Si c'est le cas, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	
Syndrome de libération de cytokine Le syndrome de libération de cytokine (SLC) peut se produire lorsque votre système immunitaire répond agressivement au blinatumomab (nom du médicament). Cela peut provoquer la libération d'une grande quantité de protéines appelées cytokines. Le SLC survient habituellement au début du traitement, lorsque votre système immunitaire commence à travailler plus fort (dans les quelques heures et jusqu'à quelques jours après avoir commencé vos 2 premiers cycles). Les symptômes du SLC peuvent être légers, mais aussi devenir rapidement graves et mortels. Votre équipe de soins de santé vous surveillera de plus près lors de la prise de vos 2 premiers cycles et pendant quelques jours après et fera des tests sanguins au besoin. Quels signes sont à surveiller? • de la fièvre. La fièvre peut parfois être élevée (plus de 40 °C). • vous pourriez également ressentir les symptômes suivant : ◦ Difficulté à respirer ◦ Battements de cœur rapides ou irréguliers ◦ Symptômes s'apparentant à la grippe (comme des frissons, des douleurs musculaires et de la fatigue) ◦ Nausées, vomissements ou diarrhée graves ◦ Signes d'une tension artérielle basse, comme des étourdissements	Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès maintenant si vous présentez l'un de ces symptômes. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe de soins pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? • Informez immédiatement votre infirmière si vous ressentez des signes du SLC pendant ou juste après votre traitement. Les symptômes peuvent s'aggraver rapidement. Si vous avez quitté l'hôpital : • Prenez votre température pour savoir si vous faites de la fièvre. Si vous faites de la fièvre ou si vous avez des signes du SLC, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence. • Assurez-vous de montrer à l'équipe de soins de santé d'urgence votre carte de portefeuille qui vous a été remise par votre équipe de soins de santé contre le cancer.	
Troubles du sommeil Vos médicaments peuvent causer des problèmes de sommeil. Cela pourrait s'améliorer une fois que votre corps sera habitué au médicament ou que votre traitement sera terminé. Quels signes sont à surveiller? • Difficultés à s'endormir ou à rester endormi. • Variations de la qualité de votre sommeil au cours du traitement. Par exemple, vous pourriez passer plusieurs nuits à mal dormir suivies par une nuit avec une meilleure qualité de sommeil. • Vous pourriez vous réveiller trop tôt ou ne pas vous sentir reposé après une nuit de sommeil. • Vous pourriez vous sentir fatigué ou somnolent durant la journée. Que faire? Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Maux de tête nouveaux ou pires que la normale
- Tremblements, difficulté à marcher, à parler ou à avaler
- Changement de l'écriture
- Convulsions
- Confusion
- Engourdissement, picotement, sensation de brûlure dans vos doigts et vos orteils, avoir du mal à exécuter des tâches comme boutonner vos vêtements, écrire, vous déplacer, ou si vous ressentez une douleur ou un engourdissement aigus
- Changements dans vos sens tels que la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe; ou des problèmes de contrôle des muscles de votre visage
- Contractions musculaires, faiblesse grave ou crampes, battement de cœur irrégulier
- Nouvelles douleur dans le bas du dos, changements dans les mictions (action d'uriner), par exemple, urine moins abondante qu'à l'accoutumée
- Douleur abdominale sévère, y compris une douleur au centre du ventre pouvant s'étendre dans le dos

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

November 2024 Updated/revised information sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.