Fiche d'information sur les médicaments

## brentuximab vedotin (bre

(bren-tuk-see-mab ve-doe-tin)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Adcetris<sup>MD</sup>

**Présentation:** Solution transparente à légèrement opalescente, incolore mélangée dans de plus grands sacs de liquide pour injection

## Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

Pour le traitement de certains types de cancer du sang comme le lymphome hodgkinien et le lymphome T

## Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

Informez votre médecin et votre pharmacien si vous avez ou avez déjà eu des troubles de santé importants, en particulier :

- des troubles cardiaques, pulmonaires, hépatiques ou rénaux,
- des troubles nerveux (engourdissement ou fourmillement dans les doigts ou les orteils),
- du diabète,
- · des allergies.

#### N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

# Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

#### Parlez à votre équipe de soins de santé des sujets suivants :

- Comment ce médicament pourrait influer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce médicament pourrait influer sur votre capacité à concevoir un enfant, le cas échéant.

Ce médicament peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ou votre partenaire êtes enceinte ou devenez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux contraceptifs efficaces** (y compris une méthode de barrière) en même temps pendant au moins **6 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la bonne contraception pour vous.
- N'allaitez pas pendant ce traitement

#### Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté par voie intraveineuse (injecté dans une veine). Parlez à votre équipe de soins de santé de votre calendrier de traitement.
- Si vous avez manqué un rendez-vous de traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour savoir ce qu'il faut faire.

#### Pour prévenir ou traiter la nausée et les vomissements

 On pourrait vous donner des médicaments pour prévenir la nausée (envie de vomir) et les vomissements avant qu'ils ne surviennent. C'est ce qu'on appelle des médicaments antinausée, comme l'ondansetron (Zofran<sup>MD</sup>), le granisetron (Kytril<sup>MD</sup>) ou d'autres.

#### Pour prévenir le syndrome de lyse tumorale (SLT)

Le SLT peut survenir lorsqu'un grand nombre de cellules cancéreuses meurent rapidement et que votre corps ne peut pas les éliminer suffisamment vite. Le SLT peut vous rendre très malade. Demandez à votre équipe de soins de santé si vous présentez un risque de SLT.

Si vous présentez un risque de SLT, on pourrait vous donner des médicaments préventifs avant de prendre votre traitement de brentuximab vedotin pour l'éviter. On appelle cela des hypo-uricémiants (comme l'allopurinol), ou autres.

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

#### Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Les interactions peuvent nuire au fonctionnement du traitement ou entraîner des effets secondaires graves.
- Parlez à votre équipe de soins de santé :
  - des médicaments sur ordonnance et en vente libre et de toute autre drogue, telle que le cannabis/la marijuana (à usage médical ou récréatif);
  - des produits de santé naturels tels que les vitamines, tisanes, médicaments homéopathiques et autres compléments.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter de prendre un de ces médicaments.

#### Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- Prenez toujours votre température pour savoir si vous avez de la fièvre avant de prendre des médicaments contre la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>) ou l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>).
  - La fièvre peut être un signe d'infection qui peut nécessiter un traitement immédiat.
  - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir que vous avez une infection.

#### Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez chaud ou vous sentez mal (par exemple, si vous avez des frissons, des maux de tête, ou une légère douleur).

- Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :
  - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU
  - 38 °C (ou 100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.

#### Si vous avez de la fièvre :

- Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la joindre pour obtenir des conseils, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence.
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche <u>Fièvre</u> pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre mais que vous avez des symptômes légers comme des maux de tête ou une légère douleur :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel médicament vous convient. L'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.
- Parlez avec votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre de l'Ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou ASA (Aspirine), car ils peuvent aggraver votre risque d'hémorragie ou interagir avec votre traitement contre le cancer.
- Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une faible dose d'aspirine pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Vous pourriez peut-être en prendre en toute sécurité.

#### Ce que vous DEVEZ faire lorsque vous prenez ce médicament :

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de recevoir un vaccin, une chirurgie, des soins dentaires ou autres interventions médicales.
- PARLEZ à votre équipe de soins de santé de toute infection grave que vous avez ou avez eue.
- PARLEZ à votre équipe de soins de santé si vous ressentez une douleur, un engourdissement ou des fourmillements des mains ou des pieds que vous n'aviez pas auparavant. C'est particulièrement important si vous avez de la difficulté à accomplir des tâches comme fermer des boutons, écrire, bouger, ou si vous ressentez une douleur ou un engourdissement graves.

#### Ce que vous NE DEVEZ PAS faire lorsque vous prenez ce médicament :

 NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en parler à votre équipe de soins de santé auparavant. Fumer et boire de l'alcool peut aggraver vos effets secondaires et nuire à l'efficacité de votre traitement.

#### Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez du brentuximab vedvedotin. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus au moins courants. Il est improbable que vous ayez tous les effets secondaires indiqués, et vous pourriez en avoir certains qui ne sont pas indiqués.

Lisez le tableau des effets secondaires pour savoir ce qu'il faut surveiller et quand obtenir de l'aide. Consultez ce tableau si vous ressentez des effets secondaires lorsque vous prenez du brentuximab vedotin.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes s	sur 100)
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Faible quantité de neutrophiles (globules blancs) dans le sang (neutropénie)  (Peut être grave)  Lorsque vous avez peu de neutrophiles, vous pourriez contracter des infections plus facilement. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Neutropénie (faible taux de neutrophiles) pour en savoir davantage.  Signes à surveiller:  Si vous avez chaud ou vous sentez mal (par exemple si vous avez des frissons ou une nouvelle toux), vous devez prendre votre température pour voir si vous avez de la fièvre.  Ne prenez pas de médicaments contre la fièvre avant de prendre votre température (par exemple, Tylenol <sup>MD</sup> , acétaminophène, Advil <sup>MD</sup> ou ibuprofène).  Ne consommez pas d'aliments ou de boissons chauds ou froids juste avant de prendre votre température.  Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :  38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU  38 °C (ou 100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.  Que faire?  Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous avez un faible taux de neutrophiles :  Lavez-vous souvent les mains pour éviter les infections.  Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale.  Gardez un thermomètre numérique chez vous pour vérifier facilement si	Si vous avez de la fièvre, parlezen à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la joindre pour obtenir des conseils, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes	sur 100)
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
vous avez de la fièvre.	
Si vous avez de la fièvre :	
Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la joindre pour obtenir des conseils, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.	
Faible quantité de plaquettes dans le sang	Parlez-en à votre
(Peut être grave)	équipe de soins de santé en cas de signes de saignement. En
Lorsque votre taux de plaquettes est faible vous présentez un risque de saignements et de bleus. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Faible numération plaquettaire pour en savoir davantage.	cas de saignement grave ou qui ne
Signes à surveiller :	s'arrête pas (saignement important), vous
Surveillez les signes de saignement :	DEVEZ obtenir une aide
<ul> <li>Saignements des gencives</li> <li>Saignements du nez inhabituels ou importants</li> <li>Apparition d'ecchymoses supérieure à la normale</li> <li>Selles de couleur noire, ou sang dans les selles</li> <li>Crachat de mucus rouge ou brun</li> <li>Étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vision</li> </ul>	médicale d'urgence.
<ul> <li>Saignements vaginaux importants</li> <li>Urine de couleur rouge ou rose</li> </ul>	
Que faire?	
Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous avez un faible taux de plaquettes :	
<ul> <li>Signalez à votre pharmacien que votre taux de plaquettes peut être faible avant de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre.</li> <li>Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous rendre chez le</li> </ul>	

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul> <li>dentiste.</li> <li>Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents souple.</li> <li>Éviter les coupures et ecchymoses.</li> <li>Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités vous pouvez pratiquer en toute sécurité.</li> <li>Votre traitement pourrait devoir être repoussé si vous avez un faible taux de plaquettes. Votre équipe de soins de santé peut vous recommander une transfusion sanguine.</li> <li>Si vous observez des signes de saignement</li> <li>En cas de léger saignement, nettoyez la zone à l'aide de savon et d'eau ou de solution de rinçage saline (eau salée). Appliquez une pression ou un bloc réfrigérant pendant au moins 10 minutes.</li> <li>En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas (saignement important), vous devez obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.</li> </ul>	
Neuropathie (fourmillements et engourdissements des orteils ou des doigts)	Communiquez avec votre équipe de soins
(Peut être grave)	de santé, particulièrement si vous avez de
Signes à surveiller :	la difficulté à accomplir des
<ul> <li>Engourdissement ou fourmillement au niveau des doigts et des orteils qui pourrait apparaître après le début de votre traitement.</li> <li>Cela peut être douloureux et donner une sensation de brûlure, qui peut être grave.</li> </ul>	tâches comme fermer des boutons, écrire, bouger, ou si vous ressentez une douleur ou
Que faire?	un engourdissement
Parlez-en à votre équipe de soins de santé en cas de symptômes	graves.
<ul> <li>de neuropathie.</li> <li>L'engourdissement et les fourmillements peuvent s'améliorer doucement après la fin de votre traitement.</li> </ul>	

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Dans de rares cas, il peut persister longtemps après la fin du traitement. Si vous continuez à avoir des symptômes gênants, demandez conseil à votre équipe de soins de santé.	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Fatigue  Signes à surveiller:  • Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'améliore pas avec le sommeil ou le repos.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.
<ul> <li>Soyez actif. Visez 30 minutes d'activité physique modérée (vous arrivez à parler aisément pendant l'exercice) la plupart des jours.</li> <li>Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique.</li> <li>Prenez votre temps, ne vous pressez pas. Repoussez les activités les moins importantes. Reposez-vous au besoin.</li> <li>Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, l'épicerie ou la garde des enfants et des animaux de compagnie.</li> <li>Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou autres liquides chaque jour (sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé).</li> <li>Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué.</li> <li>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.</li> </ul>	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Des nausées et vomissements  (Généralement légers)	Si les nausées persistent pendant plus de
Signes à surveiller :	48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures ou
<ul> <li>La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez aussi vous sentir étourdi.</li> <li>Vous pourriez ressentir des nausées dans les heures et les jours suivant votre traitement.</li> </ul>	s'ils sont graves, communiquez avec votre équipe de soins
Que faire?	de santé.
Pour éviter la nausée :	
<ul> <li>Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter.</li> <li>Si on vous donne des médicaments préventifs anti-nausée prenez-les comme prescrits, même si vous n'avez pas envie de vomir.</li> <li>Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Prenez l'air et reposez-vous.</li> <li>Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte.</li> <li>Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool.</li> </ul>	
En cas de nausées ou de vomissements :	
<ul> <li>Prenez vos médicaments de lutte contre la nausée (au besoin) comme prescrits.</li> <li>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.</li> <li>Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants:</li> </ul>	
<ul> <li>Nausée qui dure depuis plus de 48 heures</li> <li>Vomissements graves ou persistants pendant plus de 24 heures.</li> </ul>	
Toux et essoufflement	Communiquez avec votre
(Peut être grave)	équipe de soins de santé. Si vous

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Signes à surveiller:  Vous pourriez tousser ou être essoufflé.  Voici les symptômes qui accompagnent généralement la toux:  Respiration sifflante  Nez qui coule  Maux de gorge  Brûlures d'estomac  Perte de poids  Frissons et fièvre  Dans de rares cas, cela peut être grave et s'accompagner de douleur à la poitrine, de difficulté respiratoire ou de crachats de sang.  Que faire?  Prenez votre température pour voir si vous avez de la fièvre. Lire la section ci-dessus: Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?  Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la joindre pour obtenir des conseils, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.  Si vous avez une toux grave avec une douleur dans la poitrine, de la difficulté à respirer ou si vous toussez du sang, obtenez une aide médicale d'urgence.	n'arrivez pas à joindre votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils, et que vous avez de la fièvre ou des symptômes graves, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.
La diarrhée Signes à surveiller :	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre
<ul> <li>Selles molles, liquides pouvant survenir des jours après le traitement.</li> <li>Que faire?</li> </ul>	diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'anti- diarrhéique, ou si elle est grave (plus de 7 fois
Si vous avez la diarrhée	
<ul> <li>Prenez des médicaments anti-diarrhéique si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé.</li> <li>Évitez les aliments et boissons contenant des édulcorants artificiels</li> </ul>	par jour).

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul> <li>(comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool.</li> <li>Mangez de nombreux petits repas et collations au lieu de deux ou trois gros repas.</li> <li>Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.</li> <li>Parlez à votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez devoir boire des liquides spéciaux avec du sel et du sucre, appelés thérapie par réhydratation orale.</li> <li>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'anti-diarrhéique, ou si vous avez la diarrhée plus de 7 fois par jour.</li> <li>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Diarrhée pour de plus amples renseignements.</li> </ul>	
Faible appétit  Signes à surveiller :  • Perte d'intérêt envers la nourriture ou perte de la sensation de faim.  • Perte de poids.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.
Que faire?	
<ul> <li>Essayez de manger vos aliments préférés.</li> <li>Mangez des petits repas tout au long de la journée.</li> <li>Vous avez peut-être besoin de suppléments alimentaires pour maintenir votre poids.</li> <li>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit.</li> </ul> Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Perte	
<u>d'appétit</u> pour en savoir davantage.	5.1
Maux de tête, douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires  Signes à surveiller :	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul> <li>De légers maux de tête;</li> <li>De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures.</li> </ul>	s'améliorent pas.
Que faire?	
<ul> <li>Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) comme prescrits.</li> <li>Lisez la section ci-dessus intitulée : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? » avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>), de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), du naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler une infection qui nécessite un traitement, ou peuvent aggraver votre risque d'hémorragie.</li> <li>Reposez-vous souvent et essayez une activité physique légère (comme la marche), cela pourrait vous aider.</li> </ul>	
Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche <u>Douleurs</u> pour en savoir davantage.	
Réaction allergique (Peut être grave)	Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.
Signes à surveiller :	
<ul> <li>Fièvre, démangeaisons, plaques, lèvres, visage ou langue enflés, poitrine ou gorge serrée.</li> <li>Peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament et peut être grave.</li> </ul>	
Que faire?	
<ul> <li>Parlez-en à votre infirmier immédiatement en cas de signe de réaction allergique pendant votre traitement ou juste après.</li> <li>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous avez une légère réaction cutanée.</li> </ul>	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 1	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Signes à surveiller:  Des selles moins régulières que la normale. De petites selles qui ressemblent à des granulés. Le besoin de pousser fort pour faire sortir les selles. Des douleurs ou crampes d'estomac. Un ventre gonflé, une sensation d'être plein, ou un inconfort. Des fuites de selles liquides. Beaucoup de gaz ou de rots. Des nausées et vomissements.  Que faire?  Pour éviter la constipation: Essayez de manger des aliments à haute teneur en fibre comme des fruits, des légumes-feuilles et des céréales complètes. Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. Soyez actif. L'exercice peut réguler votre digestion. Si vous prenez des opioïdes, demandez à votre équipe de soins de santé si vous devez consommer plus de fibres.  Pour traiter la constipation: Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis deux ou trois jours, vous pourriez avoir besoin d'un laxatif pour vous aider à avoir un transit régulier. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Constipation pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons  (Peut être grave)	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont
Signes à surveiller	graves ou ne s'améliorent pas.
<ul> <li>Votre peau pourrait être craquelée, rugueuse ou peler à certains endroits.</li> <li>Votre peau pourrait avoir une apparence rouge et chaude, comme avec un coup de soleil.</li> <li>Votre peau pourrait vous démanger, vous brûler, piquer ou être très sensible au toucher.</li> </ul>	
Que faire?	
Pour éviter et traiter la peau sèche :	
<ul> <li>Utilisez un hydratant pour la peau sans parfum.</li> <li>Protégez votre peau du soleil et du froid.</li> <li>Utilisez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30.</li> <li>Évitez les produits et lotions parfumés qui contiennent de l'alcool.</li> <li>Buvez 6 à 8 tasses de liquide non alcoolisé, sans caféine chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.</li> </ul>	
Les éruptions cutanées peuvent être graves et dans certains cas votre peau pourrait présenter des ampoules ou peler. Dans ce cas, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.	

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles. Si vous observez N'IMPORTE LEQUEL des symptômes suivants, parlez avec votre fournisseur de soins de santé ou obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement :

- Douleur, enflure ou durcissement d'une veine dans un bras ou une jambe
- Douleur sévère à la poitrine, au bras ou au ventre (peut s'élargir au dos en cas de ballonnements graves)
- Perte soudaine de vision, d'élocution ou de l'utilisation de vos bras ou jambes
- Rythme cardiaque rapide ou irrégulier

### brentuximab vedotin

- Peau et yeux jaunâtres, ou urine inhabituellement sombre
- Confusion, difficulté à réfléchir, douleur ou faiblesse musculaire sévère
- Nouveaux problèmes d'équilibre, troubles de la mémoire, changements de personnalité
- Douleur dans le bas du dos avec nouvelles enflures du corps, urine moins fréquente que d'habitude ou prise de poids inhabituelle

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?
Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est :
Pendant la journée, je dois joindre :
En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés :
Autres remarques :

June 2024 Updated/revised information sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

#### brentuximab vedotin

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.