

Fiche d'information sur les médicaments

buséreline à action prolongée (bu-sé-ré-line)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Suprefact Depot^{MD}

Présentation: Implants cylindriques en forme de bâtonnets de couleur blanc crème

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament?

- Pour le traitement du cancer de la prostate

Avant son administration

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement une maladie cardiaque (notamment une irrégularité des pulsations cardiaques), une dépression, une hypertension artérielle, un diabète, de l'ostéoporose ou des facteurs de risque pour l'ostéoporose, ou si vous avez des allergies
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque élevé d'apparition d'autres formes de cancer (généralement quelques années plus tard) ou de caillots sanguins. Certains médicaments administrés contre le cancer peuvent accroître ces risques, surtout s'ils sont administrés pendant une période prolongée. Vous devriez discuter avec votre médecin de vos préoccupations à propos de ce médicament.

Grossesse et allaitement

- En laboratoire, ce médicament peut avoir des effets néfastes sur les embryons ou les rejetons d'animaux qui y ont été exposés.
- Cette mesure ne s'applique peut-être pas directement dans votre cas, mais s'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément pendant la prise de ce médicament.** Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** (recommandation générale) après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement à l'aide de ce médicament.
- Effets sur la fertilité: Probable

Comment ce médicament est-il administré?

- Ce médicament est injecté sous la peau.

- Plusieurs schémas d'administration sont utilisés – consultez votre spécialiste des soins de santé pour savoir à quelle fréquence vous devez prendre ce médicament
- Assurez-vous de rendre visite à votre médecin pour vos injections répétées. Parlez à votre spécialiste des soins de santé pour savoir quels sont les médicaments et accessoires que vous devez apporter avec vous pour votre visite.

Pendant la prise de ce médicament

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, ce qui peut en réduire l'efficacité ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre médecin et pharmacien connaissent tous les médicaments que vous prenez (vendus avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou avant de cesser de le faire, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Sécurité et conservation

- Conservez ce médicament à la température ambiante, dans son emballage original, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

Effets secondaires et que faire

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous présentez des effets secondaires inhabituels ou qui vous incommode, parlez-en à votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p>Tension artérielle élevée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesurez votre tension artérielle régulièrement; des médicaments pour traiter une hypertension artérielle pourraient être nécessaires. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Réactions au site d'injection (rougeurs, sensation de brûlure, douleur cuisante, démangeaison, légère éruption cutanée ou enflure)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ces symptômes sont généralement légers et disparaissent après quelques jours 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Difficulté à s'endormir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parlez-en à votre médecin si cela vous dérange. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration

<p><i>Douleur légère musculaires ou aux articulations</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin, en suivant ses instructions. • Autrement, prenez de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) au besoin pour les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou pharmacien quelle est la dose appropriée dans votre cas. • Reposez-vous souvent, mais de l'exercice léger est possible. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><i>Aggravation des symptômes</i> (douleur à l'endroit de la tumeur, douleur osseuses graves, douleur importante au dos, difficultés à uriner ou mauvais contrôle de la vessie ou des intestins)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Augmentation des dimensions de la prostate et aggravation des symptômes du cancer qui peuvent être prononcés • Ces effets apparaissent généralement au cours des deux premières semaines ou au début du traitement. • Si vous présentez des douleurs osseuses graves, une aggravation des difficultés à uriner, une insensibilisation importante ou des difficultés à faire des mouvements, téléphonez immédiatement à votre médecin. 	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><i>Glycémie élevée</i> (soif accrue et besoin fréquent d'uriner)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesurez votre glycémie si vous êtes diabétique. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><i>Autres symptômes de faibles taux de testostérone</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bouffées de chaleur, perte de mémoire • Enflure ou douleurs aux seins • Baisse de libido, impuissance • L'ostéoporose • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière si cela vous dérange. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><i>Taux de cholestérol ou de lipides anormaux dans le sang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin pourrait les mesurer régulièrement. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><i>Anémie</i> (fatigue ou faiblesse inhabituelles, pâleur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir de quelques semaines à quelques mois après le début du traitement • Peut être attribuable à une faible numération de globules rouges • Se reposer souvent. Avoir une alimentation saine. • De l'exercice léger peut être bénéfique, entrecoupé de courtes périodes d'activité et de pauses. • Ne pas conduire ni opérer de machinerie lourde si vous vous sentez fatigué ou faible. • Voir aussi le dépliant sur l'Anémie.* 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>

Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
Modification inhabituelle de la personnalité ou de l'humeur (par exemple dépression)	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Un caillot sanguin (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang) Blocage d'une artère (vaisseau sanguine) dans le cœur, le cerveau, la poitrine, l'abdomen ou les membres. Le blocage peut entraîner un accident vasculaire cérébral (perte soudaine de la vue, de la parole ou de l'usage des membres) ou une crise cardiaque (douleurs dans la poitrine, essoufflement) ou des douleurs dans la poitrine, l'abdomen ou les membres	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Problèmes cardiaques (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure, essoufflement)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Réaction allergique (importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge; peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Douleur aux os; Perte osseuse	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Croissance anormale de l'hypophyse (maux de tête inhabituels, modification de la vue ou du poids)	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.