

bévacizumab

Prononciation: bé-va-ci-zu-mab

Autre nom(s): Avastin^{MD}, Mvasi^{MD}, Zirabev^{MD}, Bambevi^{MD}, Abevmy^{MD}, Aybintio^{MD}, Vegzelma^{MC}

Présentation: Solution transparente incolore mélangée dans de plus grands sacs de liquide

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

- Pour le traitement de certaines formes de cancer colorectal, des poumons, du cerveau, des ovaires, du col de l'utérus, des reins et d'autres cancers. Il peut être administré seul ou en association avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques, selon le type de cancer.
- Le bévacizumab est offert en tant que médicament biosimilaire. Voir la fiche [Biosimilaires](#) pour en savoir davantage.

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

- Informez votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez déjà eu des troubles de santé importants, comme :
 - ◊ de l'hypertension artérielle;
 - ◊ une opération chirurgicale au cours des 28 derniers jours (ou si vous allez avoir une opération ou des soins dentaires);
 - ◊ des troubles cardiaques (y compris une crise cardiaque ou un AVC);
 - ◊ des troubles rénaux;
 - ◊ une toux sanglante ou d'autres saignements;
 - ◊ des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est administré par IV (injecté dans une veine). Parlez à votre équipe de soins de santé de votre calendrier de traitement.
- Le bévacizumab est administré sur une longue période de temps pendant le premier cycle. Si la perfusion n'entraîne aucune difficulté, elle sera administrée pendant moins longtemps lors des cycles suivants.
- Si vous avez manqué un rendez-vous de traitement, demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire.

Autres renseignements importants à connaître sur ce traitement

Lors de l'utilisation du bévacizumab, les plaies peuvent nécessiter plus de temps pour cicatriser que la normale ou ne pas cicatriser complètement. Informez votre équipe de soins de santé si vous prévoyez de subir une intervention chirurgicale (y compris une chirurgie dentaire). Votre équipe de soins de santé peut vous demander d'arrêter le traitement par bévacizumab pendant 28 jours ou plus avant toute intervention chirurgicale prévue.

À FAIRE pendant le traitement

- ✓ **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, de subir une opération, une chirurgie dentaire ou toute autre procédure médicale.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- ✗ **NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS** d'alcool pendant ce traitement sans en discuter au préalable avec votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et empêcher votre traitement de fonctionner.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Oui, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Ces interactions peuvent freiner l'efficacité du médicament ou causer des effets secondaires graves.

Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :

- médicaments sur ordonnance et en vente libre;
- produits de santé naturels tels que les vitamines, tisanes, médicaments homéopathiques et autres compléments.

Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un de ces traitements.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps
- OU
- 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous **DEVEZ** immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous. L'**acétaminophène (Tylenol^{MD})** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Evoquez avec votre équipe de soins de santé les sujets suivants :

- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, le cas échéant.

Ce traitement peut être nocif pour un fœtus. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément deux méthodes contraceptives efficaces durant votre traitement et pendant au moins **6 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement et pendant au moins **6 mois** après la prise de la dernière dose.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez du bévacizumab. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus au moins courants. Il est peu probable que vous ressentiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en ressentir d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Conservez ce document pendant toute la durée de votre traitement afin que vous puissiez le consulter au besoin.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Saignements ou bleus inhabituels (Peuvent être graves) Signes à surveiller : • Surveillez les signes de saignement : ◦ Saignement des gencives ◦ Saignements du nez inhabituels ou importants ◦ Apparition d'ecchymoses supérieure à la normale ◦ Selles de couleur noire, ou sang dans les selles ◦ Toux avec crachat de couleur rouge ou brune ◦ Étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vision ◦ Saignements vaginaux importants Que faire? • Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous rendre chez le dentiste, ou si vous avez une opération prévue. • Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents souple. • Essayez d'éviter les coupures et ecchymoses : • Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités vous pouvez pratiquer en toute sécurité.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé en cas de signe de saignement. En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas, vous immédiatement DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Si vous observez des signes de saignement : En cas de léger saignement, nettoyez la zone à l'aide de savon et d'eau ou d'une solution de rinçage saline (eau salée). Appliquez une pression pendant au moins 10 minutes. En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas (saignement important), vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	
Fatigue Signes à surveiller : - Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne disparaît pas avec le repos ou le sommeil. Que faire? - Soyez actif. Essayez de faire 30 minutes d'activité physique modérée (vous arrivez à parler aisément pendant l'exercice) la plupart des jours. - Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. - Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités peu importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. - Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches telles que le ménage, les courses, ou pour vous occuper des enfants ou animaux de compagnie. - Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autre liquide chaque jour (sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé). - Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous sentez fatigué. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Hypertension artérielle (Peut être grave) Signes à surveiller : • Il n'y a généralement pas de signe d'hypertension artérielle. • Dans de rares cas, vous pourriez avoir des maux de têtes, être essoufflé ou saigner du nez. Que faire? • Contrôlez régulièrement votre pression artérielle. • Votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. En cas de maux de tête graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence, car cela peut être un signe d'hypertension artérielle.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.
Protéines dans l'urine (Peuvent être graves) Votre équipe de soins de santé peut réaliser des analyses d'urine pour contrôler la présence de protéines dans votre urine. Signes à surveiller : • Des enflures au niveau du visage, des jambes ou du ventre. • Une prise de poids récente qui est inhabituelle pour vous. • Une urine mousseuse, ou qui semble contenir des bulles. Que faire? Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Mal de tête, douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires Signes à surveiller : - Des maux de tête, de nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures. Que faire? - Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opiacés tels que la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) comme prescrit. - Lisez la section ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? » à la page 3 avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler une infection qui nécessite un traitement, ou peuvent aggraver votre risque d'hémorragie. - Reposez-vous souvent et essayez d'exercer une activité physique légère (comme la marche), cela pourrait vous aider. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Douleur pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Diarrhée Signes à surveiller : - Selles molles, liquides pouvant survenir des jours ou des semaines après le traitement. Que faire? Si vous avez la diarrhée : - Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou vous a recommandé d'en prendre. - Ne mangez pas d'aliments ou de boissons contenant des édulcorants artificiels (comme du chewing-gum ou des boissons « diet »), du café et de l'alcool, jusqu'à ce que votre diarrhée ait cessé. - Mangez de nombreux petits repas et collations au lieu de deux ou trois gros repas. - Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. - Avisez votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez devoir boire des liquides spéciaux avec du sel et du sucre, appelés thérapie par réhydratation orale. - Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après la période de 24 heures suivant la prise d'antidiarrhéique, ou si vous avez la diarrhée plus de 7 fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Diarrhée pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après la période de 24 heures suivant la prise d'antidiarrhéique, ou si elle est grave (plus de 7 fois par jour).

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Caillots sanguins Signes à surveiller : • Les caillots sanguins peuvent causer des douleurs, une enflure et un durcissement de la veine dans la zone du corps où se trouve le caillot. • Dans les cas graves, le caillot peut bloquer une grosse artère ou veine. Un caillot sanguin dans vos poumons peut provoquer de la toux, de la difficulté à respirer, une douleur dans votre poitrine ou une toux sanglante. Un caillot sanguin dans votre cerveau (AVC) peut provoquer des troubles de la vision, de la parole, ou de la difficulté à utiliser vos bras et vos jambes. Un caillot sanguin dans votre cœur (crise cardiaque) peut provoquer une douleur dans la poitrine, un essoufflement, ou une douleur dans votre ventre ou vos bras. Que faire? Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.	Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.
Nausées et vomissements (Généralement légers) Signes à surveiller : • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez aussi ressentir des étourdissements. • Vous pourriez ressentir des nausées dans les heures et les jours suivant votre traitement.	Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures ou ces derniers sont graves, communiquez avec votre équipe de soins de santé.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? Pour éviter la nausée : • Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter. • Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. En cas de nausées ou de vomissements : • Prenez vos médicaments anti-nausée de secours (au besoin) comme ils vous ont été prescrits. • Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants : ◦ Des nausées persistant pendant plus de 48 heures ◦ Des vomissements graves ou persistants pendant plus de 24 heures • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.	
Constipation Signes à surveiller : • Des selles moins régulières que la normale. • De petites selles dures qui ressemblent à des granulés. • Le besoin de pousser fort et de forcer pour faire sortir les selles. • Des douleurs ou crampes abdominales. • Des ballonnements, la sensation d'être plein, ou inconfortable. • Des fuites de selles liquides. • Beaucoup de gaz ou d'éructations. • Des nausées et vomissements.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? Pour éviter la constipation : • Essayez de manger des aliments à haute teneur en fibre comme des fruits non pelés, des légumes-feuilles et des céréales complètes. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Soyez actif. L'activité physique peut vous aider à réguler votre transit. • Si vous prenez des opiacés contre la douleur, demandez à votre équipe de santé si manger plus de fibre est approprié. Pour traiter la constipation : • Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis deux ou trois jours, vous pourriez avoir besoin d'un laxatif pour vous aider à avoir un transit régulier. Demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Constipation pour en savoir davantage.	
Toux et essoufflement Signes à surveiller : • Vous pourriez tousser ou être essoufflé. • Voici des symptômes courants qui accompagnent la toux : ◦ Respiration sifflante ◦ Nez qui coule ◦ Maux de gorge ◦ Brûlures d'estomac ◦ Perte de poids ◦ Frissons et fièvre • Dans de rares cas, elle peut être grave et s'accompagner de douleur dans la poitrine, de difficultés respiratoires, ou de crachat de sang.	Communiquez avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à joindre votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils, et que vous avez de la fièvre ou des symptômes graves, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? • Prenez votre température pour voir si vous avez de la fièvre. Lire la section ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? ». • Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de les joindre pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence. • Si vous avez une toux grave accompagnée de douleur dans la poitrine, de difficultés respiratoires ou que vous crachez du sang, obtenez immédiatement une aide médicale.	
Difficulté à dormir Vos médicaments peuvent vous causer de la difficulté à dormir Elle peut disparaître à mesure que votre corps s'habitue au médicament ou quand votre traitement se terminera. Signes à surveiller : • Vous pourriez avoir de la difficulté à vous endormir ou à rester endormi. • La qualité de votre sommeil peut changer au cours de votre traitement. Par exemple, vous pourriez mal dormir pendant plusieurs nuits, puis bien dormir la nuit suivante. • Vous pourriez vous réveiller trop tôt ou ne pas vous sentir reposé après une nuit de sommeil. • Vous pourriez vous sentir fatigué ou somnolent pendant la journée. Que faire? Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Faible appétit Signes à surveiller : • Perte d'intérêt envers la nourriture ou perte de la sensation de faim. • Perte de poids. Que faire? • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez des petits repas tout au long de la journée. • Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments pour vous aider à maintenir votre poids. • Avisez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Perte d'appétit pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.
Troubles cardiaques Signes à surveiller : • Vous pourriez avoir un rythme cardiaque irrégulier, un essoufflement, une douleur dans la poitrine ou des malaises. • Des enflures au niveau des jambes, des chevilles et du ventre. • Une douleur aiguë au centre ou à gauche de la poitrine (qui empire souvent lorsque vous respirez profondément). • Une fatigue extrême qui vous empêche de faire de l'exercice ou de pratiquer des activités normales. Que faire? Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.	Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons Signes à surveiller : • Votre peau pourrait être craquelée, rugueuse ou peler à certains endroits. • Votre peau pourrait avoir une apparence rouge et chaude, comme avec un coup de soleil. • Votre peau pourrait vous démanger, vous brûler, vous piquer ou être très sensible au toucher. Que faire? Pour éviter et traiter la peau sèche : • Utilisez un hydratant pour la peau sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez 6 à 8 tasses de liquide non alcoolisé, sans caféine chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. Les éruptions cutanées peuvent être graves dans de rares cas, et faire peler votre peau ou provoquer des ampoules. Si cela se produit, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.
Fièvre, frissons, infection Signes à surveiller : • Si vous avez chaud ou vous sentez mal (par exemple si vous avez des frissons ou une nouvelle toux), vous devez prendre votre température pour voir si vous avez de la fièvre. • Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (par exemple, Tylenol^{MD}, acétaminophène, Advil^{MD} ou ibuprofène) • Ne consommez pas d'aliments ni de boissons chauds ou froids juste avant de prendre votre température.	Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de les joindre pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de : • 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU • 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. Que faire? • Lavez-vous souvent les mains pour éviter les infections. • Consultez votre médecin avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale. • Gardez un thermomètre numérique chez vous pour pouvoir prendre votre température facilement. Si vous avez de la fièvre : Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de les joindre pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	médicale d'urgence.
Enrouement (voix éraillée) Signes à surveiller : • Votre voix peut être rauque, éraillée ou étouffée. • Vous pourriez entendre des changements de volume ou de tonalité de votre voix. Que faire? Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, vous devez en parler à votre fournisseur de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Des boutons rouges sur la peau, une pâleur de la peau ou une fatigue excessive, une miction insuffisante ou une urine foncée
- Rougeur de la peau, lèvres, visage ou langue enflées, respiration sifflante ou gorge serrée, généralement pendant l'administration du médicament ou juste après
- Douleurs abdominales aiguës, ballonnement ou sensation d'être plein et constipation aiguë ou douleurs graves et soudaines dans la région de l'estomac ou du ventre.
- Douleur aux dents, à la bouche ou à la mâchoire, enflure, difficulté de guérison des ulcères buccaux, écoulement anormal des gencives, desserrement des dents, et engourdissement ou lourdeur de la mâchoire
- Maux de tête aigus, évanouissements, convulsions, confusion et perte de la vision
- Blessures qui mettent plus longtemps à guérir ou ne guérissent pas complètement
- Douleur aiguë dans la poitrine, le haut du dos, qui monte dans votre cou ou descend dans votre dos, alors que vous ne vous êtes pas blessé
- Fièvre élevée et peau rouge, enflée et très douloureuse, qui peut être chaude ou virer au violet.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

July 2024 Updated/revised information sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.