



capivasertib

Prononciation: ka PI vah SER tib

Autre nom(s): Truqap^{MD}

Présentation: comprimé

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

Le capivasertib est utilisé pour traiter certains types de cancers du sein. Il est habituellement donné en association avec un autre médicament.

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- des problèmes hépatiques ou rénaux;
- du diabète ou de l'hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang);
- de la diarrhée ou des selles molles, ou tout autre problème de santé qui cause ces symptômes (comme le syndrome du côlon irritable);
- des antécédents d'éruption cutanée ou autres problèmes de la peau;
- des allergies



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est habituellement pris par voie orale deux fois par jour (environ aux 12 heures). Vous prendrez le médicament pendant quatre jours, suivi d'une pause de trois jours (sans prise du capivasertib) chaque semaine. Demandez à votre équipe de soins de santé la manière et le moment où vous devez prendre votre médicament.
- Avalez les comprimés entiers avec un grand verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- N'écrasez pas et ne mastiquez pas les comprimés.
- NE mangez PAS et ne buvez pas de pamplemousses, de caramboles, de grenades, d'oranges de Séville ou de leurs jus (ou de produits contenant ces fruits) pendant ce traitement. Cela peut augmenter la quantité de médicament dans votre sang et augmenter les effets secondaires.
- Si vous oubliez de prendre une dose de capivasertib :
 - s'il s'est écoulé moins de quatre heures depuis la dose oubliée, prenez la dose comme d'habitude. Prenez la dose suivante au moment prévu.
 - si cela fait plus de quatre heures, ne prenez pas la dose. Prenez la dose suivante au moment prévu. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, ne prenez pas de dose supplémentaire. Prenez la dose suivante au moment prévu.

Mise en garde: Si vous prenez trop de ce médicament, par accident, ou si vous soupçonnez un enfant ou un animal de compagnie d'avoir ingéré votre médicament,appelez immédiatement le centre antipoison de l'Ontario au 1-800-268-9017.

Autres médicaments qui pourraient être administrés avec ce traitement

Pour traiter la diarrhée

Le capivasertib contenu dans votre schéma posologique peut causer de la diarrhée. La diarrhée, c'est lorsque vous avez des selles molles (selles liquides) ou lorsque vous devez aller à la selle plus souvent que d'habitude. La diarrhée peut commencer quelques jours après le début de votre traitement.

Vous pourriez recevoir un médicament appelé lopéramide (Imodium^{MD}) pour aider à traiter la diarrhée. Prenez ce médicament seulement si vous en avez besoin.

Gardez votre lopéramide avec vous en tout temps. Lorsque la diarrhée commence, prenez le lopéramide immédiatement

Autres renseignements importants à connaître sur ce traitement

Ce traitement peut causer le syndrome d'enflure douloureuse des mains et des pieds

Le syndrome d'enflure douloureuse des mains et des pieds est un effet secondaire du traitement au moyen du capivasertib qui affecte la peau de vos mains et la plante de vos pieds. Cela commence habituellement par des picotements ou un gonflement de la peau. Votre peau peut devenir douloureuse, rouge et engourdie. Dans les pires cas, votre peau peut commencer à peler et vous pouvez avoir des ampoules ou des plaies. Cela peut commencer des jours ou des semaines après le début de votre traitement.

Vous pouvez aider à prévenir les symptômes du syndrome d'enflure douloureuse des mains et des pieds en prenant les mesures suivantes :

- hydratez votre peau, surtout dans les plis de la peau;
- appliquez doucement de la crème hydratante ou de la lotion sur la paume de vos mains et sur la plante de vos pieds au besoin; choisissez une crème sans parfum qui contient de la lanoline (comme Bag Balm^{MD}, Udderly Smooth^{MD}) ou de l'urée à 10 % (comme Uremol 10^{MD});
- ne laissez pas vos mains et vos pieds devenir trop chauds. Essuyez la sueur de votre peau. Prenez un bain ou une douche à l'eau tiède et séchez-vous délicatement;
- ne faites pas d'activités qui provoquent des frottements ou de la pression sur votre peau, comme le lavage intensif, la prise d'outils, la saisie au clavier, jouer d'instruments de musique et conduire;
- portez des gants pendant le nettoyage pour protéger votre peau des produits comme les détergents à lessive, l'eau de Javel, les produits de nettoyage et le savon à vaisselle;
- portez des vêtements amples et des chaussures confortables à semelles rembourrées. Ne marchez pas pieds nus;
- buvez de six à huit verres de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a dit le contraire.

À FAIRE pendant le traitement



- ✓ CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner ou opérer, avant de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- ✓ VÉRIFIEZ régulièrement votre taux de sucre dans le sang si vous prenez des médicaments pour le diabète. Ce traitement peut entraîner des changements dans vos niveaux de sucre dans le sang.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- ✗ NE PRENEZ PAS d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre (sans ordonnance) ou des substances, ou bien des produits de santé naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ NE COMMENCEZ PAS de traitements complémentaires ou parallèles, comme l'acupuncture ou des médicaments homéopathiques sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ N'UTILISEZ PAS de produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- ✗ NE MANGEZ PAS et NE BUVEZ PAS de pamplemousses, de caramboles, de grenades, d'oranges de Séville ou de leurs jus (ou de produits contenant ces fruits) pendant ce traitement. Cela peut augmenter la quantité de médicament dans votre sang et augmenter les effets secondaires.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Oui, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments, médicaments traditionnels et produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer de graves effets secondaires.

Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :

- médicaments délivrés sur ordonnance et en vente libre (vendus sans ordonnance);
- autres drogues et substances, comme le cannabis/la marijuana (à titre médical ou récréatif);
- produits de santé naturels tels que les vitamines, les tisanes, les médicaments homéopathiques et les autres compléments, ou les médicaments traditionnels.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'usage de l'un de ces produits.



Consultez votre équipe de soins de santé AVANT de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Médicaments traditionnels
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues et substances, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps
- OU
- 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirine^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- La façon dont ce traitement pourrait influer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce traitement pourrait influer sur votre capacité à concevoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour un enfant à naître. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et au moins jusqu'à **quatre semaines** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- N'utilisez pas de contraceptif hormonal (comme la pilule contraceptive), sauf si votre équipe de soins de santé vous indique que vous pouvez le faire en toute sécurité. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la méthode contraceptive la plus sûre pour vous.
- N'allaitez pas pendant ce traitement.

Comment dois-je conserver et manipuler les médicaments de ce traitement en toute sécurité?

- Conservez les comprimés de capivasertib dans l'emballage d'origine à température ambiante dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur.
- Conservez-les hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez aucun comprimé de capivasertib inutilisé à la maison. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Comment toucher votre médicament oral contre le cancer en toute sécurité?

Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.
- Avalez chaque comprimé en entier. N'écrasez pas et ne mâchez pas les comprimés.

Si vous êtes un aidant :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas touché le médicament.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.
- Ne touchez pas les médicaments oraux contre le cancer si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

Que faire si le médicament entre en contact avec votre peau ou vos yeux?

En cas de contact avec la peau :

- Lavez votre peau avec beaucoup d'eau et de savon.
- Si votre peau rougit ou devient irritée, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

En cas de contact avec les yeux :

- Rincez immédiatement vos yeux à grande eau. Laissez l'eau s'écouler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du capivasertib. Ce tableau les énumère des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas recensés.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour connaître les symptômes auxquels vous devez prêter attention et pour connaître le moment de demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez du capivasertib.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Diarrhée (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou les semaines suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez la diarrhée :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé. Évitez les aliments ou boissons avec édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool jusqu'à ce que la diarrhée cesse. Mangez plusieurs repas légers au lieu de deux ou trois gros repas. Buvez au moins six à huit tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire six à huit tasses de liquides par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, procédé appelé réhydratation par voie orale. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de sept fois par jour). 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de sept fois par jour).

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Diarrhée .	

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Éruption cutanée, peau sèche et démangeaisons</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certaines zones de votre peau pourraient être rugueuses, craquelées ou desquamées. • Vous pourriez voir apparaître des rougeurs et avoir une sensation de chaleur, comme après un coup de soleil. • Vous pourriez avoir des sensations de démangeaisons, de brûlures, de piqûres ou de sensibilité extrême au toucher de la peau. <p>Que faire?</p> <p>Prévention et traitement de la peau sèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une crème hydratante sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez une protection solaire contre les rayons UVA et UVB avec un indice de facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez chaque jour 6 à 8 tasses de liquides sans alcool et sans caféine, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. <p>Dans de rares cas, l'éruption cutanée peut être grave et peut faire cloquer ou peler votre peau. Si c'est le cas, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Nausées et vomissements (Ces symptômes sont habituellement légers)</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez également vous sentir étourdi. • Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter. • Si on vous a donné des médicaments antinauséeux, prenez-les selon ce qui a été prescrit, même si vous n'avez pas envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas légers. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. <p>En cas de nausée ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments antinauséeux (au besoin) selon ce qui a été prescrit. • Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée <u>Nausée et vomissements</u>. • Parlez à votre équipe de soins de santé si : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La nausée persiste au-delà de 48 heures; ◦ les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures. 	Contactez votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensation de fatigue ou de manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) presque tous les jours. Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. Prenez votre temps et évitez de vous presser. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. Demandez à votre famille ou à vos amis de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage ou pour s'occuper des enfants et animaux de compagnie. Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a recommandé d'en boire plus ou moins). Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué(e). <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Fatigue.</p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
<p>Ulcères buccaux</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ulcères ronds et douloureux, blancs ou gris à l'intérieur de votre bouche qui peuvent survenir sur la langue, les lèvres ou à l'intérieur de vos joues. Dans des cas plus sévères, il peut être difficile de déglutir, de manger ou de vous brosser les dents. Ils peuvent perdurer pendant trois jours ou plus. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez un ulcère buccal ou une lésion à la lèvre ou si cela fait mal de manger, boire ou avaler.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Prévention des ulcères buccaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez soin de votre bouche en brossant vos dents doucement et en passant la soie dentaire régulièrement. • Rincez souvent votre bouche avec un rince-bouche maison. • Pour faire un rince-bouche maison, mélangez 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1 cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 l) d'eau. • N'utilisez pas de rince-bouche commerciaux pour ne pas vous abîmer la bouche, surtout ceux qui contiennent de l'alcool. <p>Si vous avez des ulcères buccaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les aliments chauds, épicés, acides, durs ou croustillants. • Votre médecin peut vous prescrire un rince-bouche spécial pour atténuer les ulcères buccaux et prévenir les infections. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez un ulcère buccal ou une lésion à la lèvre ou si cela fait mal de manger, boire ou avaler. <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Santé orale (soins de la bouche).</p>	
<p>Hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang)</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez avoir une sensation de soif. • Vous pourriez uriner plus souvent qu'à l'accoutumée. • Vous pourriez vous sentir fatigué ou somnolent. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre équipe de soins de santé pourrait réaliser une analyse sanguine pour vérifier votre taux de sucre dans le sang (glycémie). • On pourrait vous demander de modifier votre régime alimentaire ou de prendre un médicament pour faire descendre votre glycémie. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus vite possible (aux heures d'ouverture).

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> Si vous avez du diabète, contrôlez régulièrement votre glycémie. Votre équipe de soins de santé pourrait vous demander de la contrôler plus souvent qu'à l'accoutumée. 	
<p>Manque d'appétit</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Perte d'intérêt dans la nourriture ou absence de sensation de faim. Perte de poids. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Essayez de manger vos aliments préférés. Mangez de petits repas tout au long de la journée. Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids. Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Perte d'appétit.</p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé contre le cancer ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Éruption cutanée grave avec des vésiculations ou une desquamation de la peau ou tout changement inhabituel de la peau; vous pourriez également avoir de la fièvre, des frissons, des douleurs corporelles ou des ganglions enflés.
- Symptômes d'une réaction allergique comme des démangeaisons, une éruption cutanée, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement dans la poitrine ou dans la gorge.
- Symptômes de problèmes rénaux comme un gonflement des mains, des chevilles, des pieds ou d'autres zones du corps, une douleur dans le bas du dos et changements dans les mictions (action d'uriner) comme de l'urine moins abondante qu'à l'accoutumée.
- Symptômes d'une glycémie très élevée, comme la confusion ou des difficultés à rester éveillé, de la fatigue ou une somnolence inhabituelle, une respiration rapide et profonde, et une haleine fruitée.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

December 2025 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.