

Fiche d'information sur les médicaments

céritinib (se ri' ti nib)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Zykadia (MC)

Présentation: capsule

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

Pour traiter certains types de cancer du poumon

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Informez votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez déjà eu des troubles de santé importants, comme:
 - ◊ des troubles cardiaques (y compris un rythme cardiaque faible ou irrégulier);
 - ◊ des troubles rénaux ou hépatiques;
 - ◊ du diabète ou un taux de glycémie élevé;
 - ◊ des troubles pancréatiques;
 - ◊ des allergies.
- Parlez à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuez à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Évoquez avec votre équipe de soins de santé les sujets suivants :

- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, le cas échéant.

Ce traitement peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, si vous tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux formes de contraceptifs efficaces** pendant **3 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la bonne contraception pour vous.
- N'allaitez pas pendant ce traitement.

Comment ce médicament est-il donné?

IMPORTANT : Vous devez demander à votre équipe de soins de santé s'il faut prendre ce médicament avec les repas ou non.

- Ce médicament est généralement pris oralement une fois par jour.
- Avalez la capsule en entier avec un verre d'eau, avec de la nourriture (pendant une collation ou un repas).
- Vous pourrez avoir besoin de prendre plus d'une capsule pour recevoir la dose appropriée. Suivez les instructions que votre équipe de soins de santé vous a données.
- Ne pas ouvrir, écraser ou mâcher les capsules.
- En cas d'oubli, avalez la capsule en entier avec un verre d'eau dans les 12 heures suivant la dose manquée; autrement, passez cette dose et prenez la suivante à l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose pour rattraper la dose oubliée.
- En cas de vomissement après la prise, ne prenez pas une autre dose pour la remplacer. Continuez avec la dose suivante à l'heure habituelle.

Pour traiter la diarrhée

La diarrhée correspond à des selles molles (ou liquides) ou au besoin d'aller à la selle plus souvent que d'habitude. La diarrhée peut commencer quelques jours après votre traitement.

Vous pourriez recevoir un médicament appelé lopéramide (Imodium^{MD}) pour traiter la diarrhée. Prenez ce médicament uniquement si vous en avez besoin. Gardez le lopéramide avec vous en tout temps. Lorsque la diarrhée commence, prenez le lopéramide immédiatement.

Si vous commencez à avoir la diarrhée :

- Prenez immédiatement 2 capsules (4 mg) de lopéramide.
- Prenez 1 capsule après chaque selle molle (ou liquide).
- Ne prenez pas plus de 8 capsules par jour.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- **Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?**
 - ◊ Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Ces interactions peuvent freiner l'efficacité du traitement ou causer des effets secondaires graves.
 - ◊ Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :
 - médicaments sur ordonnance et en vente libre et de toute autre drogue, telle que le cannabis (à usage médical ou récréatif)
 - produits de santé naturels tels que les vitamines, tisanes, médicaments homéopathiques et autres compléments.
 - ◊ Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre un de ces traitements ou d'arrêter de le prendre.
- **Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?**
 - ◊ **Prenez** toujours votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments contre la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (Tylenol) ou l'ibuprofène (Advil)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir que vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez chaud ou vous sentez mal (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- ◊ Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps
- OU
- 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.

Si vous avez de la fièvre :

- **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de les joindre pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une légère douleur :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel médicament vous convient.
L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.
- **Parlez avec votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'ASA (Aspirine^{MD}), car ces médicaments peuvent aggraver votre risque d'hémorragie ou interagir avec votre traitement contre le cancer.**
- Indiquez à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Ce que vous DEVEZ FAIRE lorsque vous prenez ce médicament :

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer ou de recevoir un traitement dentaire ou d'autres interventions médicales.

Ce que vous NE DEVEZ PAS faire lorsque vous prenez ce médicament :

- Vous ne DEVEZ PAS manger de pamplemousses, de caramboles ou d'oranges de Séville ni manger ou boire des jus ou des produits dérivés de ces fruits pendant votre traitement, étant donné qu'ils peuvent accroître la quantité de médicament dans votre sang et augmenter les effets secondaires.
- NE fumez PAS ET NE buvez PAS d'alcool pendant votre traitement sans en parler à votre équipe de soins de santé auparavant. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne jetez aucun médicament non utilisé à la maison. Rapportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez du céritinib.

Ce tableau énumère les effets secondaires des plus au moins courants. Il est peu probable que vous ressentiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en ressentir d'autres non indiqués. Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide.

Conservez ce document pendant toute la durée de votre traitement afin que vous puissiez le consulter au besoin.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Diarrhée</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> Selles molles, liquides pouvant survenir des jours ou des semaines après le traitement. <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez la diarrhée :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou vous a recommandé d'en prendre. Évitez les aliments et boissons contenant des édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool. Mangez de nombreux petits repas et collations au lieu de deux ou trois gros repas. Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. Avisez votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez devoir boire des liquides spéciaux avec du sel et du sucre, appelés thérapie par réhydratation 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après la période de 24 heures suivant la prise d'antidiarrhéique, ou si elle est grave (plus de 7 fois par jour).</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>orale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après la période de 24 heures suivant la prise d'antidiarrhéique, ou si vous avez la diarrhée plus de 7 fois par jour. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Diarrhée pour en savoir davantage.</p>	
<p>Troubles hépatiques</p> <p>(Peuvent être graves)</p> <p>Votre équipe de soins de santé pourrait contrôler votre fonction hépatique au moyen d'une analyse sanguine. Les changements hépatiques ne provoquent généralement aucun symptôme.</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans de rares cas, vous pourriez avoir la peau ou les yeux jaunâtres, une urine anormalement foncée ou ressentir une douleur abdominale du côté droit. Cela peut être grave. <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez des symptômes de troubles hépatiques, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	<p>Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>
<p>Nausées et vomissements</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez aussi ressentir des étourdissements. Vous pourriez ressentir des nausées dans les heures et les jours suivant votre traitement. 	<p>Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures ou ces derniers sont graves,</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)

Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Pour éviter la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter. • Prenez les médicaments anti-nausée qui vous sont prescrits, même si vous n'avez pas envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. <p>En cas de nausées ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments anti-nausée de secours (au besoin) comme ils vous ont été prescrits. • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage. • Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> ◊ Des nausées persistant pendant plus de 48 heures ◊ Des vomissements graves ou persistants pendant plus de 24 heures 	<p>communiquez avec votre équipe de soins de santé.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne disparaît pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Essayez de faire 30 minutes d'activité physique modérée (vous arrivez à parler aisément pendant l'exercice) la plupart des jours. • Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités peu importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches telles que le ménage, les courses, ou pour vous occuper des enfants ou animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autre liquide chaque jour (sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>
<p>Douleurs ou crampes abdominales</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleurs ou crampes dans le ventre. • La constipation et la diarrhée peuvent causer des douleurs abdominales. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la douleur est grave, empire ou persiste, parlez-en avec votre équipe de soins de santé pour déterminer d'autres causes possibles. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Faible appétit</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perte d'intérêt envers la nourriture ou perte de la sensation de faim. • Perte de poids. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez des petits repas tout au long de la journée. • Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments pour vous aider à maintenir votre poids. • Avisez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Perte d'appétit pour en savoir davantage.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Résultats de laboratoires anormaux aux tests rénaux</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enflure, peu ou pas d'urine, ou gain de poids nouveau et inhabituel. • Votre médecin peut contrôler régulièrement votre fonction rénale. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)

Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Pour éviter les troubles rénaux ou de la vessie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf indication contraire de votre médecin). <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez ces symptômes, consultez votre équipe de soins de santé ou visitez la salle d'urgence la plus proche. 	
<p>Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau pourrait être craquelée, rugueuse ou peler à certains endroits. • Votre peau pourrait avoir une apparence rouge et chaude, comme avec un coup de soleil. • Votre peau pourrait vous démanger, vous brûler, vous piquer ou être très sensible au toucher. <p>Que faire?</p> <p>Pour éviter et traiter la peau sèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un hydratant pour la peau sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez 6 à 8 tasses de liquide non alcoolisé, sans caféine chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. <p>Les éruptions cutanées peuvent être graves dans de rares cas, et faire peler votre peau ou provoquer des ampoules. Si cela se produit, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)

Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Constipation</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des selles moins régulières que la normale. • De petites selles dures qui ressemblent à des granulés. • Le besoin de pousser fort et de forcer pour faire sortir les selles. • Des douleurs ou crampes abdominales. • Des ballonnements, la sensation d'être plein, ou inconfortable. • Des fuites de selles liquides. • Beaucoup de gaz ou d'éruclations. • Des nausées et vomissements. <p>Que faire?</p> <p>Pour éviter la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de manger des aliments à haute teneur en fibre comme des fruits non pelés, des légumes-feuilles et des céréales complètes. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Soyez actif. L'activité physique peut vous aider à réguler votre transit. • Si vous prenez des opiacés contre la douleur, demandez à votre équipe de santé si manger plus de fibre est approprié. <p>Pour traiter la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis deux ou trois jours, vous pourriez avoir besoin d'un laxatif pour vous aider à avoir un transit régulier. Demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Constipation pour en savoir davantage.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)

Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opiacés tels que la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) comme prescrit. Lisez la section ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? » à la page 3 avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler une infection qui nécessite un traitement, ou peuvent aggraver votre risque d'hémorragie. Reposez-vous souvent et essayez d'exercer une activité physique légère (comme la marche), cela pourrait vous aider. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Douleur pour en savoir davantage.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>
<p>Anémie (faible taux de globules rouges)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pourriez vous sentir plus fatigué ou plus faible que d'habitude. Une peau pâle et des pieds et mains froids. Vous pourriez avoir le souffle court, ressentir des vertiges ou des étourdissements. Ces symptômes peuvent survenir quelques jours, voire quelques semaines après le début de votre traitement <p>Que faire?</p> <p>Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous avez de l'anémie (faible taux de globules rouges) :</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)

Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Reposez-vous souvent et mangez bien. • Une activité physique légère, comme la marche peut vous aider. • Vous pourriez avoir besoin de médicaments ou d'une transfusion sanguine. • Si l'anémie est très grave, votre médecin peut devoir apporter des changements à votre régime de traitement. 	
<p>Glycémie élevée</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez connaître une sensation de soif et uriner plus souvent. • Votre médecin pourrait vérifier votre taux de glycémie. Il pourrait vous recommander de modifier votre alimentation ou de prendre des médicaments pour traiter la glycémie élevée. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez votre taux de glycémie régulièrement si vous êtes atteint de diabète. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus tôt possible.</p>
<p>Troubles cardiaques</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez avoir un rythme cardiaque irrégulier, être essoufflé, avoir une douleur dans la poitrine ou des malaises. • Des enflures au niveau des jambes, des chevilles et du ventre. • Une douleur aiguë au centre ou à gauche de la poitrine (qui empire souvent lorsque vous respirez profondément). • Une fatigue extrême qui vous empêche de faire de l'exercice ou de pratiquer des activités normales. <p>Que faire?</p> <p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)

Effets secondaires et ce qu'il faut faire	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Valeurs anormales aux analyses pancréatiques (peuvent être graves)</p> <p>Votre équipe de soins de santé contrôlera votre fonction pancréatique au moyen d'une analyse sanguine régulièrement.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas</p>

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, vous devez en parler à votre fournisseur de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Faible rythme cardiaque
- Douleur, enflure et durcissement d'une veine dans vos membres
- Toux, difficulté à respirer, souffle court, ou toux sanglante qui n'existaient pas auparavant
- Vision trouble, sensibilité à la lumière ou douleur oculaire
- Douleur au milieu de votre ventre qui peut irradier vers le dos
- Faiblesse musculaire, convulsions, sentiment de confusion

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés : _____

Autres remarques :

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.