

Fiche d'information sur les médicaments

cladribine (CLA-dri-bine)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Marques génériques disponibles, Leustatin^{MD}

Présentation: Claire solution mélangée dans les (plus) grands sacs de liquides

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de certains cancers du sang, plus particulièrement la leucémie à tricholeucocytes.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Si vous avez des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez ou avez déjà eu des maladies de rein, ou si vous présentez des allergies, dites-le à votre médecin.
- Cladribine peut être nocif pour le fœtus.
- Si vous allaitez, si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez devenir enceinte, dites-le à votre médecin.
- Les patients atteints d'un cancer / leucémie sont exposés à des risques plus élevés de développer d'autres cancers/leucémies ou des caillots sanguins. De plus, certains médicaments contre le cancer peuvent accroître ces risques. Vous devriez en parler avec votre médecin.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- Vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes enceinte. S'il y a **DES RISQUES** que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même et votre partenaire devez : ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six (6) mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement avec cladribine.
- Effets sur la fertilité: Probable

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Pour les douleurs légères :
 - ◊ Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - ◊ Avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), parlez-en à votre équipe de soins de santé étant donné que ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.
 - ◊ Si vous prenez régulièrement de l'aspirine, par exemple en raison d'un trouble cardiaque, vous ne devez pas cesser de le faire sans en parler tout d'abord à votre équipe de soins de santé.
 - ◊ Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre. **Téléphonez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous souffrez d'effets secondaires dérangeants et inhabituels, discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p>Saignements ou bleus inhabituels</p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p>Fièvre, frissons, infection</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie ou avant d'aller chez le dentiste. <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche «Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) ».</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p>Nausées et vomissements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez des liquides clairs et éviter les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Prenez des antinauséux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Communiquez avec votre médecin si les nausées durent plus d'une journée ou s'il y a des vomissements. • Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.* 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p>Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons</p> <ul style="list-style-type: none"> Évitez le soleil; appliquez une crème solaire, portez un chapeau et couvrez la peau exposée. Utilisez un hydratant tous les jours. Éruptions cutanées graves (qui peuvent entraîner la présence de cloques ou l'écaillage de la peau); vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Mal de tête</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin, en suivant ses instructions. Autrement, prenez de l'acétaminophène (TylenolMD) au besoin pour les douleurs légères. Reposez-vous souvent, mais de l'exercice léger est possible. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Réactions au site d'injection (rougeurs, démangeaisons, bleus, légères éruptions cutanées ou enflure)</p>	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Pertes d'appétit, aucun goût pour la nourriture, perte de poids</p> <ul style="list-style-type: none"> Mangez des aliments que vous appréciez et tenter de prendre régulièrement de petits repas régulièrement. Utilisez des suppléments dans la mesure du possible. Consultez un diététiste. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reposer souvent, faire une sieste au besoin. Se déplacer lentement au lever. Manger des repas équilibrés et boire beaucoup de liquides. L'exercice léger peut aider. Ne pas conduire un véhicule motorisé ni opérer de machinerie lourde si vous vous sentez fatigué. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
<p>Un caillot sanguin (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/informed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.

April 2016

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
	délai
<p>Réaction allergique (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament. 	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Problèmes de reins (douleur au bas du dos, enflure du corps)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez également à l'affût d'une miction faible ou de l'absence d'urine, d'une urine foncée ou de sang dans l'urine, ou d'un gain de poids récent inhabituel 	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Picotement ou engourdissement des orteils ou des doigts, difficulté avec les mouvements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peuvent revenir lentement à la normale après la fin du traitement. • Communiquez avec le médecin ou l'infirmière si vous avez du mal à attacher des boutons, à écrire, à prendre de petits objets, si vous éprouvez de la douleur, ou bien des ennuis avec le mouvement. • Dans certains cas rares, ces effets peuvent être graves et entraîner une paralysie. Si ces effets sont importants, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Problèmes pulmonaires (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Problèmes cardiaques (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure, essoufflement)</p>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Le fait de tuer des cellules cancéreuses rapidement au commencement du traitement peut mener à une accumulation de déchets cellulaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si elle est légère, elle peut causer la goutte, avec des douleurs articulaires, mais si elle est marquée, elle peut causer de la fièvre, une insuffisance rénale et de la confusion, et être potentiellement mortelle. • Vous DEVEZ prendre les médicaments prescrits à titre préventif par votre médecin ET • Boire beaucoup de liquides (6 à 8 verres par jour) et uriner fréquemment. 	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.