

## crisantaspase recombinante (cri san TAS pase)

*Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.*

**Autre nom(s):** Rylaze<sup>MC</sup>

**Présentation:** Solution incolore à jaune clair pour injecter

### Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de certains cancers du sang, tels que la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) et le lymphome lymphoblastique (LLB)

### Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

Informez votre équipe de soins de santé si vous avez souffert et souffrez actuellement des problèmes médicaux suivants :

- caillots sanguins ou problèmes de saignement;
- diabète ou taux de glycémie élevé;
- problèmes rénaux, du foie ou du pancréas;
- toute allergie (ou si vous ne tolérez pas l'asparaginase)

#### N'oubliez pas de:

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

## Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

### Demandez à votre équipe de soins de santé :

- quel impact ce médicament peut avoir sur votre santé sexuelle.
- quel impact ce médicament peut avoir sur votre fertilité, si cela vous concerne.

Il est possible que ce médicament soit dangereux pour le fœtus. Informez votre équipe de soins de santé si vous êtes (ou votre partenaire est) enceinte, risquez de tomber enceinte pendant le traitement ou si vous allaitez (votre partenaire allaite).

- S'il existe un risque de grossesse, **quel qu'il soit**, vous et votre partenaire devrez utiliser **2 formes de contraception efficaces** en même temps, jusqu'à **3 mois** après la dernière dose.
- Il est possible que ce médicament diminue l'efficacité d'une méthode de contraception hormonale, telle que les contraceptifs oraux. Si vous décidez d'utiliser une méthode de contraception orale, assurez-vous d'utiliser également une méthode de protection non-hormonale (comme les préservatifs). Parlez à votre équipe de soins de santé des meilleures options de contraception dans votre cas.
- N'allaitiez pas pendant que vous prenez ce médicament et pendant les **2 semaines** qui suivent la dernière dose.

## Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans un muscle. Parlez de votre calendrier de traitement avec votre équipe de soins de santé.
- Il est possible qu'on vous donne d'autres médicaments avec ce traitement pour aider à prévenir une réaction.
- Si vous n'avez pas pu vous présenter à une séance de traitement, demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous devez faire.

## Prévenir une réaction allergique

- Il est possible qu'on vous donne des médicaments avant votre traitement pour aider à prévenir des réactions allergiques avant qu'elles ne débutent.
- Il existe différents types de médicaments pour enrayer de possibles réactions allergiques. Ces médicaments font partie des catégories suivantes :
  - les analgésiques/antipyrétiques (comme l'acétaminophène ou du Tylenol<sup>MD</sup>)
  - les antihistamines (comme la diphenhydramine ou du Benadryl<sup>MD</sup>)
  - les anti-H2 (comme la ranitidine ou la famotidine)

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

### Y-a-t-il des interactions entre ce médicament et d'autres médicaments ou des produits de santé naturels ?

- Il est possible que ce médicament interagisse avec d'autres médicaments, des vitamines, des produits alimentaires et des produits de santé naturels. Ces interactions peuvent diminuer l'efficacité du traitement ou causer des effets secondaires graves.
- Informez votre équipe de soins de santé :
  - des médicaments sous ordonnance ou en vente-libre et de toutes les autres substances, comme le cannabis / la marijuana (à des fins médicales ou récréatives) que vous prenez;
  - des produits de santé naturels comme les vitamines, les tisanes, les médecines homéopathiques et autres suppléments que vous prenez.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer à, ou de cesser de, prendre tout nouveau produit.

### Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre ?

- Prenez **toujours** votre température pour déterminer si vous avez de la fièvre **avant** de prendre un médicament contre la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>) ou l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>)).
  - Une fièvre peut être un signe d'infection, ce qui nécessite un traitement immédiat.
  - Ces médicaments, si vous les prenez avant de prendre votre température, risquent de faire baisser votre température, et vous ne saurez donc peut-être pas que vous avez une infection.

### Comment savoir si vous avez de la fièvre :

Assurez-vous d'avoir un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons, des maux de tête ou des douleurs mineures).

- Vous avez de la fièvre si la température prise dans la bouche (température orale) est de :
  - ◊ 38,0° C (100,4°F) ou plus pendant une heure au moins
- OU
- ◊ 38,3° C (100,9°F) ou plus à n'importe quel moment

### Si vous avez de la fièvre :

- **Essayez de contacter votre équipe de soins de santé. Si vous ne pouvez pas les contacter, vous DEVREZ demander de l'aide médicale d'urgence immédiatement.**
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [Fièvre](#) pour obtenir de plus amples renseignements.

**Si vous n'avez pas de fièvre**, mais avez des symptômes tels que des maux de tête ou des douleurs mineures :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon médicament pour vous. **L'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>)** est un choix sécuritaire pour la plupart des personnes.
- **Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre** de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), du naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou de l'AAS (Aspirin<sup>MD</sup>), car ces produits peuvent augmenter le risque de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.
- Parlez à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà de **l'aspirine en petites doses** pour un problème médical (comme un problème cardiaque). Il se peut que vous puissiez continuer à en prendre.

### **Ce qu'il faut FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :**

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de recevoir tout vaccin, subir une opération chirurgicale, recevoir des soins dentaires ou toute autre procédure médicale.
- ENVISAGEZ de demander à quelqu'un de vous emmener à, et de vous ramener de l'hôpital les jours où vous recevez le traitement. Il se peut que vous soyez somnolent ou que vous ayez des vertiges après le traitement.
- FAITES tester votre taux de glycémie régulièrement si vous prenez un médicament pour le diabète. Ce traitement risque de causer des changements dans votre taux de glycémie.

### **Ce qu'il NE FAUT PAS FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :**

- NE FUMEZ PAS et NE BUVEZ PAS d'alcool pendant que vous suivez ce traitement, sans en avoir parlé au préalable avec votre équipe de soins de santé. Le fait de fumer et de boire de l'alcool peut aggraver les effets secondaires et diminuer l'efficacité de votre traitement.

## **Quels sont les effets secondaires de ce médicament?**

Le tableau suivant énumère les effets secondaires possibles pendant votre traitement à la crisantaspase recombinante. Certains effets secondaires peuvent également être dus à la chimiothérapie, puisqu'on les a notés chez des personnes à qui on a administré de la crisantaspase recombinante ainsi que d'autres médicaments de chimiothérapie.

Le tableau est structuré de manière à indiquer les effets secondaires les plus courants en premier et les effets secondaires les moins courants en dernier. Il est peu probable que vous ressentiez l'ensemble des effets secondaires énumérés et que vous en ressentiez d'autres qui ne sont pas énumérés.

Prenez connaissance du contenu de ce tableau pour savoir ce à quoi vous attendre et quand demander de l'aide. Reportez-vous à ce tableau si vous souffrez d'un effet secondaire, quel qu'il soit, pendant que vous prenez de la crisantaspase recombinante.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Nausée et vomissements</b></p> <p>(Généralement légers)</p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous aurez l'impression de devoir vomir quand vous avez la nausée. Il est possible que vous ayez des étourdissements.</li> <li>• Il se peut que vous ayez de la nausée quelques heures ou quelques jours après votre traitement.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Pour aider à prévenir la nausée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter lorsqu'elle s'est déjà manifestée.</li> <li>• Si on vous a donné un / des médicament(s) contre la nausée, prenez-les conformément aux instructions, même si vous n'avez pas l'impression de devoir vomir.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Sortez à l'air frais et reposez-vous.</li> <li>• Ne mangez pas de plats épicés, d'aliments frits ou d'aliments ayant une forte odeur.</li> <li>• Limitez la caféine (the, café) et évitez l'alcool.</li> </ul> <p><b>Si vous avez de la nausée ou si vous vomissez :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez votre / vos médicaments contre la nausée (selon les besoins) et conformément aux instructions.</li> <li>• Demandez à votre équipe de soins de santé la brochure <a href="#">Nausée et vomissements</a> pour obtenir plus de renseignements.</li> <li>• Contactez votre équipe de soins de santé si: <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Votre nausée dure plus de 48 heures</li> <li>◊ Vos vomissements durent plus de 24 heures ou si vous vomissez beaucoup</li> </ul> </li> </ul>	<p>Consultez votre équipe de soins de santé si votre nausée dure plus de 48 heures, si vous vomissez pendant plus de 24h ou si vos vomissements sont graves.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Réactions allergiques</b></p> <p>(Peuvent être graves)</p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fièvre, démangeaisons, éruption cutanée, lèvres enflées, tension dans le visage, ou la langue, la poitrine ou la gorge.</li> <li>• Cela peut se produire pendant ou peu après votre traitement et peut être grave.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informez immédiatement le personnel infirmier en cas de symptômes de réaction allergique pendant ou juste après votre traitement.</li> <li>• Consultez votre équipe de soins de santé si vous avez une réaction cutanée peu grave.</li> </ul>	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence en cas de symptômes graves.</p>
<p><b>Manque d'appétit</b></p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous ne voulez pas manger ou n'avez pas faim.</li> <li>• Perte de poids.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez de manger vos aliments préférés.</li> <li>• Mangez de petites quantités tout au long de la journée.</li> <li>• Il se peut que vous ayez à prendre des compléments de repas pour maintenir votre poids.</li> <li>• Consultez votre équipe de soins de santé si vous manquez d'appétit.</li> </ul> <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure <a href="#">Perte d'appétit</a> pour obtenir davantage de renseignements.</p>	<p>Consultez votre équipe de soins de santé si vos symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Diarrhée</b></p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selles molles, liquides et non moulées, ce qui peut arriver des jours et des semaines après le traitement.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Si vous avez de la diarrhée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenez un médicament contre la diarrhée si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit un ou vous a recommandé d'en prendre.</li> <li>Ne mangez pas d'aliments ni ne buvez de boissons qui contiennent des édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons diététiques), de café ou d'alcool.</li> <li>Mangez peu mais souvent plutôt que de prendre 2-3 grands repas.</li> <li>Buvez au moins 6-8 tasses de liquides chaque jour, à moins que votre équipe de soins de santé ne vous ait recommandé de boire plus ou moins.</li> <li>Consultez votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire entre 6 et 8 tasses de liquides par jour quand vous avez la diarrhée. Il se peut que vous ayez à boire des liquides particuliers contenant du sel et du sucre, ce qui s'appelle la thérapie de réhydratation orale.</li> <li>Consultez votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 h ou si vous avez de la diarrhée plus de 7 fois par jour, même en prenant des médicaments contre la diarrhée.</li> </ul> <p>Demandez à votre équipe de soins de vous fournir la brochure sur la <a href="#">Diarrhée</a> pour obtenir davantage de renseignements.</p>	<p>Consultez votre équipe de soins de santé si vous ne constatez pas d'amélioration dans les 24 h suivant la prise de médicaments contre la diarrhée ou si les symptômes s'aggravent (plus de 7 fois par jour).</p>
<p><b>Troubles hépatiques</b></p> <p>(Peuvent être graves)</p> <p>Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre fonction hépatique à l'aide d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne causent généralement aucun symptôme.</p>	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans de rares cas, vous pouvez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Ils peuvent être graves.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>En cas de symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence.</b></p>	
<p><b>Fatigue</b></p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatigue ou manque d'énergie qui dure et qui ne se résout pas en se reposant ou en dormant.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soyez actif. Essayez de faire un peu d'exercice modéré pendant 30 minutes presque chaque jour (il faut que vous soyez capable de parler tout en faisant de l'exercice)</li> <li>• Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer toute nouvelle forme d'exercice.</li> <li>• Prenez votre temps, ne vous surmenez pas. Remettez à plus tard les activités moins importantes. Reposez-vous quand c'est nécessaire.</li> <li>• Demandez à un membre de votre famille ou à des amis de vous aider à faire certaines tâches, comme le ménage, les courses ou de vous aider à vous occuper de vos enfants ou d'un animal de compagnie.</li> <li>• Mangez sainement et buvez au moins 6-8 verres d'eau chaque jour (à moins que votre équipe de soins de santé vous ait demandé de boire plus ou moins).</li> <li>• Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué.</li> </ul> <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la <a href="#">Fatigue</a> pour obtenir plus de renseignements.</p>	<p>Consultez votre équipe de soins de santé si vos symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Maux de tête légers; douleurs musculaires et articulaires mineures ou crampes</b></p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête légers.</li> <li>• Nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires ou sensations douloureuses dans le corps.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez des médicaments anti-douleurs (acétaminophène ou opioïdes comme de la codéine, de la morphine, de l'hydromorphone, de l'oxycodone) conformément aux doses prescrites.</li> <li>• Lisez la section ci-dessus: « <b>Que dois-je faire si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?</b> », avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol®), de l'ibuprofène (Advil®, Motrin®), du naproxène (Aleve®) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui doit être traitée ou peuvent augmenter le risque de saignements.</li> <li>• Reposez-vous souvent et essayez de faire de l'exercice modéré (comme la marche), car cela pourrait vous aider.</li> </ul> <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la <a href="#">Douleur</a> pour obtenir plus de renseignements.</p> <p><b>En cas de mal de tête soudain et grave, demandez de l'aide médicale d'urgence immédiatement.</b></p>	<p>Consultez votre équipe de soins de santé si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>
<p><b>Taux de glycémie élevé</b></p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que vous ayez tout le temps soif.</li> <li>• Il est possible que vous ayez fréquemment envie d'uriner.</li> <li>• Il est possible que vous soyez fatigué ou somnolent.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Que faire ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre équipe de soins de santé fera peut-être un test sanguin pour vérifier votre taux de glycémie.</li> <li>• On vous dira peut-être de changer votre régime alimentaire ou on vous donnera peut-être un médicament pour diminuer votre taux de glycémie.</li> <li>• Si vous souffrez de diabète, vérifiez votre taux de glycémie régulièrement. Il se peut que votre équipe de soins de santé vous demande de vérifier ce taux plus souvent que d'habitude</li> </ul>	
<p><b>Taux de cholestérol ou taux de lipides dans le sang supérieur au taux normal</b></p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un taux de cholestérol ou un taux de lipides élevé ne cause généralement pas de symptômes.</li> <li>• Comme votre traitement peut potentiellement causer un taux de cholestérol élevé, il est possible que votre équipe de soins de santé teste régulièrement votre niveau de cholestérol.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il se peut que votre équipe de soins de santé vous donne un médicament pour traiter un taux de cholestérol élevé ou des niveaux de lipides trop élevés.</li> <li>• Si vous prenez déjà un médicament pour traiter un taux de cholestérol ou des niveaux de lipides élevés, il se peut que votre équipe de soins de santé modifie le dosage du médicament que vous prenez.</li> </ul>	<p>Consultez votre équipe de soins de santé si vos symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Problèmes de pancréas</b></p> <p>(Peuvent être graves)</p> <p><b>Signes à surveiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des changements au pancréas ne créent généralement pas de symptômes</li> <li>• Il se peut que, dans certains cas, vous ressentiez une douleur au centre de votre abdomen, qui peut parfois se propager dans votre dos.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il se peut que votre équipe de soignants fasse des tests sanguins pour procéder au suivi du taux d'enzymes dans votre pancréas.</li> </ul> <p><b>Si vous ressentez un symptôme, quel qu'il soit, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</b></p>	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

**D'autres effets secondaires rares, mais graves sont possibles.**

**Si vous ressentez N'IMPORTE LEQUEL des symptômes suivants, contactez votre équipe de soins de santé qui traite votre cancer ou demandez de l'aide médicale d'urgence, immédiatement :**

- Fièvre de 38,3°C (100,9°F) ou plus à n'importe quel moment OU fièvre de 38,0°C (100,4°F) plus pendant au moins une heure
- Saignement des gencives, saignements du nez graves ou inhabituels, propension aux ecchymoses ou plus d'ecchymoses que d'habitude, selles (matière fécale) de couleur noirâtre ou du sang dans vos selles (matière fécale), ou si vous toussiez et produisez du mucus de couleur rougeâtre ou brunâtre
- Douleurs, enflures, ou durcissement des veines sur vos bras ou vos jambes
- Problèmes de respiration, douleurs à la poitrine ou si vous toussiez et crachez du sang.
- Vous avez des difficultés à voir, à parler ou à utiliser vos bras et vos jambes
- Rougeurs, irritation, ecchymoses et / ou enflures de la peau à l'endroit de l'injection

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.  
janvier 2024 Page 12 of 13

- Palpitations, difficultés à respirer, vertiges et évanouissement
- Nouvelles douleurs dorsales avec enflure, envie d'uriner moins fréquente que d'habitude et gain de poids inhabituel

### Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : \_\_\_\_\_

Pendant la journée, je dois joindre : \_\_\_\_\_

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés  
: \_\_\_\_\_

### Autres remarques :

---

---

---

---

---

---

### January 2024 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*