Fiche d'information sur les médicaments

dacomitinib (DAK-oh-MI-ti-nib)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): VizimproMC

Présentation: Comprimé ; diverses doses

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement d'un certain type de cancer du poumon appelé cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC)

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

Informez votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez déjà eu des troubles de santé importants, en particulier :

- Diarrhée fréquente
- Troubles oculaires
- Troubles rénaux, pulmonaires (autres que le cancer du poumon)
- Allergies.

Les comprimés de dacomitinib contiennent une faible quantité de lactose. Si vous avez une intolérance au lactose, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

N'oubliez pas de :

- Parlez à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuez à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé des sujets suivants :

- La façon dont ce médicament pourrait influer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce médicament pourrait influer sur votre capacité à concevoir un enfant, le cas échéant.

Ce médicament peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux contraceptifs efficaces** pendant au moins **2 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la bonne contraception pour vous.
- Vous ne devez pas allaiter pendant ce traitement et pendant au moins **deux mois** après la prise de la dernière dose.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est généralement pris oralement une fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé quand et comment prendre votre traitement.
- Prenez la dose à la même heure chaque jour.
- Avalez-le entier avec un verre d'eau, avec ou sans repas.
- Ne l'écrasez pas et ne le mâchez pas.
- Si vous prenez des médicaments qui réduisent votre production d'acide gastrique, parlez à votre équipe de soins de santé. Lisez la partie ci-dessous « Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament? »
- Si vous manquez une dose, sautez-la. Prenez la dose suivante à l'heure normale. Ne doublez pas la dose pour rattraper la dose oubliée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, ne prenez pas de dose supplémentaire. Prenez la dose suivant à l'heure normale le lendemain.
- Si vous ingérez une dose trop élevée de votre médicament oral contre le cancer par accident, ou si vous pensez qu'un enfant ou un animal domestique peut avoir avalé votre médicament, appelez le Centre antipoison de l'Ontario immédiatement : 1-800-268-9017.

Pour traiter la diarrhée

Le dacomitinib peut provoquer la diarrhée. La diarrhée est des selles molles (ou liquides) ou le besoin d'aller à la selle plus souvent que d'habitude. La diarrhée peut commencer quelques jours après votre traitement.

Vous pourriez recevoir un médicament appelé lopéramide (Imodium^{MD}) pour traiter la diarrhée. Prenez ce médicament uniquement si vous en avez besoin.

Gardez le lopéramide avec vous en tout temps. Quand la diarrhée commence, prenez le lopéramide immédiatement et continuez d'en prendre jusqu'à ce qu'elle ait disparu pendant 12 heures.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Ces interactions peuvent freiner l'efficacité du traitement ou causer des effets secondaires graves.
- Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :
  - médicaments sur ordonnance et en vente libre et de toute autre drogue, telle que le cannabis (à usage médical ou récréatif)
  - produits de santé naturels tels que les vitamines, tisanes, médicaments homéopathiques et autres compléments.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter de prendre un de ces traitements.
- Si vous prenez des médicaments appelés « antagonistes des récepteurs H2 », tels que la ranitidine (Zantac^{MD}) ou la famotidine (Pepcid^{MD}), prenez le dacomitinib au moins deux heures avant ou dix heures après avoir pris vos antagonistes des récepteurs H2.

Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- **Prenez** toujours votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments contre la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) ou l'ibuprofène (Advil^{MD}).
  - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
  - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient

faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir que vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous vous sentez chaud ou mal (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :
  - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

    OU
  - 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.

Si vous avez de la fièvre :

- **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de les joindre pour obtenir des conseils, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence.**
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Fièvre pour en savoir davantage.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une légère douleur :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel médicament vous convient. **L'acétaminophène (Tylenol^{MD})** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.
- **Parlez avec votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre** de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), naproxène (Aleve^{MD}) ou ASA (Aspirin^{MD}), car ils peuvent aggraver votre risque d'hémorragie ou interagir avec votre traitement contre le cancer.
- Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Ce que vous DEVEZ FAIRE lorsque vous prenez ce médicament :

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer ou de recevoir un traitement dentaire ou d'autres interventions médicales.
- PROTÉGEZ votre peau du soleil. Portez une chemise à manches longues, un pantalon et un

chapeau. Appliquez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30. Votre peau pouvant être plus sensible au soleil, cela pourrait donc précipiter l'apparition de gros coups de soleil ou d'éruption cutanée.

Ce que vous NE DEVEZ PAS faire lorsque vous prenez ce médicament :

- NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en parler à votre équipe de soins de santé auparavant. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- NE CONDUISEZ PAS, n'utilisez pas de machines et ne faites aucune tâche qui nécessite d'être alerte si vous avez des troubles de la vision, ou si vous vous sentez fatigué ou étourdi.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Ne jetez aucun médicament non utilisé à la maison. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.
- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Gardez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Comment manipuler les médicaments contre le cancer administrés par voie orale de manière sécuritaire :

Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.
- Avalez chaque comprimé en entier. Ne l'écrasez pas et ne le mâchez pas.

Si vous êtes un aidant :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas été en contact avec le médicament contre le cancer administré par voie orale.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.

- Ne touchez pas les médicaments contre le cancer administrés par voie orale si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Que faire en cas de contact du médicament contre le cancer administré par voie orale avec la peau ou avec les yeux?

En cas de contact avec la peau :

- Lavez votre peau avec beaucoup de savon et d'eau.
- Si votre peau devient rouge ou irritée, communiquez avec votre équipe de soins de santé.

En cas de contact avec les yeux :

- Rincez vos yeux à l'eau courante sans attendre. Laissez l'eau couler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez du dacomitinib. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus au moins courants. Il est peu probable que vous ressentiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en ressentir d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous rencontrez des effets secondaires lorsque vous prenez du dacomitinib.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
Diarrhée (Peut être grave) **Signes à surveiller :** • Selles molles, liquides pouvant survenir des jours ou des semaines après le traitement.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'antidiarrhéique, ou si elle est grave (plus de 7

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
Que faire? **Si vous avez la diarrhée :** • Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou vous a recommandé d'en prendre. • Évitez les aliments et boissons contenant des édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool. • Mangez de nombreux petits repas et collations au lieu de deux ou trois gros repas. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Parlez à votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez devoir boire des liquides spéciaux avec du sel et du sucre, appelés thérapie par réhydratation orale. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'antidiarrhéique, ou si vous avez la diarrhée plus de 7 fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Diarrhée pour de plus amples renseignements.	fois par jour).
Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons (Peuvent être graves) **Signes à surveiller :** • Votre peau pourrait être craquelée, rugueuse ou peler à certains endroits. • Votre peau pourrait avoir une apparence rouge et chaude, comme avec un coup de soleil. • Votre peau pourrait vous démanger, vous brûler, piquer ou être très sensible au toucher.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
Que faire? **Pour éviter et traiter la peau sèche :** • Utilisez un hydratant pour la peau sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez 6 à 8 tasses de liquide non alcoolisé, sans caféine chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. **Les éruptions cutanées peuvent être graves dans de rares cas, et faire peler votre peau ou provoquer des ampoules. Si cela se produit, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.**	
Ulcères buccaux (Généralement légers) **Signes à surveiller :** • Des ulcères ronds, douloureux, gris ou blancs peuvent apparaître dans votre bouche sur la langue, les lèvres, les gencives ou à l'intérieur de vos joues. • Dans des cas plus graves, il peut être difficile d'avaler, de manger ou de se brosser les dents. • Ils peuvent durer 3 jours ou plus. **Que faire?** **Pour prévenir les ulcères buccaux :** • Prenez soin de votre bouche en vous brossant les dents doucement et en passant de la soie dentaire régulièrement. • Rincez-vous souvent la bouche à l'aide d'un rince-bouche maison. • Pour préparer un rince-bouche maison, mélangez une cuillère a thé de	Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez des ulcères buccaux ou sur vos lèvres, ou si vous avez de la difficulté à manger, boire ou avaler.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
bicarbonate de soude et une cuillère à thé de sel dans quatre tasses (1 l) d'eau. • N'utilisez pas de rince-bouches vendus dans le commerce, en particulier ceux qui contiennent de l'alcool, car ils peuvent irriter votre bouche. **En cas d'ulcères buccaux :** • Évitez les aliments chauds, épicés, acidulés, durs ou croquants. • Votre médecin pourrait prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcères buccaux et prévenir l'infection. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez des ulcères buccaux ou sur vos lèvres, ou si vous avez de la difficulté à manger, boire ou avaler. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Soins bucco-dentaires pour en savoir davantage.	
Changements au niveau des ongles (Peuvent être graves) **Signes à surveiller :** • Vous pourriez observer des changements de la couleur de vos ongles, de la douleur ou une sensibilité, des cuticules enflées ou un décollement des ongles. • Vos ongles reviendront lentement à la normale après la fin du traitement. **Que faire?** • Hydratez vos ongles et cuticules. • N'utilisez pas de vernis à ongles ni de faux ongles jusqu'à ce que vos ongles soient revenus à leur état normal. • Portez des gants pour le ménage ou le jardinage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
Trop ou trop peu de sel dans votre organisme **Signes à surveiller :** • Spasmes, crampes, faiblesse, contractions ou convulsions musculaires. • Rythme cardiaque irrégulier, confusion ou changements de la pression artérielle. **Que faire?** **Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.**	Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement en cas de symptômes graves.
Faible appétit **Signes à surveiller :** • Perte d'intérêt envers la nourriture ou perte de la sensation de faim. • Perte de poids. **Que faire?** • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez des petits repas tout au long de la journée. • Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments pour vous aider à maintenir votre poids. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Perte d'appétit pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
Troubles hépatiques (Peuvent être graves) Votre équipe de soins de santé pourrait contrôler votre fonction hépatique au moyen d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne provoquent généralement pas de symptômes. **Signes à surveiller :** • Dans de rares cas, vous pourriez avoir la peau ou les yeux jaunâtres, une urine foncée ou ressentir une douleur abdominale du côté droit. Cela peut être grave. **Que faire?** **Si vous avez des symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.**	Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.
Troubles oculaires (Peuvent être graves) **Signes à surveiller :** • Vous pourriez avoir les yeux secs, irrités ou douloureux. • Ils pourraient être rouges et larmoyants. • Ils pourraient être sensibles à la lumière et vous pourriez voir trouble. **Que faire?** • Éviter de porter des lentilles de contact. • Portez des lunettes de soleil avec protection contre les UV. • Utilisez des lunettes de protection (ou un casque avec écran facial)	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus tôt possible.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
lorsque vous pratiquez des sports, que vous tondez la pelouse ou que vous pratiquez toute activité lors de laquelle vous pourriez avoir des particules ou de la fumée dans les yeux. • Vous pourriez essayer des larmes artificielles (gouttes) ou pommades.	
Perte de cheveux **Signes à surveiller :** • Vos cheveux peuvent commencer à s'affiner ou à tomber pendant ou après le traitement. • Dans la plupart des cas, vos cheveux repousseront après le traitement, mais leur texture ou couleur peut changer. • Dans de très rares cas, la perte de cheveux peut être permanente. **Que faire?** • Utilisez une brosse douce. • Évitez la laque, décolorations, colorations et permanentes.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela vous dérange.

Toux et essoufflement
 	
Signes à surveiller :
 	
• Vous pourriez tousser ou être essoufflé.
• Voici des symptômes courants qui accompagnent la toux :
  ○ Respiration sifflante
  ○ Nez qui coule
  ○ Maux de gorge
  ○ Brûlures d'estomac
  ○ Perte de poids
  ○ Frissons et fièvre
• Dans de rares cas, elle peut être grave et s'accompagner de douleur dans la poitrine, de difficultés respiratoires, ou de crachat de sang.
	Communiquez avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à joindre votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils, et que vous avez de la fièvre ou des symptômes graves, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
Que faire? • Prenez votre température pour voir si vous avez de la fièvre. Lire la section ci-dessus : **Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?** • Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé. **Si vous n'êtes pas en mesure de les joindre pour obtenir des conseils, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence.** • **Si vous avez une toux grave accompagnée de douleur dans la poitrine, de difficultés respiratoires ou que vous crachez du sang, obtenez une aide médicale immédiatement.**	
Nausées et vomissements (Généralement légers) **Signes à surveiller :** • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez aussi ressentir des étourdissements. • Vous pourriez ressentir des nausées dans les heures et les jours suivant votre traitement. **Que faire?** **Pour éviter la nausée :** • Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool.	Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre équipe de soins de santé.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**

En cas de nausées ou de vomissements :
 	
• Prenez vos médicaments antinauséeux de secours (au besoin) comme ils vous ont été prescrits.
• Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.
• Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants :
  ◦ Des nausées persistant pendant plus de 48 heures
  ◦ Des vomissements graves ou persistants pendant plus de 24 heures	

Éruption cutanée sur les mains et les pieds (syndrome main-pied) **Signes à surveiller :** • Fourmillement ou enflure de la peau sur la paume des mains et la plante des pieds. Elle peut devenir douloureuse, rouge et engourdie. • Dans les cas les plus graves, votre peau peut commencer à peler et vous pouvez avoir des ampoules ou des plaies. • Cela peut se produire des jours ou des semaines après le début du traitement. **Que faire?** **Pour prévenir le syndrome d'enflure douloureuse des mains et des pieds** • Évitez les activités qui peuvent causer une pression ou une friction sur votre peau, comme faire du nettoyage intensif, utiliser des outils, taper à l'ordinateur, jouer d'un instrument de musique ou conduire une voiture. • Hydratez vos mains et vos pieds souvent, particulièrement au niveau des plis de la peau. • Portez des vêtements et des chaussures amples et confortables. • Reposez-vous et évitez de rester longtemps debout. • Évitez d'exposer vos mains et vos pieds à une chaleur excessive.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Syndrome main-pied pour de plus amples renseignements.	
Fatigue **Signes à surveiller :** • Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne disparaît pas avec le repos ou le sommeil. **Que faire?** • Soyez actif. Essayez de faire 30 minutes d'activité physique modérée (vous arrivez à parler aisément pendant l'exercice) la plupart des jours. • Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités peu importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches telles que le ménage, les courses, ou pour vous occuper des enfants ou animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou autre liquide chaque jour (sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.
Douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires **Signes à surveiller :** • De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	**Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé**
Que faire? • Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opiacés tels que la codéine, morphine, hydromorphone, oxycodone) comme prescrit. • Lisez la section ci-dessus : « **Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? »** avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol[MD]), de l'ibuprofène (Advil[MD], Motrin[MD]), du naproxène (Aleve[MD]) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler une infection qui nécessite un traitement, ou peuvent aggraver votre risque d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez une activité physique légère (comme la marche), cela pourrait vous aider. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Douleur pour en savoir davantage.	
Difficulté à dormir Vos médicaments peuvent vous causer de la difficulté à dormir. Elle peut disparaître à mesure que votre corps s'habituera au médicament ou quand votre traitement se terminera. **Signes à surveiller :** • Vous pourriez avoir de la difficulté à vous endormir ou à rester endormi. • La qualité de votre sommeil peut changer au cours de votre traitement. Par exemple, vous pourriez mal dormir pendant plusieurs nuits, puis bien dormir la nuit suivante. • Vous pourriez vous réveiller trop tôt ou ne pas vous sentir reposé après une nuit de sommeil. • Vous pourriez vous sentir fatigué ou somnolent pendant la journée. **Que faire?** Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

June 2022 Updated/revised info sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.