

dégarélix (dé-ga-ré-lix)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Firmagon^{MD}

Présentation: Claire solution

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament?

- Pour le traitement du cancer de la prostate.

Avant son administration

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement des troubles cardiaques (y compris des irrégularités des battements cardiaques), des troubles du foie ou des reins, un déséquilibre des sels corporels, un diabète, de l'anémie, des troubles des os ou des allergies.
- Les patients atteints d'un cancer sont exposés à des risques plus élevés de développer d'autres cancers. De plus, certains médicaments contre le cancer, peuvent accroître ces risques. Vous devriez en parler avec votre médecin.

Comment ce médicament est-il administré?

- Ce médicament est injecté sous la peau.
- N'oubliez pas de vous rendre chez votre médecin pour vos injections répétées. Demandez à votre spécialiste des soins de santé quels sont les médicaments et les fournitures que vous devez apporter avec vous lors de votre prochaine visite.

Pendant la prise de ce médicament

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, ce qui peut en réduire l'efficacité ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous de remettre à votre médecin et à votre pharmacien la liste

complète de tous vos médicaments et suppléments alimentaires et de leur indiquer tous les changements, ce qui comprend les médicaments vendus avec ou sans ordonnance, les vitamines et les herbes médicinales. Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou supplément, ou avant de cesser de le faire, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Utilisez de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) pour les maux de tête légers, la douleur et la fièvre. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée dans votre cas. Parlez à votre médecin avant de commencer d'autres médicaments comme l'ibuprofène (Advil^{MD}) ou le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine, puisqu'ils peuvent augmenter le risque de saignement. Si vous prenez déjà régulièrement de l'aspirine, par exemple en raison d'un trouble cardiaque, dites-le à votre médecin. Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre ces médicaments, car ils peuvent masquer la fièvre.

Sécurité et conservation

- Conservez ce médicament à la température ambiante, dans son emballage original, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

Effets secondaires et que faire

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous souffrez d'effets secondaires dérangeants et inhabituels, discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p>Réactions au site d'injection (rougeurs, démangeaisons, bleus, légères éruptions cutanées ou enflure)</p>	<p>Contactez votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent</p>
<p>Augmentation de la transpiration et sensations de chaleur (bouffées de chaleur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine (le thé, le café, le cola), le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur. • Faites de l'exercice régulièrement, tenez au frais, habillez-vous avec des vêtements légers, buvez beaucoup d'eau. Peut s'améliorer avec le temps. 	<p>Contactez votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent</p>
<p>Problèmes cardiaques (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure, essoufflement)</p>	<p>Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence</p>
<p>Anomalies des épreuves du foie faites en laboratoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin contrôlera périodiquement ces examens. Si votre peau ou vos yeux présentent une coloration jaunâtre ou si la couleur de votre urine devient foncée, communiquez avec votre médecin. 	<p>Contactez votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent</p>
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
<p>Douleur aux os; Perte osseuse Fractures des os (effet à long terme)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Être à l'affût de toute douleur osseuse intense ou inhabituelle, dont au dos, aux hanches, aux poignets ou à d'autres os. • Votre médecin pourrait mesurer votre densité osseuse régulièrement. • Dégarélix peut augmenter le risque de perte osseuse ou de fractures. Pour prévenir cela, votre médecin pourrait vous dire de prendre des suppléments de calcium et de vitamine D ou d'autres médicaments prescrits pour traiter l'ostéoporose. Discutez avec votre médecin avant de prendre ces suppléments. • Obtenir des soins médicaux d'urgence si vous avez une fracture osseuse (importante douleur osseuse, incapacité de bouger) • Vous pouvez en savoir davantage sur la santé des os par l'alimentation et les habitudes de vie dans le dépliant sur la Santé des os chez les femmes 	<p>Contactez votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent</p>

ménopausées*.	
Obstruction d'une artère (vaisseau sanguine) dans le cœur, le cerveau, la poitrine, l'abdomen ou un membre; ce blocage peut entraîner un accident vasculaire cérébral (perte soudaine de la vue, de la parole ou de l'usage des membres) ou une crise cardiaque (douleurs dans la poitrine, essoufflement, douleurs dans l'abdomen ou un membre)	Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence
Réaction au médicament (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, bouffées vasomotrices, étourdissements, essoufflement, serrement à la poitrine ou à la gorge) <ul style="list-style-type: none"> • On pourrait vous donner des médicaments pour prévenir ou traiter cette réaction • Peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament. 	Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.