



dostarlimab

Prononciation: dos-TAR-li-mab

Autre nom(s): Jemperli

Présentation: solution incolore à jaune, mélangée dans de plus grands sacs de liquide

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

- Ce médicament est utilisé pour traiter le cancer de l'endomètre (cancer du tissu utérin).
- Le dostarlimab est un médicament d'immunothérapie. Pour en savoir plus sur l'immunothérapie, cliquez [ici](#).

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- des troubles du système immunitaire (comme la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus) ou si vous prenez des médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire (par exemple, la prednisone);
- des problèmes dans les glandes productrices d'hormones (comme la thyroïde, l'hypophyse ou les glandes surrénales);
- le diabète;
- des problèmes hépatiques, rénaux ou pulmonaires;
- des réactions cutanées graves à d'autres médicaments contre le cancer;
- une transplantation d'organe ou de cellules souches;
- des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est administré par voie intraveineuse (injecté dans une veine). Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître le calendrier de votre traitement.
- Si vous avez manqué votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

À FAIRE pendant le traitement

- ✓ **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- ✓ **PENSEZ À DEMANDER** à quelqu'un de vous conduire à l'hôpital puis de vous ramener chez vous les jours de traitement. Vous pourriez ressentir une somnolence ou des étourdissements après votre traitement.
- ✓ **INFORMEZ** votre équipe de soins de santé si vous développez de nouveaux symptômes. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent.
- ✓ **INFORMEZ** votre équipe de soins de santé si vous présentez ou avez eu une infection grave.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- ✗ **NE PRENEZ PAS** d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre ou des produits de santé naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ **NE COMMENCEZ PAS** de traitements complémentaires ou parallèles, comme l'acupuncture ou des médicaments homéopathiques sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ **N'UTILISEZ PAS** de produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou **NE BUVEZ PAS** d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Il est peu probable que ce médicament interagisse avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments ou des produits de santé naturels, mais informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :

- des médicaments avec ou sans ordonnance, ou toute autre drogue, le cannabis/la marijuana par exemple (à titre médical ou récréatif);
- des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.

Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un de ces traitements.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

OU

 - 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous **DEVEZ** immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé par rapport aux sujets suivants :

- la façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle;
- la façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez simultanément utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** jusqu'à **4 mois** après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement et pendant au moins **4 mois** après votre dernière dose.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le dostarlimab fait travailler plus fort votre système immunitaire. C'est votre système immunitaire qui combat les infections et votre cancer.

Lorsque votre système immunitaire travaille plus fort, vous pouvez ressentir des effets secondaires dans vos intestins, votre foie, vos poumons, votre peau, vos reins, vos hormones et autres organes.

Ces effets secondaires peuvent être légers ou, dans de rares cas, devenir graves ou mettre votre vie en danger.

Ils peuvent survenir pendant votre traitement ou des semaines ou des mois après la fin de celui-ci.

Voici les effets à surveiller :

- la diarrhée;
- une nouvelle toux;
- les problèmes respiratoires;
- l'éruption cutanée;
- tout autre nouveau symptôme.

Si vous présentez des effets secondaires, parlez-en immédiatement à votre équipe de soins de santé. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement urgent.

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous recevez un traitement au moyen du dostarlimab. Il les énumère des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas recensés.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour connaître les symptômes auxquels vous devez prêter attention et pour connaître le moment de demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous ressentez l'un de ces effets secondaires au cours d'un traitement au moyen du dostarlimab.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Anémie (diminution du nombre de globules rouges) (Peut être grave) Quels sont les signes à surveiller? • Vous pourriez vous sentir plus fatigué ou faible que la normale. • Votre peau sera pâle et vos mains et vos pieds seront froids. • Vous pourriez vous sentir essoufflé ou étourdi. • Cela peut se produire de quelques jours à quelques semaines après le début du traitement. Que faire? Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez de l'anémie (un faible taux de globules rouges) : • Reposez-vous souvent et ayez une bonne alimentation. • Des exercices légers, comme la marche, peuvent aider. • Vous aurez peut-être besoin de médicaments ou d'une transfusion sanguine. • Si c'est très grave, votre médecin pourrait devoir apporter des modifications à votre régime de traitement.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Nausées et vomissements (Ces symptômes sont habituellement légers) Quels sont les signes à surveiller? • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez également vous sentir étourdi. • Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. Que faire? Pour prévenir la nausée : • Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter. • Si on vous a donné des médicaments antinauséeux, prenez-les selon ce qui a été prescrit, même si vous n'avez pas envie de vomir.	Parlez à votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
• Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. En cas de nausée ou de vomissements : • Prenez vos médicaments antinauséeux (au besoin) selon ce qui a été prescrit. • Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Nausée et vomissements. • Parlez à votre équipe de soins de santé si : ◦ la nausée persiste au-delà de 48 heures; ◦ les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.	
Diarrhée Quels sont les signes à surveiller? • Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou les semaines suivant votre traitement. Que faire? Si vous avez la diarrhée : • Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé. • Évitez les aliments ou boissons avec édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool jusqu'à ce que la diarrhée cesse. • Mangez plusieurs repas légers au lieu de deux ou trois gros repas. • Buvez au moins six à huit tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. • Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire six à huit tasses de liquides par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, procédé appelé réhydratation par voie orale. Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Diarrhée.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Dans de rares cas, votre diarrhée peut être grave en raison de l'inflammation des intestins si : • vous avez du sang dans vos selles; • vous avez plus de quatre selles (faire caca) par jour (si cela n'est pas normal pour vous). Si cela se produit, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement aux urgences.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe de soins de santé pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Douleurs articulaires ou musculaires légères, ou crampes Quels sont les signes à surveiller? - Nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires ou sensation de douleur généralisée. Que faire? - Prenez des médicaments (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. - Lisez la section ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, si j'ai des maux de tête ou si je fais de la fièvre? » avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui nécessite un traitement ou aggraver votre risque d'hémorragie. - Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider. Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulé Douleur.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Éruption cutanée Quels sont les signes à surveiller? - Vous pourriez voir apparaître des rougeurs et avoir une sensation de chaleur, comme après un coup de soleil. - Vous pourriez avoir des bosses sur la peau, des sensations de démangeaisons, de brûlures, de piqûres ou une sensibilité extrême au toucher.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? Prévention et traitement de la peau sèche : • Utilisez un soin hydratant sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez une protection solaire contre les rayons UVA et UVB avec un indice de facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez chaque jour de six à huit tasses de liquides sans alcool et sans caféine, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. Dans de rares cas, l'éruption cutanée peut être grave si : • l'éruption couvre plus d'un tiers de votre peau (par exemple, tout le tronc, ou un bras ET une jambe); • l'éruption provoque des cloques ou une desquamation de la peau. Si cela se produit, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement aux urgences.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe de soins pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.
Symptômes semblables à ceux d'une grippe Vous pourriez avoir l'impression d'avoir la grippe pendant quelques jours après avoir reçu votre traitement. Ceci fait partie de la réponse de votre corps à l'immunothérapie. Ces symptômes semblables à ceux d'une grippe pourraient ne pas être un signe d'une infection. Quels sont les signes à surveiller? • Sensation de chaleur, avec ou sans fièvre • Frissons (sensation d'avoir froid et de ne pas pouvoir se réchauffer) • Douleurs ou courbatures	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? • Prenez votre température pour savoir si vous faites de la fièvre. Lisez la partie ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou si je fais de la fièvre? » • Si vous faites de la fièvre, essayez de parler à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la contacter pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	
Hypothyroïdie Des changements au niveau de la thyroïde peuvent survenir quelques semaines ou quelques mois après votre traitement. Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre activité thyroïdienne de façon régulière à l'aide d'un test sanguin. Quels sont les signes à surveiller? • Prise de poids inhabituelle • Manque d'énergie ou sensation de fatigue • Sensation d'avoir froid facilement • Peau sèche, ongles ou cheveux qui se cassent facilement • Constipation (défécation [selle] moins fréquente qu'à l'accoutumée) Que faire? • Votre équipe de soins de santé peut vous prescrire des médicaments pour traiter votre thyroïde sous-active (faible). Si vous constatez des changements de poids en même temps que l'un des autres symptômes énumérés, parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que possible.	Parlez à votre équipe de soins de santé le plus vite possible (pendant les heures d'ouverture).

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- nouvelle toux, douleur thoracique, difficulté à respirer, essoufflement ou présence de sang dans la toux;
- urine plus abondante que d'habitude et sensation de soif intense;
- signes d'allergie comme une éruption cutanée grave, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement dans la poitrine ou dans la gorge, pendant ou peu après l'administration du médicament;
- des problèmes immunitaires rares après une transplantation d'organes ou de cellules souches (si cela vous concerne). Votre équipe de soins de santé peut en discuter avec vous.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

February 2025 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.