

Fiche d'information sur les médicaments

DOXOrubicine

(Doc-so-RUBE-i-sine)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Adriamycin^{MD}**Présentation:** Solution rouge

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de la leucémie, du lymphome, des cancers du sein, de la vessie, de l'utérus et d'autres cancers.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :
 - ◊ Des problèmes cardiaques (y compris une arythmie);
 - ◊ Des troubles hépatiques;
 - ◊ Des allergies, en particulier à la doxorubicine ou à d'autres médicaments associés (p. ex., épirubicine);
 - ◊ Ou si vous avez reçu auparavant une chimiothérapie ou une radiothérapie.

N'oubliez pas de:

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre capacité à avoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce médicament peut être néfaste pour le fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, si vous tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le moindre risque que vous pourriez devenir enceinte, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et pendant au moins **6.5 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- Si vous êtes un patient qui peut mettre une personne enceinte, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et pendant au moins **3.5 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- N'allaitiez pas durant ce traitement et pendant au moins **10 jours** après la prise de la dernière dose.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine.
- Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître votre régime de traitement.
- Si vous avez raté votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Parlez à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez (avec ou sans ordonnance, tisanes et suppléments). Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un d'entre eux.

- **Pour les douleurs et maux légers et en cas de fièvre légère :**

- Si vous vous sentez mal, vérifiez votre température avant de prendre des médicaments contre la douleur ou la fièvre. Ils pourraient masquer la fièvre.
 - Vous pourriez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, AAS), y compris l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter ces médicaments.
 - **Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement au service d'urgence le plus proche.** Consultez la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accentuer les effets secondaires et nuire à l'efficacité de votre traitement. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.
 - Votre peau pourrait être plus sensible au soleil. Lorsque votre peau est exposée au soleil, vous pourriez observer une rougeur qui démange et d'autres réactions cutanées. Lorsque vous êtes exposé au soleil, portez une chemise à manches longues, un pantalon et un chapeau pour vous protéger. Appliquez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30.
 - Il est normal que votre urine soit rouge jusqu'à deux jours suivant votre traitement à base de doxorubicine. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre urine reste rouge pendant plus de deux jours.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Perte de la densité ou chute des cheveux <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une brosse douce et évitez les vaporisateurs capillaires, décolorations, colorations et permanentes. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela vous perturbe.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

octobre 2023

Page 3 of 9

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> Dans la plupart des cas, vos cheveux repousseront après le traitement, mais la texture ou la couleur peuvent changer. 	
<p>Saignements ou hématomes inhabituels</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> Surveillez les signes de saignements (comme des saignements du nez ou des gencives inhabituels) ou des hématomes apparaissant facilement (ce qui est rare). Dans de très rares cas, des symptômes graves peuvent survenir. Si vous constatez des selles de couleur noire, une urine de couleur rouge ou rose, du mucus rouge ou brun lorsque vous toussiez, des maux de tête intenses et un état de confusion ou des saignements qui ne s'arrêtent pas, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement au service d'urgence le plus proche. <p>Consultez la brochure sur la faible numération plaquettaire pour de plus amples renseignements.</p> <p>Fièvre, frissons, infection</p> <p>(ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. <p>Pendant le traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gardez un thermomètre numérique chez vous et prenez votre température si vous vous sentez chaud ou mal (p. ex., frissons). Évitez de prendre des médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD}, acétaminophène, Advil^{MD} ou ibuprofène). Ils pourraient masquer la fièvre. Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou froid juste avant de prendre votre température. Lavez-vous les mains souvent pour prévenir les infections. Consultez votre médecin avant toute vaccination, opération, intervention médicale ou visite chez le dentiste. 	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

octobre 2023

Page 4 of 9

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.</p> <p>Consultez notre brochure sur la neutropénie (faible taux de neutrophiles) pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Nausée et vomissements</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Ces symptômes peuvent survenir pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter.</p> <p>Prévention de la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments antinauséeux selon ce qui a été prescrit par votre médecin. • Buvez des liquides clairs et mangez des petits repas légers. Prenez l'air et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. <p>En cas de nausée ou vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments antinauséeux selon ce qui a été prescrit par votre médecin. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les médicaments antinauséeux prescrits ne sont pas efficaces contre votre nausée et les vomissements. <p>Consultez la brochure sur la nausée et les vomissements pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements durent plus de 24 heures.</p>
<p>Plaies buccales</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Vous pourriez constater des plaies rondes, douloureuses, blanches ou grises à l'intérieur de votre bouche sur la langue, les lèvres, les gencives, ou à l'intérieur de vos joues. Dans les cas les plus graves, elles peuvent vous gêner pour avaler, manger ou vous brosser les dents. Elles durent généralement une à deux semaines.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus vite possible.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Prévention des plaies buccales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez soin de votre bouche en brossant vos dents doucement et en passant régulièrement du fil dentaire. • Rincez souvent votre bouche. N'utilisez pas de rince-bouche contenant de l'alcool. • Préparez un rince-bouche maison : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mélangez une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 l) d'eau. <p>Si vous avez des plaies buccales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous constatez des plaies buccales ou aux lèvres ou si vous avez des douleurs lorsque vous avalez. • Évitez les aliments chauds, épicés, acides, durs ou craquants. Votre médecin peut vous prescrire un rince-bouche pour soulager les plaies buccales et éviter les infections. <p>Consultez la brochure sur les soins bucco-dentaires pour de plus amples renseignements.</p>	

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Perte d'appétit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez perdre l'appétit ou du poids. • Essayez des aliments que vous aimez et mangez des petits repas tout au long de la journée. • Vous pouvez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids. • Consultez votre équipe de soins de santé si vous avez peu d'appétit. <p>Consultez la brochure sur la perte d'appétit pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

octobre 2023

Page 6 of 9

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Diarrhée</p> <p>Ces symptômes peuvent apparaître pendant les jours ou les semaines après le début de votre traitement.</p> <p>Si vous avez la diarrhée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit. • Évitez les aliments ou boissons avec édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool. • Mangez plusieurs repas légers au lieu de deux ou trois gros repas. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide par jour. Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, procédé appelé réhydratation par voie orale. <p>Consultez la brochure sur la diarrhée pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>Réactions au point d'injection</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez voir apparaître des rougeurs, des bleus ou des enflures ou ressentir des démangeaisons au point d'injection sur votre peau. • Ces réactions sont généralement bénignes et disparaissent en l'espace d'un à trois jours. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informez immédiatement le personnel infirmier qui s'occupe de vous si vous ressentez une brûlure, un picotement ou une autre douleur pendant l'injection de la doxorubicine dans votre veine. • Vous pourriez avoir à appliquer des compresses chaudes ou froides/glacées si vous constatez des rougeurs ou un inconfort léger. Cela dépend du médicament qui a provoqué la réaction. • Parlez à votre équipe de soins de santé pour savoir quel traitement est adapté à votre cas. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus vite possible.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023 Page 7 of 9

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous rencontrez L'UN des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Arythmie cardiaque, essoufflement, pertes de connaissance ou gonflements des jambes ou du ventre;
- Douleur dans la poitrine, le ventre ou le bras;
- Douleur et gonflement ou durcissement d'une veine de votre bras ou jambe;
- Difficulté respiratoire ou présence de sang dans la toux;
- Éruptions cutanées intenses, démangeaisons, rougeur de la face et du cou, étourdissements, serrement dans la gorge et la poitrine (pendant ou juste après l'administration du médicament);
- Douleur dans le bas du dos, enflure, miction moins importante qu'à l'accoutumée et prise de poids inhabituelle;
- Contractions musculaires, faiblesse intense ou crampes, sensation de confusion ou d'agitation;
- Jaunissement de la peau ou des yeux, urines inhabituellement sombres ou douleur abdominale du côté droit;
- Rougeurs/éruptions cutanées dans des zones où vous avez reçu une radiothérapie.

Parlez à votre équipe de soins de santé de votre risque de développer d'autres cancers à la suite de ce traitement.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

octobre 2023

Page 8 of 9

October 2023 Updated " How will this medication affect sex, pregnancy and breastfeeding" section
(Mise à jour de la section « Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement? »)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.