

## Fiche d'information sur les médicaments

**énasidénib** (É-na-SI-dé-nib)

*Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.*

**Autre nom(s):** Idhifa<sup>MD</sup>

**Présentation:** Comprimés de diverses doses, formes et couleurs

**Pourquoi ce médicament est-il utilisé?**

- Pour le traitement d'une certaine forme de cancer du sang appelé leucémie myéloïde aigüe (LMA)

**Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?**

Informez votre médecin et votre pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, en particulier :

- Des troubles rénaux, hépatiques ou pulmonaires
- Des allergies.

**N'oubliez pas de :**

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

## Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Discutez des sujets suivants avec votre équipe de soins de santé:

- L'influence possible de ce médicament sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce médicament pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, le cas échéant.

Ce médicament peut être nocif pour le fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **2 contraceptifs efficaces jusqu'à 8 semaines** après votre dernière dose de traitement.
- Ce médicament peut nuire à l'efficacité de la contraception hormonale (comme la pilule contraceptive). Si vous choisissez une méthode de contraception hormonale, assurez-vous d'utiliser également une méthode de contraception par barrière ou non hormonale (comme le préservatif). Demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les meilleures solutions de contraception pour vous.
- Vous ne devez pas allaiter pendant ce traitement et pendant au moins **8 semaines** après la prise de la dernière dose.

## Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est généralement pris oralement une fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé quand et comment prendre votre traitement.
- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la le plus tôt possible le jour-même, autrement, sautez-la et prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas de dose supplémentaire (double dose) pour compenser la dose manquée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire.
- Si vous ingérez une dose trop élevée de votre médicament oral contre le cancer par accident, ou si vous pensez qu'un enfant ou un animal domestique peut avoir avalé votre médicament, appelez le Centre antipoison de l'Ontario immédiatement : 1-800-268-9017.

### **Pour éviter les nausées et vomissements**

On pourrait vous donner des médicaments pour prévenir la nausée (envie de vomir) et les vomissements avant qu'ils ne surviennent.

- C'est ce qu'on appelle des médicaments antinauséeux, comme l'ondansetron (Zofran<sup>MD</sup>), le granisetron (Kytril<sup>MD</sup>), la prochlorpérazine (Stemetil<sup>MD</sup>), la dexaméthasone ou d'autres.

### **Pour éviter le syndrome de lyse tumorale (SLT)**

Le SLT peut se produire lorsqu'un grand nombre de cellules cancéreuses meurt rapidement et que votre organisme n'arrive pas à les éliminer suffisamment rapidement. Le SLT peut vous rendre très malade. Demandez à votre équipe de soins de santé si vous présentez un risque de SLT.

Si vous présentez un risque de SLT, on pourrait vous donner des médicaments préventifs avant votre traitement à l'énasidénib.

- Ces médicaments sont appelés anti-uricémiques (comme l'allopurinol, ou d'autres).

## **Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?**

### **Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?**

- Bien qu'il soit peu probable que ce médicament interagisse avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels, informez votre équipe de soins de santé de tous :
  - ◊ les médicaments sur ordonnance et en vente libre et de toute autre drogue, telle que le cannabis (à usage médical ou récréatif), que vous prenez
  - ◊ produits de santé naturels tels que les vitamines, tisanes, médicaments homéopathiques et autres compléments que vous prenez.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter de prendre un de ces traitements.
- Ce médicament peut nuire à l'efficacité de la contraception hormonale (comme la pilule contraceptive). Si vous utilisez une méthode de contraception hormonale, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les meilleures solutions de contraception pour vous.

**Que faire si je me sens mal, j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?**

- **Prenez** toujours votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments contre la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>) ou l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>)).
  - ◊ La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
  - ◊ Si vous prenez ces médicaments avant de prendre votre température, ils pourraient la faire baisser et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

**Comment vérifier si vous avez de la fièvre :**

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous vous sentez chaud ou mal (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :
  - ◊ 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU
  - ◊ 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.

**Si vous avez de la fièvre :**

- **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de les joindre pour obtenir des conseils, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence.**
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.

**Si vous n'avez pas de fièvre**, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une légère douleur :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel médicament vous convient. **L'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>)** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.
- **Parlez avec votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre** de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), du naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou de l'ASA (Aspirin<sup>MD</sup>), car ils peuvent aggraver votre risque d'hémorragie ou interagir avec votre traitement contre le cancer.
- Informez votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

**Ce que vous DEVEZ FAIRE lorsque vous prenez ce médicament :**

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer ou de recevoir un traitement dentaire ou d'autres interventions médicales.

**Ce que vous NE DEVEZ PAS faire lorsque vous prenez ce médicament :**

- NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en parler d'abord à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.

**Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?**

- Ne jetez aucun médicament non utilisé à la maison. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.
- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Gardez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux de compagnie.

**Comment manipuler les médicaments contre le cancer administrés par voie orale de manière sécuritaire****Si vous êtes un patient :**

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.
- Avalez chaque comprimé en entier. Ne l'écrasez pas et ne le mâchez pas.

**Si vous êtes un aidant :**

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas été en contact avec le médicament contre le cancer administré par voie orale.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.
- Ne touchez pas les médicaments contre le cancer administrés par voie orale si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

## Que faire en cas de contact du médicament contre le cancer administré par voie orale avec la peau ou avec les yeux

### En cas de contact avec la peau :

- Lavez votre peau avec beaucoup de savon et de l'eau.
- Si votre peau devient rouge ou irritée, communiquez avec votre équipe de soins de santé.

### En cas de contact avec les yeux :

- Rincez vos yeux à l'eau courante sans attendre. Laissez l'eau couler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

## Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires associés à la prise d'énasidénib. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus courants au moins courants. Il est peu probable que vous ressentiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en ressentir d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous ressentez des effets secondaires lorsque vous prenez de l'énasidénib.

| <b>Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)</b>  |   |
|---|---|
| <b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>   | <b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>  |
| <p><b>Nausées et vomissements</b></p> <p>(Généralement légers)</p> <p><b>Signes à surveiller :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez aussi ressentir des étourdissements.</li> <li>• Vous pourriez ressentir des nausées dans les heures et les jours suivants votre traitement.</li> </ul> | <p>Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures ou s'ils sont importants, communiquez avec votre équipe de soins de santé.</p> |

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

| Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)  |   |
|--|---|
| Effet secondaire et mesure à prendre   | Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé         |
| <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Pour éviter la nausée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter.</li> <li>• Prenez les médicaments antinauséeux qui vous sont prescrits, même si vous n'avez pas envie de vomir.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et mangez de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous.</li> <li>• Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte.</li> <li>• Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool.</li> </ul> <p><b>En cas de nausées ou de vomissements :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez vos médicaments antinauséeux de secours (au besoin) comme ils vous ont été prescrits.</li> <li>• Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche <a href="#">Nausées et vomissements</a> pour en savoir davantage.</li> <li>• Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Des nausées persistant pendant plus de 48 heures</li> <li>◦ Des vomissements importants ou persistants pendant plus de 24 heures</li> </ul> </li> </ul> |   |
| <p><b>Troubles hépatiques</b></p> <p>Votre équipe de soins de santé pourrait contrôler votre fonction hépatique au moyen d'une analyse sanguine. Les changements hépatiques ne provoquent généralement pas de symptômes.</p> <p><b>Signes à surveiller :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans de rares cas, vous pourriez avoir la peau ou les yeux jaunâtres, une urine foncée ou ressentir une douleur abdominale du côté droit. Cela peut être grave.</li> </ul>   | <p>Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</p> |

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.  
mai 2021

| Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)  |   |
|--|---|
| Effet secondaire et mesure à prendre   | Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé |
| <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Si vous avez des symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</b></p> |   |

| Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)   |  |
|---|--|
| Effet secondaire et mesure à prendre  | Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé  |
| <p><b>Faible appétit</b></p> <p>(Généralement léger)</p> <p><b>Signes à surveiller :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perte d'intérêt envers la nourriture ou perte de la sensation de faim.</li> <li>• Perte de poids.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez de manger vos aliments préférés.</li> <li>• Mangez des petits repas tout au long de la journée.</li> <li>• Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments pour vous aider à maintenir votre poids.</li> <li>• Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit.</li> </ul> <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche <a href="#">Perte d'appétit</a> pour en savoir davantage.</p> | <p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p> |

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

| <b>Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)</b>  |  |
|---|--|
| <b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>   | <b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>   |
| <p><b>Trop ou trop peu de sel dans votre organisme</b></p> <p><b>Signes à surveiller :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spasmes, crampes, faiblesse, contractions ou convulsions musculaires.</li> <li>• Rythme cardiaque irrégulier, confusion ou changements de la pression artérielle.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</b></p>  | <p>Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement en cas de symptômes graves.</p>   |
| <p><b>Diarrhée</b></p> <p><b>Signes à surveiller :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selles molles, liquides et non formées pouvant survenir plusieurs jours ou semaines après le traitement.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Si vous avez la diarrhée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez des médicaments anti-diarrhéique si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou vous a recommandé d'en prendre.</li> <li>• Évitez les aliments et boissons contenant des édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool.</li> <li>• Mangez plusieurs petits repas et collations au lieu de deux ou trois gros repas.</li> <li>• Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.</li> <li>• Parlez à votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez devoir boire des liquides spéciaux avec du sel et du sucre, appelés thérapie par réhydratation orale.</li> <li>• Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'anti-diarrhéique, ou si vous avez la diarrhée plus de 7 fois par jour.</li> </ul> | <p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise d'anti-diarrhéique, ou si elle est grave (plus de 7 fois par jour).</p> |

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

| <b>Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)</b>   |  |
|--|--|
| <b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>  | <b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>   |
| <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche <a href="#">Diarrhée</a> pour de plus amples renseignements.</p>   |  |
| <p><b>Fatigue</b></p> <p><b>Signes à surveiller :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne disparaît pas avec le repos ou le sommeil.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soyez actif. Essayez de faire 30 minutes d'activité physique modérée (vous arrivez à parler aisément pendant l'exercice) la plupart des jours.</li> <li>• Discutez avec votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique.</li> <li>• Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités peu importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin.</li> <li>• Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches telles que le ménage, les courses, ou pour s'occuper des enfants ou animaux de compagnie.</li> <li>• Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou autre liquide chaque jour (sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé).</li> <li>• Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué.</li> </ul> <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche <a href="#">Fatigue</a> pour en savoir davantage.</p> | <p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p> |
| <p><b>Syndrome de différentiation</b></p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Le syndrome de différentiation est provoqué par une libération importante et rapide de protéines (appelées cytokines) qui contribuent à contrôler votre système immunitaire et à combattre les maladies. Il s'agit d'un effet</p>  | <p>Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>  |

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.  
mai 2021

| <b>Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)</b>  |  |
|---|--|
| <b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>   | <b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>   |
| <p>secondaire grave qui se produit généralement une à deux semaines après le début du traitement à l'énasidénib, mais il peut aussi se produire plus tard pendant votre traitement. Le syndrome de différenciation doit être traité immédiatement.</p> <p><b>Signes à surveiller :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fièvre, nouvelle toux, difficulté à respirer</li> <li>• Enflure au niveau des bras, des jambes, du cou, de l'aîne ou des aisselles</li> <li>• Prise de poids rapide, douleur osseuse</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre équipe de soins de santé peut vous donner des médicaments pour traiter les symptômes et peut surveiller votre état à l'hôpital.</li> </ul> <p><b>Si vous présentez des symptômes du syndrome de différenciation, en particulier s'ils sont nouveaux ou graves, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.</b></p> |  |
| <p><b>Changements du goût</b></p> <p>(Généralement légers)</p> <p><b>Signes à surveiller :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le goût des aliments et boissons peut vous sembler différent.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangez des aliments faciles à mâcher, comme des œufs brouillés, des pâtes, des soupes, et des légumes cuits.</li> <li>• Goûtez les aliments à différentes températures, car cela peut modifier le goût.</li> <li>• Essayez différentes formes de nourriture, comme des aliments frais, congelés ou en boîte.</li> <li>• Faites des essais avec des plats non épicés, épicés et assaisonnés.</li> </ul>   | <p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p> |

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

**D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.**

**Si vous éprouvez l'un des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :**

- Enflure des mains, chevilles, pieds ou autres parties du corps
- Prise de poids qui est inhabituelle pour vous
- Douleur dans le bas du dos
- Changements quand vous urinez, par exemple, moins d'urine que d'habitude
- Spasmes musculaires et crampes, ou démangeaisons qui ne disparaissent pas
- Pouls irrégulier, douleur à la poitrine
- Confusion
- Difficulté à respirer au repos, respiration qui devient plus difficile lorsque vous êtes allongé ou que vous respirez rapidement
- Toux, présence de sang dans la toux, difficulté à respirer, souffle court, ou respiration sifflante qui n'étaient pas présents auparavant.
- Fièvre (température orale de 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU 38 °C (ou 100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure)
- Hématomes inhabituels, saignement des gencives ou du nez
- Selles de couleur noire, ou sang dans les selles, urine de couleur rouge ou rose

### Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : \_\_\_\_\_

Pendant la journée, je dois joindre : \_\_\_\_\_

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés  
: \_\_\_\_\_

**Autres remarques :**

---



---



---



---



---



---



---



---

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

---

---

---

## May 2021 New info sheet

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*