

## Fiche d'information sur les médicaments

# flutamide

 (FLU-ta-mide)

*Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.*

**Autre nom(s):** Euflex®

**Présentation:** comprimé

## Pourquoi devez-vous prendre ce médicament?

- Pour le traitement du cancer de la prostate en association avec un autre médicament qui réduit le production de testostérone

## Avant son administration

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement des problèmes du foie ou de la coeur (y compris la fréquence cardiaque irrégulière), le diabète, la perte osseuse ou ostéoporose, ou si vous avez des allergies.
- Ce médicament contient une petite quantité de lactose. Si vous ne pouvez pas tolérer du lactose, parlez à votre médecin ou pharmacien.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque élevé d'apparition d'autres formes de cancer (généralement quelques années plus tard) ou de caillots sanguins. Certains médicaments administrés contre le cancer peuvent accroître ces risques, surtout s'ils sont administrés pendant une période prolongée. Vous devriez discuter avec votre médecin de vos préoccupations à propos de ce médicament.

## Grossesse et allaitement

- Flutamide ne doit pas utiliser par les femmes
- En laboratoire, ce médicament peut avoir des effets néfastes sur les embryons ou les rejetons d'animaux qui y ont été exposés
- Cette mesure ne s'applique peut-être pas directement dans votre cas, mais s'il y a DES RISQUES que votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément pendant la prise de ce médicament.** Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** (recommandation générale) après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
  
- Effets sur la fertilité: Probable

## Comment ce médicament est-il administré?

- Prenez exactement tel que prescrit par votre médecin.
- Avalez en entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Prenez la dose environ à la même heure à chaque jour
- Si vous oubliez une dose, sautez cette dose et prenez la dose suivante tel que prévu. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.
- Ce médicament est habituellement pris trois fois par jour (toutes les 8 heures) par voie orale
- La consommation d'alcool avec flutamide peut entraîner une rougeur excessive du visage. Évitez l'alcool, si cela vous dérange.

## Pendant la prise de ce médicament

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, ce qui peut en réduire l'efficacité ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre médecin et pharmacien connaissent tous les médicaments que vous prenez (vendus avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou avant de cesser de le faire, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Sécurité et conservation

- Conservez ce médicament à la température ambiante, dans son emballage original, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

## Effets secondaires et que faire

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires, et d'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous présentez des effets secondaires inhabituels ou qui vous incommode, parlez-en à votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants</b>	
<p><b>Diarrhée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut survenir quelques jours à quelques semaines après la dose administrée ou après le début du traitement.</li> <li>• Boire beaucoup de liquides clairs. Éviter les aliments chauds, piquants et frits, les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine et le jus d'orange et de prunes.</li> <li>• Adopter une alimentation faible en fibres (bananes, riz blanc, compote de</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>

<p>pommes, rôties faites de pain blanc).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendre des médicaments contre la diarrhée si votre médecin vous en donne.</li> <li>• Voir aussi le dépliant sur la diarrhée.*</li> </ul>	
<p><b>Augmentation de la transpiration et sensations de chaleur (bouffées de chaleur)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Évitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine (le thé, le café, le cola), le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur.</li> <li>• Faites de l'exercice régulièrement, tenez au frais, habillez-vous avec des vêtements légers, buvez beaucoup d'eau. Peut s'améliorer avec le temps.</li> </ul> <p><b>Autres symptômes de faibles taux de testostérone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impuissance</li> <li>• Enflure ou douleurs aux seins</li> <li>• Baisse de libido</li> <li>• Infections urinaires</li> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière si cela vous dérange.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b>Nausées et vomissements</b> (généralement légers)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent survenir quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et évitez les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer.</li> <li>• Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte.</li> <li>• Prenez des antinauséux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter.</li> <li>• Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre médecin.</li> <li>• Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.*</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<b>Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères</b>	
<p><b>Éruptions cutanées sévères</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une éruption cutanée sévère peut se produire sur le corps/ membres des cloques ou desquamation de la peau, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence.</li> </ul>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Anomalies des épreuves du foie faites en laboratoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre médecin contrôlera périodiquement ces examens. Si votre peau ou vos yeux présentent une coloration jaunâtre ou si la couleur de votre urine devient foncée, communiquez avec votre médecin.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b>Blocage d'une artère</b> (vaisseau sanguine) dans le cœur, le cerveau, la poitrine, l'abdomen ou les membres. Le blocage peut entraîner un <b>accident vasculaire cérébral</b> (perte soudaine de la vue, de la parole ou de l'usage des membres) ou une <b>crise cardiaque</b> (douleurs dans la poitrine, essoufflement) ou des douleurs dans la poitrine, l'abdomen ou les membres</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Syndrome comme le lupus</b> (maladie auto-immune avec éruption cutanée, enflure des articulations et des problèmes rénaux)</p>	<p>Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)</p>

<b>Problèmes cardiaques</b> (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure des jambes/chevilles/ventre, essoufflement)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<b>Dégradation rapide des globules rouges</b> (jaunissement de la peau ou des yeux et (ou) urine rouge/brune)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<b>Douleur aux os; Perte osseuse</b>	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<b>Problèmes pulmonaires</b> (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<b>Un caillot sanguin</b> (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*