

Fiche d'information sur les médicaments

fulvestrant (ful-ves-trant)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Faslodex^{MD}

Présentation: Liquide transparent ou jaune dans des seringues préremplies pour l'injection

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement d'un certain type de cancer du sein sensible aux hormones.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, en particulier :

- Des troubles du saignement; ou si vous suivez un traitement à base d'anticoagulants (tels que la warfarine),
- Une perte osseuse (affinement des os) ou des fractures (ou si des membres de votre famille présentent ou ont présenté ces symptômes),
- Des troubles hépatiques,
- Des allergies.

N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021

Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- La façon dont ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce médicament pourrait influencer sur votre fertilité (capacité à concevoir un enfant), si cela s'applique à vous.
- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** simultanément pendant au moins **2 ans** (recommandation générale) après votre dernière dose. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement.
- Ce médicament peut être nocif pour le fœtus. Parlez à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est généralement administré par injection intramusculaire dans la fesse. Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître votre calendrier de traitement.
- Assurez-vous de prendre rendez-vous avec votre médecin pour l'injection de suivi. Parlez à votre équipe de soins de santé pour vérifier quoi apporter à votre prochaine visite (médicaments ou fournitures).
- Si vous avez raté votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou d'autres produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments ou des produits de santé naturels. Les interactions pourraient faire échouer le traitement et causer des effets secondaires graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021

- Informez votre équipe de soins si vous prenez :
 - Des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, ou toute autre drogue, de la marijuana par exemple (à titre médical ou récréatif),
 - Des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter de prendre un de ces traitements.
- Ne prenez aucun autre médicament contenant des œstrogènes (y compris des compléments à base d'herbes) pendant votre traitement au fulvestrant : en effet, cela pourrait limiter l'efficacité de votre traitement.

À FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- PARLEZ à votre équipe de soins de santé de votre risque de développer de l'ostéoporose à la suite de ce traitement.

À NE PAS FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en parler à votre équipe de soins de santé auparavant. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- NE CONDUISEZ PAS, n'utilisez pas de machine et n'effectuez aucune tâche qui exige que vous soyez alerte si vous vous sentez fatigué.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament dans son emballage d'origine au réfrigérateur. Ne le congelez pas. Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- Ne jetez pas les médicaments non utilisés à votre domicile. Ramenez-les à la pharmacie pour qu'ils soient éliminés de manière sécuritaire.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du fulvestrant. Ils sont présentés du plus courant au moins courant. Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres qui ne sont pas indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez tout effet secondaire lorsque vous prenez du fulvestrant.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) conformément à la prescription. Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche), qui peut aider. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la douleur pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>Troubles hépatiques</p> <p>(Potentiellement graves)</p> <p>Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre fonction hépatique à l'aide d'une analyse sanguine. Les changements hépatiques ne causent généralement aucun symptôme.</p>	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

mars 2021

Page 4 of 9

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans de rares cas, vous pouvez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Ces signes peuvent être graves. <p>Que faire?</p> <p>En cas de symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence.</p>	
<p>Réactions au point d'injection</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez voir apparaître des rougeurs, des bleus ou des enflures ou ressentir des démangeaisons au point d'injection sur votre peau. • Ces réactions sont généralement bénignes et disparaissent en l'espace d'un à trois jours. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous devrez peut-être appliquer des compresses chaudes ou froides/glacées si vous constatez des rougeurs peu intenses ou un léger inconfort. Cela dépend du médicament qui a provoqué la réaction. • Parlez à votre équipe de soins de santé pour savoir quel traitement est adapté à votre cas. • Certaines réactions peuvent être graves et accompagnées de douleurs et d'une faiblesse dans les jambes. Cela reste rare. Si c'est le cas, vous devez obtenir immédiatement des soins d'urgence. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela vous dérange.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) presque tous les jours. • Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage, ou la garde des enfants et des animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a demandé de boire plus ou moins). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>Nausée et vomissements</p> <p>(Symptômes généralement légers)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pouvez également ressentir des étourdissements. • Vous pourriez avoir la nausée dans les heures ou les jours suivant votre traitement. 	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures, ou bien si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Pour éviter la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter. • Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. <p>En cas de nausées ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments antinauséux (au besoin) conformément à la prescription. • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la nausée et les vomissements pour de plus amples renseignements. • Parlez à votre équipe de soins de santé si : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La nausée persiste au-delà de 48 heures, ◦ Les vomissements sont intenses ou persistent au-delà de 24 heures. 	

Vous pourriez avoir un taux d'œstrogènes bas ou présenter certains des symptômes suivants :

- Des bouffées de chaleur, une sensation de chaleur,
- Sécheresse vaginale (potentiellement accompagnée de pertes blanches ou de saignements),
- Pertes de mémoire,
- Sautes d'humeur, dépression.

Parlez-en à votre équipe de soins de santé en cas si vous avez des questions.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous constatez N'IMPORTE LEQUEL des symptômes suivants, vous devez en parler à votre fournisseur de soins de cancérologie ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Douleur, gonflement ou durcissement d'une veine de votre bras ou jambe,
- Apparition soudaine d'une toux, respiration difficile, douleur à la poitrine ou toux sanglante,
- Difficulté soudaine à voir, à parler ou à bouger les bras et les jambes,
- Éruption cutanée importante, gonflement du visage, des lèvres ou de la langue, sensation de serrement dans la gorge ou la poitrine,
- Selles de couleur noire, ou sang dans les selles, urine de couleur rouge ou rose, saignement des gencives, saignement de nez inhabituel ou important, apparition d'ecchymoses supérieure à la normale,
- Fragilisation des os (douleur osseuse importante) ou incapacité à bouger.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021

March 2021 Updated/Revised info sheet

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.