

glofitamab

Prononciation: glo-Fl-ta-mab

Autre nom(s): Columvi^{MD}

Présentation: solution incolore, mélangée dans de plus gros sacs de liquides pour perfusion

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

Glofitamab est utilisé pour traiter certains types de cancers du sang appelés lymphomes (comme le lymphome à cellules B et le lymphome folliculaire).

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- des problèmes rénaux, hépatiques ou cardiaques,
- des problèmes en lien avec votre système nerveux (cerveau ou nerfs),
- une infection active, ou
- des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est injecté par voie intraveineuse (dans une veine).
- Vous pourriez être admis à l'hôpital lors de vos premiers traitements afin que votre équipe de soins de santé puisse surveiller la façon dont votre corps réagit.
- On vous donnera un autre médicament, appelé l'obinutuzumab, 7 jours avant le début du traitement par glofitamab. Votre équipe de soins de santé vous donnera d'autres médicaments (appelés prémédicaments) avant vos traitements. Ces médicaments aideront à prévenir les réactions allergiques et les effets secondaires.
- Votre injection de glofitamab vous sera administrée selon un calendrier d'augmentation graduelle pour les 3 premières doses. Cela signifie que vos doses seront petites pour commencer, puis qu'elles augmenteront avec le temps afin que votre équipe de soins de santé puisse s'assurer que vous n'avez pas de mauvaise réaction au médicament. Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître le calendrier de votre traitement.
- Le glofitamab peut être administré sur une plus longue période (par exemple, sur 4 heures) pour les 3 premières doses. Si vous ne présentez aucune mauvaise réaction lors de ces perfusions, le médicament pourra être administré sur une plus courte période pour les doses suivantes.
- Si vous avez manqué votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

Vous aurez un test sanguin avant chaque dose du traitement visant à garantir qu'il vous est sécuritaire d'obtenir le traitement.

Autres médicaments qui pourraient être administrés avec ce traitement

Prévention des réactions allergiques

Avant l'administration de votre premier traitement, des médicaments vous seront prescrits pour prévenir toute réaction allergique ainsi que tout effet secondaire.

- Il existe différents types de médicaments pour empêcher les réactions allergiques. Ils sont appelés :
 - ◊ antihistaminiques (comme la diphenhydramine ou Benadryl^{MD})
 - ◊ analgésiques/antipyrétiques (comme l'acétaminophène ou Tylenol^{MD})
 - ◊ corticostéroïdes (comme la dexaméthasone)

Prévention des infections par des bactéries

Avant l'administration de votre traitement, des médicaments pourraient être prescrits pour prévenir toute infection.

- Ils sont appelés les antibiotiques (comme le triméthoprim-sulfaméthoxazole).

Prévention des infections, comme le zona

Avant l'administration de votre traitement, des médicaments pourraient être prescrits pour prévenir toute infection par le virus du zona.

- Ils sont appelés les antiviraux (comme l'acyclovir ou le valacyclovir).

Prévention du syndrome de lyse tumorale (SLT)

Le SLT peut survenir lorsqu'un grand nombre de cellules cancéreuses meurent rapidement et que votre corps ne peut pas les éliminer assez rapidement. Le SLT peut vous rendre très malade. Demandez à votre équipe de soins de santé si vous êtes à risque pour le SLT.

Si vous êtes à risque pour le SLT, des médicaments pourraient vous être prescrits avant votre traitement au glofitamab pour aider à le prévenir.

- Ces médicaments sont appelés hypo-uricémiants (comme l'allopurinol), ou autres.

Prévention des poussées d'hépatite B

Si vous avez déjà été infecté par l'hépatite B, il y a un risque que ce traitement puisse provoquer une poussée (réapparition). Informez votre équipe de soins de santé si vous avez eu une hépatite B. Il se peut que vous deviez prendre des médicaments pour prévenir une poussée d'hépatite B.

Autres renseignements importants à connaître sur ce traitement

Le glofitamab fait travailler plus fort votre système immunitaire. C'est votre système immunitaire qui se bat contre les infections et votre cancer.

Lorsqu'il travaille plus fort, cela peut également endommager les cellules saines. Cela peut entraîner des effets secondaires qui sont différents de ceux d'autres traitements contre le cancer, comme la chimiothérapie.

Le **syndrome de libération de cytokine (SLC)** peut se produire lorsque votre système immunitaire répond agressivement au glofitamab. Le SLC survient habituellement pendant le calendrier d'augmentation graduelle et lors de la prise de votre première dose complète. Les symptômes peuvent être légers, mais aussi devenir rapidement graves et mortels.

Le SLC peut être traité. Il est important de le dépister tôt afin que le traitement ait les meilleures chances de bien fonctionner. Parlez-en à votre équipe de soins de santé **dès maintenant** si vous avez l'un des signes du SLC suivants :

- Fièvre de plus de 38 °C
- Difficulté à respirer
- Battements de cœur rapides ou irréguliers
- Symptômes s'apparentant à la grippe (comme des frissons, des douleurs musculaires et de la fatigue)
- Nausées, vomissements ou diarrhée graves

Le **syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices (ICANS)** est un effet secondaire du glofitamab qui affecte votre système nerveux (cerveau et nerfs). Il peut survenir de lui-même ou avec un SLC. L'ICANS peut débuter pendant le traitement et jusqu'à une semaine après celui-ci, ou encore se développer quelques jours après le SLC.

L'ICANS peut être soigné; il est très important de le prendre en charge aussitôt que possible. Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès maintenant si vous avez l'un des signes de l'ICANS suivants :

- Maux de tête nouveaux ou pires que la normale
- Somnolence ou faiblesse
- Tremblements ou secousses
- Changement de l'écriture
- Difficulté à parler ou à avaler
- Convulsions

Vous recevrez une **carte de portefeuille** qui contient des informations et des instructions pour les autres fournisseurs de soins de santé concernant votre traitement et les effets secondaires possibles. **Montrez cette carte à tous les fournisseurs de soins de santé**, en particulier si vous devez vous rendre à la salle d'urgence.

À FAIRE pendant le traitement

- ✓ **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- ✓ **PENSEZ À DEMANDER** à quelqu'un de vous conduire à l'hôpital puis de vous ramener chez vous les jours de traitement. Vous pourriez ressentir une somnolence ou des étourdissements après votre traitement.
- ✓ **INFORMEZ** votre équipe de soins de santé si vous présentez ou avez eu des signes d'infection grave. Cela comprend le virus du zona, les infections par l'hépatite B, les infections de longue durée (chroniques) ou une infection qui réapparaît sans cesse (récurrentes).

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- × **NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS** d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent accroître les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- × **NE COMMENCEZ PAS** de thérapies complémentaires ou parallèles, comme l'acupuncture ou des médicaments homéopathiques sans en parler à votre équipe de soins.
- × **NE PRENEZ PAS** d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre ou des produits naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- × **NE CONDUISEZ PAS, N'UTILISEZ PAS** de machines et **N'EFFECTUEZ AUCUNE** tâche qui nécessite d'être attentif et vigilant si vous sentez somnolent ou étourdi.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

- Oui, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer des effets secondaires graves.
 - Informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :
 - des médicaments avec ordonnance et en vente libre
 - des produits de santé naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.
 - Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter la prise de l'un de ces produits.
- Si vous prenez un anticoagulant (comme la warfarine), votre équipe de soins de santé pourrait avoir besoin d'examen sanguins supplémentaires et peut modifier votre dose.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - ◊ La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - ◊ Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - ◊ 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps
- OU
- ◊ 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous. **L'acétaminophène (Tylenol^{MD})** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé par rapport aux sujets suivants :

- Comment ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle
- Comment ce traitement pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez simultanément utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** pendant au moins **2 mois** après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaitez pas pendant ce traitement et pendant au moins **2 mois** après votre dernière dose.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du glofitamab. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez du glofitamab.

Certains effets secondaires peuvent devenir graves ou mettre la vie en danger très rapidement. Vous devez en parler à votre équipe de soins de santé **immédiatement** si :

- Vous remarquez **tout nouvel effet secondaire**, surtout s'il est grave.
- Vous remarquez que vos effets secondaires s'aggravent.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Syndrome de libération de cytokine</p> <p>Le syndrome de libération de cytokine (SLC) peut se produire lorsque votre système immunitaire répond agressivement au glofitamab. Cela peut provoquer la libération d'une grande quantité de protéines appelées cytokines.</p> <p>Le SLC survient habituellement au début du traitement, lorsque votre système immunitaire commence à travailler plus fort (dans les quelques heures et jusqu'à quelques jours après avoir reçu vos 3 premières doses).</p> <p>Les symptômes du SLC peuvent être légers, mais aussi devenir rapidement graves et mortels. Votre équipe de soins de santé vous surveillera de plus près lors de la prise de vos 3 premières doses et pendant quelques jours après et fera des tests sanguins au besoin.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès maintenant si vous présentez l'un de ces symptômes. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe de soins pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fièvre. La fièvre peut parfois être élevée (plus de 40 °C). • Vous pourriez également ressentir les symptômes suivant : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Difficulté à respirer ◦ Battements de cœur rapides ou irréguliers ◦ Symptômes s'apparentant à la grippe (comme des frissons, des douleurs musculaires et de la fatigue) ◦ Nausées, vomissements ou diarrhée graves ◦ Signes d'une tension artérielle basse, comme des étourdissements <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informez immédiatement votre infirmière si vous ressentez des signes du SLC pendant ou juste après votre traitement. Les symptômes peuvent s'aggraver rapidement. <p>Si vous avez quitté l'hôpital :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez votre température pour savoir si vous faites de la fièvre. Si vous faites de la fièvre ou si vous avez des signes du SLC, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence. 	

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Faible nombre de neutrophiles (globules blancs) dans le sang (neutropénie)</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Lorsque votre nombre de neutrophiles est faible, vous courez un risque d'infection accru. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la neutropénie (faible taux de globules blancs) pour de plus amples renseignements.</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de sensation de chaleur ou de malaise (par exemple, si vous avez des frissons ou que vous commencez à tousser), vous devez vérifier votre température pour déterminer si vous faites de la fièvre. • Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD} [acétaminophène] ou Advil^{MD} [ibuprofène]). • Ne mangez pas et ne buvez rien de chaud ou froid juste avant de prendre votre température. <p>Vous faites de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU • 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. <p>Que faire?</p> <p>Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez un faible taux de neutrophiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavez-vous les mains souvent pour prévenir les infections. • Consultez votre équipe de soins de santé avant toute vaccination, opération, intervention médicale ou visite chez le dentiste. 	<p>Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre numérique à la maison pour pouvoir vérifier facilement si vous faites de la fièvre. <p>Si vous faites de la fièvre :</p> <p>Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>	
<p>Faible numération plaquettaire</p> <p>(Peut être grave)</p> <p>Lorsque votre numération plaquettaire est faible, vous courez un risque de saignements et d'hématomes. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la faible numération plaquettaire pour de plus amples renseignements.</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restez à l'affût de signes de saignements : <ul style="list-style-type: none"> ◊ saignements des gencives ◊ saignements du nez inhabituels ou abondants ◊ apparition d'hématomes supérieure à la normale ◊ selles de couleur noire, ou sang dans les selles ◊ mucus rouge ou brun quand vous toussiez ◊ étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vue ◊ saignements vaginaux abondants <p>Que faire?</p> <p>Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez une faible numération plaquettaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indiquez à votre pharmacien que votre numération plaquettaire peut être faible avant de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous avez des signes de saignement. En cas de saignement grave (très abondant) ou qui ne s'arrête pas, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous rendre chez le dentiste. • Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents souple. • Essayez d'éviter les coupures et hématomes. • Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités conviennent à votre situation. • Une faible numération plaquettaire peut retarder votre traitement. Votre équipe de soins de santé peut recommander une transfusion sanguine. <p>Si vous avez des signes de saignement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous saignez un peu, nettoyez la zone au savon et à l'eau ou à l'aide d'une solution saline de rinçage. Exercez une pression sur la zone de saignement pendant au moins 10 minutes. <p>Si vous avez un saignement grave (très abondant) ou qui ne s'arrête pas, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou de manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) tous les jours ou presque. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage, ou pour s'occuper des enfants et animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a demandé d'en boire plus ou moins). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Trop ou trop peu de sel dans votre corps</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spasmes musculaires, crampes, faiblesse, contractions musculaires, ou convulsions. • Battements de cœur irréguliers, confusion ou changements de tension artérielle. <p>Que faire?</p> <p>En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	<p>En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>
<p>Éruptions cutanées, peau sèche et démangeaisons</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certaines zones de votre peau pourraient être rugueuses, craquelées ou desquamées. • Vous pourriez voir apparaître des rougeurs et avoir une sensation de chaleur, comme après un coup de soleil. • Vous pourriez avoir des sensations de démangeaisons, de brûlures, de piqûres ou de sensibilité extrême au toucher de la peau. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Prévention et traitement de la peau sèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un soin hydratant sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez une protection solaire contre les rayons UVA et UVB avec un indice de facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez chaque jour 6 à 8 tasses de liquides sans alcool et sans caféine, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. <p>Dans de rares cas, l'éruption cutanée peut être grave et peut faire cloquer ou peler votre peau. Si c'est le cas, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>	
<p>Constipation</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Défécation moins fréquente qu'à l'accoutumée. • Selles dures et petites comme des boulettes. • Nécessité de pousser fort et de faire un effort pour expulser des selles. • Maux ou crampes d'estomac. • Ventre ballonné, sensation de trop-plein ou inconfort. • Fuites de selles liquides. • Éructations et flatulences importantes. • Nausées ou vomissements. <p>Que faire?</p> <p>Prévention de la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangez plus d'aliments riches en fibres comme les fruits à peau, les légumes-feuilles et les céréales entières. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. • Soyez actif. Une activité physique peut vous aider à aller régulièrement à la selle. • Si vous prenez des médicaments opioïdes contre la douleur, demandez à votre équipe de soins de santé si vous pouvez manger plus de fibres. <p>Traitement de la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis 2 à 3 jours, vous aurez peut-être besoin de prendre un laxatif (un médicament qui vous aidera à aller à la selle). Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous pouvez faire. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la constipation pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Légères enflures</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez constater une légère enflure ou bouffissure au niveau des bras et des jambes. Dans de rares cas, elles peuvent être graves. <p>Que faire?</p> <p>Prévention des enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangez des aliments peu salés. <p>En cas d'enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portez des vêtements amples. • Pour les jambes et pieds enflés, élevez vos pieds quand vous êtes assis. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Réaction de flambée tumorale (flambée de vos symptômes du cancer)</p> <p>La flambée tumorale est une aggravation temporaire des symptômes liés à la tumeur après le début du traitement. Elle se produit habituellement dans les premières semaines du début du traitement et s'atténue lorsque votre médicament commence à faire effet. La flambée n'est pas synonyme d'aggravation de votre cancer.</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ganglions lymphatiques sensibles ou enflés • douleur dans la zone où se trouve votre tumeur • douleur thoracique (à la poitrine) • toux • difficulté à respirer <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultez votre équipe de soins de santé si vous observez des symptômes de flambée tumorale. Ils pourraient avoir besoin de faire des tests pour exclure d'autres causes et commencer à vous traiter. <p>En cas de symptômes graves, comme une douleur grave ou de la difficulté à respirer, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- essoufflement, douleurs thoraciques ou évanouissements
- vomissements contenant du sang ou ce qui ressemble à du marc de café
- douleurs abdominales du côté droit ou dans le bas du dos
- faiblesse, contractions musculaires, crampes ou démangeaisons qui ne disparaissent pas
- Changements dans les mictions (action d'uriner), par exemple, urine moins abondante qu'à l'accoutumée ou urine inhabituellement sombre
- jaunissement de la peau ou des yeux
- maux de tête nouveaux ou pires que la normale
- tremblements, difficulté à marcher, à parler ou à avaler
- changement de l'écriture
- convulsions
- confusion

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

November 2024 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.