Fiche d'information sur les médicaments

hydroxyurée (hy-dro-xy-u-rée)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Marques génériques disponibles, Hydrea[MD]

Présentation: capsule

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement du cancer de la tête et du cou, les cancers du sang (leucémies) et le cancer de la peau (mélanome).

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez le VIH ou le sida, des troubles du foie ou des reins, une faible numération de globules rouges (anémie), ou si vous avez des allergies.
- Ce médicament contient une petite quantité de lactose. Si vous ne pouvez pas tolérer du lactose, parlez à votre docteur.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocif pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de hydroxyurea. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **12 mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.

- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, disez-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant la prise de ce médicament.
- Effets sur la fertilité: Probable

Comment ce médicament est-il donné?

- Prenez exactement tel que prescrit par votre docteur. Assurez-vous que vous comprenez les instructions.
- Avalez en entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Il est recommandé de se laver les mains après avoir manipulé ce médicament.
- Prenez la dose environ à la même heure à chaque jour
- Pendant la prise de ce médicament, vous devriez boire une quantité supplémentaire de liquide pour uriner davantage et prévenir les troubles du rein, plus particulièrement quand vous commencez à prendre ce médicament.
- Si vous avez de la difficulté à avaler les capsules, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Si vous oubliez une dose, communiquez avec votre médecin.

Qu’est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Pour les douleurs légères :
    - Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
    - Avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), parlez-en à votre équipe de soins de santé étant donné que ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.
    - Si vous prenez régulièrement de l'aspirine, par exemple en raison d'un trouble cardiaque, vous ne devez pas cesser de le faire sans en parler tout d'abord à votre équipe de soins de santé.
    - Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre. **Téléphonez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche Fièvre pour en savoir davantage.

- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison aucun médicament non utilisé. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires courants surviennent généralement chez plus d'un patient sur dix. D'autres effets secondaires sont moins courants mais ils peuvent être graves. Vous pourrez ne pas présenter tous les effets secondaires indiqués ci-après.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
Saignements ou bleus inhabituels Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas. ***Fièvre, frissons, infection*** Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est : • **38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU** • **38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure** Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie : • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre.	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
• Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez–vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie ou avant d'aller chez le dentiste. **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre.** Pour plus d'informations, consultez la fiche «Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) ».	
Nausées et vomissements (généralement legers) • Peuvent survenir quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement. • Buvez des liquides clairs et éviter les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Prenez des antinauséeux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre médecin. • Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.*	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
Problèmes de foie (sensibilité du côté droit de l'abdomen, jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée, peuvent être sévères)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Étourdissements, vertiges, maux de tête • Ne conduisez pas de véhicule motorisé et n'opérez pas de machinerie lourde si vous êtes étourdi. • Tentez de vous lever et de bouger lentement.	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
Le fait de tuer des cellules cancéreuses rapidement au commencement du traitement peut mener à une accumulation de déchets cellulaires • Si elle est légère, elle peut causer la goutte, avec des douleurs articulaires, mais si elle est marquée, elle peut causer de la fièvre, une insuffisance rénale et de la confusion, et être potentiellement mortelle. • Vous DEVEZ prendre les médicaments prescrits à titre préventif par votre médecin ET • Boire beaucoup de liquides (6 à 8 verres par jour) et uriner fréquemment.	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Problèmes du pancréas (douleur accrue au centre du ventre qui peut irradier au dos, perte d'appétit ou de poids)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Problèmes pulmonaires (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Rougeurs ou éruptions cutanées à l'endroit où vous avez déjà reçu une radiation (ne peut pas être severe)	Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)
Maux de tête graves, pertes de conscience, épilepsie, confusion et hallucinations	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Inflammation des vaisseaux sanguins dans la peau (présence de plaques rouges ou mauves sur la peau, éruptions cutanées, plaques qui ne pâlissent pas après une pression)	Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.