

Fiche d'information sur les médicaments

IDArubicine (i-da-RU-bi-cine)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Marques génériques disponibles, Idamycin^{MD}

Présentation: Solution colorée rouge orange mélangée dans de plus grands sacs de liquide

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement des cancers du sang comme la leucémie lymphocytaire aiguë.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé important, plus particulièrement des troubles cardiaques, si vous prenez ou avez pris des médicaments qui agissent sur le cœur ou si vous avez des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

N'oubliez pas de:

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants:

- Comment ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Les symptômes de ménopause comme les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale ou les changements d'humeur, le cas échéant.
- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre fertilité (capacité à concevoir un enfant).

Ce médicament peut être néfaste pour le fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, si vous tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque que vous pourriez devenir enceinte, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et pendant au moins **6.5 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- Si vous êtes un patient qui peut mettre une personne enceinte, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et pendant au moins **3.5 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement et pendant les **14 jours** après votre dernière dose de ce médicament.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023 Page 2 of 8

- **Pour les douleurs légères ou la fièvre:**

- Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre des médicaments pour les douleurs ou la fièvre. Ils peuvent masquer la fièvre.
 - Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
 - **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires courants surviennent généralement chez plus d'un patient sur dix. D'autres effets secondaires sont moins courants mais ils peuvent être graves. Vous pourrez ne pas présenter tous les effets secondaires indiqués ci-après.

Effets secondaires les plus courants	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><i>Amincissement ou perte des cheveux</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une brosse souple et douce; éviter les fixatifs, les décolorants, les teintures et les permanentes. • Vos cheveux repousseront habituellement après la fin du traitement, mais la texture ou la couleur pourrait changer. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela vous perturbe
<p><i>Saignements ou bleus inhabituels</i> (selles noires, crachement de sang, points mauves ou rouges sur la peau, saignements qui ne cessent pas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peuvent survenir des jours à des semaines après votre dose ou le début de votre traitement 	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires les plus courants	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une brosse à dents à soies douces. Pendant le brossage, faites attention aux coupures ou aux lésions. • Consultez votre médecin avant toute opération ou toute visite chez le médecin. • Utilisez de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) pour réduire la fièvre, les maux de tête légers et la douleur. • Parlez à votre médecin d'abord avant de commencer à utiliser d'autres médicaments comme l'ibuprofène (Advil^{MD}) ou le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine, puisqu'ils peuvent augmenter le risque de saignement. Si vous prenez de l'aspirine régulièrement, parlez à votre médecin avant de cesser de la prendre. • Voyez aussi le dépliant sur la faible numération plaquettaire.* 	
<p>Fièvre, frissons, infection</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: TylenolTM, acétaminophène, AdvilTM ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie ou avant d'aller chez le dentiste. <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la fiche «Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) ».</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires les plus courants	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><i>Ulcères buccaux</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les dents régulièrement avec une brosse à soies souples ou une Toothette^{MD} • Utilisez un rince-bouche sans alcool régulièrement, surtout après les repas et au coucher. • Essayez de se rincer la bouche avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude : une demie cuillerée à thé dans une tasse (250 mL) d'eau • Évitez les aliments chauds, épicés, acidulés, durs ou croquants. • Consultez votre médecin ou votre infirmière dès que vous remarquez des ulcères dans la bouche ou sur les lèvres, ou si vous avez du mal à avaler. Votre médecin pourrait prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcères buccaux et prévenir l'infection. • Voyez également le dépliant sur les Soins buccaux.* 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible (heures de bureau)</p>
<p><i>Nausées et vomissements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peuvent survenir quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement. • Buvez des liquides clairs et éviter les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Prenez des antinauséux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Communiquez avec votre médecin si les nausées durent plus d'une journée ou s'il y a des vomissements. • Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.* 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p><i>Changement de couleur de l'urine</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloration rouge orange de l'urine pendant un ou deux jours après l'administration du médicament. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires moins courants, mais peuvent être Sévères	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Problèmes de foie (jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée)</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Réaction allergique (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament. 	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Diarrhée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir quelques jours à quelques semaines après la dose administrée ou après le début du traitement. • Boire beaucoup de liquides clairs. Éviter les aliments chauds, piquants et frits, les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine et le jus d'orange et de prunes. • Adopter une alimentation faible en fibres (bananes, riz blanc, compote de pommes, rôties faites de pain blanc). • Prendre des médicaments contre la diarrhée si votre médecin vous en donne. • Voir aussi le dépliant sur la diarrhée.* 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Problèmes cardiaques (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure, essoufflement)</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Le fait de tuer des cellules cancéreuses rapidement au commencement du traitement peut mener à une accumulation de déchets cellulaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si elle est légère, elle peut causer la goutte, avec des douleurs articulaires, mais si elle est marquée, elle peut causer de la fièvre, une insuffisance rénale et de la confusion, et être potentiellement mortelle. • Vous DEVEZ prendre les médicaments prescrits à titre préventif par votre médecin ET • Boire beaucoup de liquides (6 à 8 verres par jour) et uriner fréquemment. 	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants, mais peuvent être Sévères	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Réactions au site d'injection (douleurs, brûlure, rougeur ou gonflement à l'endroit où le médicament a été injecté)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mentionnez ces signes immédiatement à l'équipe soignante dès qu'ils surviennent, puisque le médicament peut endommager ou irriter les tissus s'il s'écoule de la veine pendant l'injection. 	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Rougeurs ou éruptions cutanées à l'endroit où vous avez déjà reçu une radiation</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Éruptions cutanées (peuvent être graves), peau sèche, démangeaisons</p> <ul style="list-style-type: none"> Évitez le soleil; appliquez une crème solaire, portez un chapeau et couvrez la peau exposée. Utilisez un hydratant tous les jours. Si elles sont graves, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Infection des intestins</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Un caillot sanguin (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

