

Fiche d'information sur les médicaments

iMAtinib (i-ma-ti-nib)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Gleevec(MD)

Présentation: comprimé dans plusieurs concentrations, formes et couleurs

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de certains types de cancer du sang (des leucémies), des troubles sanguins, des sarcomes et des tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI).

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Informez votre médecin et votre pharmacien si vous avez ou avez eu des problèmes de santé importants, notamment :
 - ◊ des problèmes cardiaques;
 - ◊ des problèmes hépatiques (y compris l'hépatite);
 - ◊ des problèmes rénaux;
 - ◊ des problèmes de saignement,
 - ◊ une insuffisance thyroïdienne;
 - ◊ si vous prenez des anticoagulants;
 - ◊ ou si vous avez des allergies.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- Si cela s'applique à vous, vous pouvez être conseillé d'avoir un test de grossesse dans une semaine avant le début du traitement.
- S'il y a **un risque** que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

et votre partenaire devez: ► **Utiliser deux méthodes très efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **6 mois** après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.

- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement avec ce médicament.
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

Comment ce médicament est-il donné?

- iMAtinib est généralement à prendre une fois par jour pendant le repas avec un grand verre d'eau pour réduire les risques de maux d'estomac.
- Si vous prenez une dose quotidienne de 800 mg, vous devrez prendre une dose de 400 mg deux fois par jour pour empêcher votre organisme d'absorber une trop grande quantité de fer.
- Prenez votre médicament exactement tel que prescrit par votre équipe de soin de santé. Assurez-vous que vous comprenez les instructions.
- Si vous avez de comprimés de plus d'une force pour obtenir la dose exacte, assurez que vous identifiez les comprimés correctement pour prendre la dose correcte.
- Les comprimés de 400 mg peuvent être coupés en deux, mais vous ne devez pas les écraser ni les mastiquer.
- Si vous ne pouvez pas avaler les comprimés, placez-les dans un verre d'eau ou de jus de pomme (utilisez 200 ml de liquide pour les comprimés de 400 mg, ou 50 ml pour ceux de 100 mg). Agitez avec une cuillère pour dissoudre complètement les comprimés, puis buvez immédiatement tout le verre. Rincez le verre avec de l'eau ou du jus de pomme, puis buvez ce mélange pour finir ce qui reste du médicament dans le verre.
- Si vous oubliez une dose, sautez-la et prenez la suivante à l'heure habituelle.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Vous ne devez manger ou boire de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement pour ne pas accroître les effets secondaires.
- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Pour les douleurs légères ou la fièvre:

- Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre des médicaments pour les douleurs ou la fièvre. Ils peuvent masquer la fièvre.
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous indiquer quel médicament vous conviendrait. Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre de l'acétaminophène (Tylenol®), de l'ibuprofène (Advil®, Motrin®), du naproxène (Aleve®) ou de l'aspirine (acide acétylsalicylique) car ces médicaments peuvent accroître vos risques d'hémorragie ou interagir avec vos autres médicaments.
- Si vous prenez déjà de l'aspirine à faible dose pour traiter une maladie (telle qu'un trouble cardiaque), indiquez-le à votre équipe de soins de santé. Sa prise pourrait être poursuivie sans danger.
- **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison aucun médicament non utilisé. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Comment manipuler les médicaments contre le cancer administrés par voie orale de manière sécuritaire

Si vous êtes un patient:

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.

Si vous êtes un aidant:

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas été en contact avec un médicament contre le cancer administré par voie orale.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.
- Ne touchez pas les médicaments contre le cancer administrés par voie orale si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Que faire en cas de contact du médicament contre le cancer administré par voie orale avec la peau ou avec les yeux

En cas de contact avec la peau:

- Lavez votre peau avec beaucoup de savon et de l'eau.
- Si votre peau devient rouge ou irritée, communiquez avec votre équipe de soins de santé.

En cas de contact avec les yeux:

- Rincez vos yeux avec de l'eau courante sans attendre. Laissez l'eau couler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)	
<p>Gonflement léger dans les bras et les jambes</p> <p>Pour prévenir le gonflement léger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoptez une alimentation à faible teneur en sel. • Évitez les vêtements serrés. <p>Si vous présentez un gonflement dans les jambes, gardez vos pieds élevés quand vous êtes assis.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Douleurs légères dans les articulations, douleurs ou crampes musculaires (peuvent persister pendant plusieurs mois après l'arrêt du traitement)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé sur le médicament qui serait le plus adapté pour soulager vos douleurs articulaires ou musculaires. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)	
<ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers. 	
<p>Nausées et vomissements (généralement légers)</p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement.</p> <p>Si vous avez des nausées ou des vomissements:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool. • Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé. <p>Voir également la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.*</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
<p>Diarrhées</p> <p>Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement.</p> <p>Si vous avez des diarrhées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit. • Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. gomme à mâcher, boissons « diète », café et alcool). • Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas. • Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
<p>appelée réhydratation par voie orale.</p> <p>Voir la fiche Diarrhées pour en savoir davantage.*</p>	
<p>Éruptions cutanées, assèchement de la peau, démangeaisons cutanées</p> <p>Les éruptions cutanées peuvent être graves et, dans de rares cas, entraîner la présence de cloques sur la peau ou une desquamation. Si cet effet apparaît, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence.</p> <p>Pour prévenir et traiter l'assèchement de la peau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un produit hydratant pour la peau. • Protégez votre peau contre le soleil et le froid • Appliquez un écran solaire offrant une protection contre les UVA et les UVB et un FPS d'au moins 30. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux. • Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage). • Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué. <p>Voir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.*</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Douleurs ou crampes dans l'abdomen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous souffrez de constipation ou de diarrhées, elles peuvent provoquer des douleurs dans votre abdomen. • Si la douleur est grave et si elle s'accroît ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les autres causes possibles. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Maux de tête</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé sur le médicament qui serait le plus adapté pour soulager vos maux de tête. • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
médecin. • Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers.	
<p>Fièvre, frissons, infection</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Ne prenez pas de médicaments pouvant traiter la fièvre avant d'avoir pris votre température (par exemple, Tylenol®, acétaminophène, Advil®, Motrin® ou ibuprofène). Si vous les prenez avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ces médicaments peuvent faire baisser votre température et vous ne vous apercevrez peut-être donc pas que vous avez une infection. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie, procédure médicale ou avant d'aller chez le dentiste. <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre.</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)	
<p>Déséquilibre en sel</p> <p>Cet effet peut provoquer des contractions musculaires, un état de faiblesse grave, des crampes, des épisodes de confusion et une irrégularité des pulsations cardiaques.</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
<p>Toux, essoufflement</p>	Contactez votre équipe de soins

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)	
Vous pourrez présenter une toux et vous sentir essoufflé sans aucun signe d'infection, par exemple des maux de gorge ou une congestion nasale.	de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Étourdissements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez vous sentir la tête légère. • En cas d'étourdissements, étendez-vous. • Relevez-vous et déplacez-vous lentement quand vous vous sentirez mieux. • Vous ne devez pas conduire un véhicule moteur ni utiliser de la machinerie si vous vous sentez étourdi. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Brûlements ou maux d'estomac</p> <p>Pour aider à prévenir les brûlements ou maux d'estomac :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les aliments gras ou épicés. • Évitez de vous étendre après avoir mangé. • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Symptômes semblables à une grippe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez avoir de la fièvre, des frissons et des douleurs musculaires sans aucun signe d'infection comme des maux de gorge, une toux ou des éruptions cutanées. • Ces effets secondaires peuvent apparaître en tout temps après l'administration de votre traitement, et ils disparaissent généralement quand votre organisme est habitué au médicament. • Si ces effets secondaires vous incommode, parlez-en à votre équipe de soins de santé. Prenez votre température pour vous assurer que vous ne faites pas de fièvre. Si vous n'avez pas de fièvre, vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (TylenoLMD) pour vous sentir mieux. • Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous. Si vous faites de la fièvre, communiquez avec votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Dépression</p> <p>Nous nous sentons tous tristes parfois, et le fait d'avoir un cancer peut vous porter au découragement. Une dépression apparaît quand ces sentiments persistent pendant des semaines ou des mois.</p> <p>Pour prévenir la dépression :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintenez une bonne alimentation, et faites des exercices pour avoir plus 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)	
<p>d'énergie et vous sentir mieux. Avant de commencer un nouveau programme d'exercices, consultez toujours votre équipe de soins de santé pour vous assurer qu'il n'y a aucun danger pour vous.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demandez l'aide de votre famille, de vos amis, de votre entourage et de votre équipe de soins de santé. <p>Si vous avez des pensées suicidaires ou si vous pensez à vous faire du mal, communiquez avec votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche. Voir la fiche Dépression pour en savoir davantage.*</p>	
<p>Difficulté à dormir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cet effet secondaire peut être provoqué par l'un de vos médicaments et il peut s'amenuiser quand votre organisme sera habitué au médicament ou à la fin de votre traitement. • Si cet effet vous incommode, parlez-en à votre médecin. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Anomalie des épreuves du foie faites en laboratoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Parlez-en alors à votre équipe de soins de santé. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
<p>Constipation</p> <p>Pour prévenir la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez beaucoup de liquides et maintenez une bonne alimentation. Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour, sauf indication contraire. • Soyez actif. Des exercices périodiques peuvent vous garder en forme. • Essayez de consommer davantage de fibres (p. ex. fruits avec pelure, légumes verts et céréales entières). Si vous prenez des médicaments opiacés, demandez à votre équipe de soin de santé si vous devez consommer davantage de fibres. <p>Pour traiter la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous n'avez pas eu de selles depuis deux ou trois jours, vous devrez peut-être prendre un laxatif. Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous pouvez faire. <p>Voir la fiche Constipation pour en savoir davantage.*</p>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)	
<p>Saignements ou bleus inhabituels</p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche « Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) »</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>

D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:

- douleurs thoraciques, essoufflement, toux avec sang, douleurs à l'abdomen ou dans le bras;
- sentiment de confusion, soudaine perte de la vue, troubles de la parole ou difficultés à bouger les bras ou les jambes;
- douleurs veineuses intenses, gonflement ou durcissement de la veine du bras ou de la jambe;
- douleurs osseuses ou articulaires intenses;
- rythme cardiaque irrégulier, évanouissements ou gonflement dans les jambes, les chevilles ou l'abdomen;
- problèmes de vue;
- éruption cutanée grave accompagnée de fièvre, ganglions enflés, jaunissement de la peau ou des yeux, essoufflement ou douleurs thoraciques;
- douleurs abdominales soudaines et intenses (pouvant se propager au dos);
- signes de problèmes thyroïdiens tels que fatigue extrême, dessèchement cutané, ongles et cheveux cassants, intolérance au froid;
- signes de problèmes rénaux tels que douleurs dans le bas du dos, gonflement, quantité d'urine plus faible qu'à l'accoutumée et prise de poids inhabituelle;
- douleurs musculaires intenses, faiblesse et urines foncées.

Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé sur votre risque de développer d'autres cancers après avoir suivi ce traitement.

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.