

ivosidenib

Prononciation: EYE voe SID e nib

Autre nom(s): Tibsovo®

Présentation: comprimé

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

L'ivosidénib est utilisé pour traiter un certain type de cancer du sang, appelé leucémie myéloïde aiguë (LMA), et le cholangiocarcinome.

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Informez votre équipe de soins de santé si vous souffrez ou avez déjà souffert de problèmes de santé importants, notamment :

- des problèmes rénaux ou hépatiques;
- des problèmes cardiaques (y compris un rythme cardiaque irrégulier);
- trop ou trop peu de sel dans votre corps (comme le sodium, le potassium, le calcium ou le magnésium);
- des allergies.

Les comprimés d'ivosidénib contiennent une petite quantité de lactose. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas prendre de lactose.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est habituellement pris par voie orale une fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé la manière et le moment où vous devez prendre votre médicament.
- Avalez l'ivosidénib en entier avec un grand verre d'eau à jeun, au moins une heure avant ou deux heures après un repas.
- Ne mangez pas et ne buvez pas de fruits, de jus ou de produits dérivés des pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement. Cela peut augmenter la quantité de médicament dans votre sang et augmenter les effets secondaires.
- Si vous oubliez de prendre une dose d'ivosidénib :
 - s'il s'est écoulé moins de 12 heures depuis la dose oubliée, prenez la dose comme d'habitude. Prenez la dose suivante au moment prévu.
 - si cela fait plus de 12 heures, ne prenez pas la dose. Prenez la dose suivante au moment prévu. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, ne prenez pas de dose supplémentaire. Prenez la dose suivante au moment prévu.

Avertissement : Si vous prenez trop de ce médicament par accident, ou si vous pensez qu'un enfant ou un animal a pu avaler votre médicament, vous devez appeler immédiatement le Centre antipoison de l'Ontario au : 1-800-268-9017.

À FAIRE pendant le traitement

- ✓ **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- × **NE PRENEZ PAS** d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre (sans ordonnance) ou des substances, ou bien des produits de santé naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- × **NE COMMENCEZ PAS** de traitements complémentaires ou parallèles, comme l'acupuncture ou des médicaments homéopathiques sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- × **N'UTILISEZ PAS** de produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou **NE BUVEZ PAS** d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- × **NE CONDUISEZ PAS, N'UTILISEZ PAS** de machines et **N'EFFECTUEZ AUCUNE** tâche qui nécessite d'être attentif et vigilant si vous vous sentez étourdi.
- × **NE MANGEZ PAS** et **NE BUVEZ PAS** de fruits, de jus ou de produits dérivés des pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement. Cela peut augmenter la quantité de médicament dans votre sang et augmenter les effets secondaires.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Oui, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments, médicaments traditionnels et produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer de graves effets secondaires.

Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :

- médicaments délivrés sur ordonnance et en vente libre (vendus sans ordonnance);
- autres drogues et substances, comme le cannabis/la marijuana (à titre médical ou récréatif);
- produits de santé naturels tels que les vitamines, les tisanes, les médicaments homéopathiques et les autres compléments, ou les médicaments traditionnels.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'usage de l'un de ces produits.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Médicaments traditionnels
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues et substances, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

OU

 - 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous **DEVEZ** immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour un enfant à naître. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et au moins jusqu' à **3 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- Ce traitement peut réduire l'efficacité de la contraception hormonale, comme la pilule contraceptive. Si vous décidez d'utiliser une méthode de contraception hormonale, pensez à utiliser également une méthode de contraception mécanique ou non hormonale (comme les préservatifs). Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement et pendant au moins **1 mois** après votre dernière dose.

Comment dois-je conserver et manipuler les médicaments de ce traitement en toute sécurité?

- Conservez les comprimés d'ivosidénib dans l'emballage d'origine à température ambiante dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Conservez-les hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez aucun comprimé d'ivosidénib inutilisé à la maison. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Comment toucher votre médicament oral contre le cancer en toute sécurité?

Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.
- Avalez chaque comprimé en entier. N'écrasez pas et ne mâchez pas les comprimés.

Si vous êtes un aidant :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas touché le médicament.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.
- Ne touchez pas les médicaments oraux contre le cancer si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

Que faire si le médicament entre en contact avec votre peau ou vos yeux?

En cas de contact avec la peau :

- Lavez votre peau avec beaucoup d'eau et de savon.
- Si votre peau rougit ou devient irritée, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

En cas de contact avec les yeux :

- Rincez immédiatement vos yeux à grande eau. Laissez l'eau s'écouler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez de l'ivosidénib. Ce tableau les énumère des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas recensés.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour connaître les symptômes auxquels vous devez prêter attention et pour connaître le moment de demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez de l'ivosidénib.

Less Common Side Effects (10 to 24 out of 100 people)	
Side effects and what to do	When to contact health care team
Diarrhée Quels signes sont à surveiller? - Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou les semaines suivant votre traitement. Que faire? Si vous avez la diarrhée : - Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé. - Évitez les aliments ou boissons avec édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool jusqu'à ce que la diarrhée cesse. - Mangez plusieurs repas légers au lieu de deux ou trois gros repas. - Buvez au moins six à huit tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. - Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire six à huit tasses de liquides par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, procédé appelé réhydratation par voie orale. - Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de 7 fois par jour).	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de sept fois par jour).

Less Common Side Effects (10 to 24 out of 100 people)	
Side effects and what to do	When to contact health care team
Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Diarrhée.	
Nausées et vomissements (Ces symptômes sont habituellement légers) Quels signes sont à surveiller? • La nausée est la sensation d’avoir envie de vomir. Vous pourriez également vous sentir étourdi. • Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. Que faire? Pour prévenir la nausée : • Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter. • Si on vous a donné des médicaments antinauséeux, prenez-les selon ce qui a été prescrit, même si vous n’avez pas envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas légers. Prenez de l’air frais et reposez-vous. • Ne mangez pas d’aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l’alcool. En cas de nausée ou de vomissements : • Prenez vos médicaments antinauséeux (au besoin) selon ce qui a été prescrit. • Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Nausée et vomissements. • Parlez à votre équipe de soins de santé si : ◦ La nausée persiste au-delà de 48 heures; ◦ les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.	Contactez votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.

Less Common Side Effects (10 to 24 out of 100 people)	
Side effects and what to do	When to contact health care team
Fatigue Quels signes sont à surveiller? - Sensation de fatigue ou de manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. Que faire? - Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) presque tous les jours. - Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. - Prenez votre temps et évitez de vous presser. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. - Demandez à votre famille ou à vos amis de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage ou pour s'occuper des enfants et animaux de compagnie. - Mangez bien et buvez au moins six à huit verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a recommandé d'en boire plus ou moins). - Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué. Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la Fatigue.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Faible nombre de neutrophiles (globules blancs) dans le sang (neutropénie) (Rare chez les patients atteints de cholangiocarcinome) (Ces symptômes peuvent être graves) Lorsque votre nombre de neutrophiles est faible, vous courez un risque d'infection accru. Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure Neutropénie (faible taux de globules blancs).	Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Less Common Side Effects (10 to 24 out of 100 people)	
Side effects and what to do	When to contact health care team
Quels signes sont à surveiller? • En cas de sensation de chaleur ou de malaise (p. ex., si vous avez des frissons ou que vous commencez à tousser), vous devez vérifier votre température pour déterminer si vous faites de la fièvre. • Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD} [acétaminophène] ou Advil^{MD} [ibuprofène]). • Ne mangez pas et ne buvez rien de chaud ou froid juste avant de prendre votre température. Vous faites de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de : • 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU • 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. Que faire? Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez un faible taux de neutrophiles : • Lavez-vous les mains souvent pour prévenir les infections. • Consultez votre équipe de soins de santé avant toute vaccination, opération, intervention médicale ou visite chez le dentiste. • Gardez un thermomètre numérique à la maison pour pouvoir vérifier facilement si vous faites de la fièvre. Si vous faites de la fièvre : Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	

Less Common Side Effects (10 to 24 out of 100 people)	
Side effects and what to do	When to contact health care team
Faible numération plaquettaire (Rare chez les patients atteints de cholangiocarcinome) (Ces symptômes peuvent être graves) Lorsque la numération plaquettaire est faible, vous courez un risque de saignements et d'hématomes. Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Faible numération plaquettaire. Quels signes sont à surveiller? • Restez à l'affût de signes d'hémorragie : ◦ saignements des gencives; ◦ saignements du nez inhabituels ou abondants; ◦ apparition d'hématomes supérieure à la normale; ◦ selles de couleur noire, ou sang dans les selles; ◦ mucus rouge ou brun quand vous toussiez; ◦ étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vue; ◦ saignements vaginaux abondants; ◦ urine de couleur rouge ou rose. Que faire? Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez une faible numération plaquettaire : • Indiquez à votre pharmacien que votre numération plaquettaire peut être faible avant de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous rendre chez le dentiste. • Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents souple. • Essayez d'éviter les coupures et hématomes. • Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités conviennent à votre situation. • Une faible numération plaquettaire peut retarder votre traitement. Votre équipe de soins de santé peut recommander une transfusion sanguine.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous avez des signes de saignement. En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Less Common Side Effects (10 to 24 out of 100 people)	
Side effects and what to do	When to contact health care team
Si vous avez des signes de saignement : • Si vous saignez un peu, nettoyez la zone au savon et à l'eau ou à l'aide d'une solution saline de rinçage. Exercez une pression sur la zone de saignement pendant au moins 10 minutes. Si vous avez un saignement grave (très abondant) ou qui ne s'arrête pas, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	
Syndrome de différenciation (Observé chez certains patients recevant un traitement pour la LMA) Quels signes sont à surveiller? • Les symptômes peuvent inclure : ◦ de la fièvre; ◦ de la toux; ◦ de la difficulté à respirer; ◦ une éruption cutanée; ◦ une diminution de la miction; ◦ des étourdissements; ◦ une prise de poids rapide; ◦ une enflure de vos bras ou de vos jambes. Que faire? • Si votre équipe de soins de santé vous fournit une carte d'alerte, gardez-la sur vous en tout temps. Elle vous donne des renseignements, à vos professionnels de la santé et à vous-même, sur le syndrome de différenciation et ses symptômes. Montrez cette carte aux professionnels de la santé participant à vos soins afin qu'ils sachent que vous prenez de l'ivosidénib. • Si vous présentez des symptômes du syndrome de différenciation, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	Si vous présentez des symptômes du syndrome de différenciation, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe de soins pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Less Common Side Effects (10 to 24 out of 100 people)	
Side effects and what to do	When to contact health care team
Douleurs ou crampes abdominales Quels signes sont à surveiller? • Douleurs ou crampes abdominales. • La constipation et la diarrhée peuvent causer des douleurs abdominales. Que faire? • Si la douleur est intense, s'aggrave ou ne disparaît pas, discutez à votre équipe de soins de santé des autres causes possibles.	Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Nombre de globules blancs supérieur à la normale dans le sang (Observé chez certains patients recevant un traitement pour la LMA) • Vous pourriez avoir un nombre plus élevé de globules blancs dans le sang. Cela peut se produire dans les premières semaines de traitement et peut durer quelques semaines. • Votre équipe de soins de santé effectuera une analyse sanguine pour vérifier votre nombre de globules blancs avant et pendant votre traitement. Quels signes sont à surveiller? • Un nombre élevé de globules blancs ne provoque habituellement aucun symptôme. • Dans de rares cas graves, vous pourriez présenter : ◦ de la fièvre; ◦ des problèmes respiratoires; ◦ un mal de tête grave; ◦ des changements au niveau de la vue. Que faire? • Dans de rares cas, un médicament pourrait vous être administré pour traiter un nombre élevé de globules blancs. Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès maintenant si vous présentez des symptômes graves. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès maintenant si vous présentez des symptômes graves. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe de soins pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé contre le cancer ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- rythme cardiaque irrégulier, douleurs thoraciques ou évanouissement;
- nouvelle douleur, engourdissement ou picotement dans vos mains ou pieds; difficultés à accomplir des tâches (comme boutonner des vêtements, écrire, marcher);
- ballonnement, sensation de plénitude ou gonflement de l'abdomen, prise de poids inhabituelle (observés chez les patients atteints de cholangiocarcinome);
- un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit (observés chez les patients atteints d'un cholangiocarcinome).

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

October 2025 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.