

# lapatinib

**Prononciation:** la-pa-ti-nib

**Autre nom(s):** Tykerb<sup>MD</sup>

**Présentation:** comprimé ovale

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.  
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

## Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : \_\_\_\_\_

Pendant la journée, je dois m'adresser à : \_\_\_\_\_

Soirs, fins de semaine et jours fériés : \_\_\_\_\_

## Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

Pour le traitement du cancer du sein

## Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- des troubles cardiaques (notamment des antécédents familiaux, des irrégularités des pulsations cardiaques ou des évanouissements);
- des niveaux de sodium et de potassium dans le sang bas;
- des troubles pulmonaires ou hépatiques;
- une diarrhée récente;
- des allergies.

Avant de commencer le traitement au lapatinib, assurez-vous que votre équipe de soins de santé vous donne des instructions pour la gestion de la diarrhée. Cela peut inclure des instructions sur la manière de prendre des médicaments comme le lopéramide. Il est important de traiter la diarrhée dès son apparition.



### N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

## Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est pris par voie orale une fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé comment et quand vous devez prendre votre médicament.
- Avalez le comprimé en entier avec un grand verre d'eau à jeun, au moins une heure avant ou au moins une heure après un repas faible en matières grasses.
- Vous pouvez avoir besoin de plus d'un comprimé pour parvenir à la dose correcte. Assurez-vous de compter le numéro de comprimés nécessaires pour obtenir la bonne dose.
- Si vous manquez une dose, prenez votre dose prévue au jour suivant. Ne doublez pas la dose pour compenser celle que vous avez oubliée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous devez faire.

**Mise en garde:** Si vous prenez trop de ce médicament, par accident, ou si vous soupçonnez un enfant ou un animal de compagnie d'avoir ingéré votre médicament,appelez immédiatement le centre antipoison de l'Ontario au 1 800 268-9017.

## Autres médicaments qui pourraient être administrés avec ce traitement

### Traitement de la diarrhée

Ce médicament peut causer de la diarrhée, ce qui désigne des selles molles (liquides) ou que à un besoin plus fréquent de se rendre à la selle.

Vous vous verrez prescrire un médicament appelé lopéramide (Imodium<sup>MD</sup>) pour vous aider à traiter votre diarrhée. Prenez ce médicament uniquement si vous en avez besoin.

Gardez toujours votre lopéramide à portée de main. Lorsque la diarrhée commence, prenez immédiatement ce médicament.

Demandez à votre équipe de soins de santé comment vous devez prendre ce médicament.

## À FAIRE pendant le traitement

- ✓ CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale.
- ✓ PROTÉGEZ votre peau du soleil. Portez une chemise à manches longues, un pantalon et un chapeau. Appliquez une protection solaire contre les UVA et UVB avec un indice FPS d'au moins 30. Votre peau pouvant être plus sensible au soleil, cela pourrait donc précipiter l'apparition de gros coups de soleil ou d'éruption cutanée.

## À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- ✗ N'UTILISEZ PAS de produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- ✗ NE PRENEZ PAS d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre (sans ordonnance) ou des substances, ou bien des produits de santé naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ NE COMMENCEZ PAS de traitement complémentaire ou alternatif, comme de l'acuponcture ou des médicaments homéopathiques sans consulter votre équipe de soins de santé.
- ✗ NE MANGEZ PAS et NE BUVEZ PAS de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement. Ils peuvent accroître la quantité de médicament dans votre sang et augmenter les effets secondaires.

## Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Oui, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments, médicaments traditionnels et produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer de graves effets secondaires.

Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :

- médicaments délivrés sur ordonnance et en vente libre (vendus sans ordonnance);
- autres drogues et substances, comme le cannabis/la marijuana (à titre médical ou récréatif);
- produits de santé naturels tels que les vitamines, les tisanes, les médicaments homéopathiques et les autres compléments, ou les médicaments traditionnels.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'usage de l'un de ces produits.



### Consultez votre équipe de soins de santé AVANT de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup> ou Motrin<sup>MD</sup>), le naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol<sup>MD</sup>)
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Médicaments traditionnels
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues et substances, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

## Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
  - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
  - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

### Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
    - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps
- OU
- 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



### Si vous avez de la fièvre :

- ✓ **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

**Si vous n'avez pas de fièvre**, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous. **L'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>)** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



**Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), du naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin<sup>MD</sup>).** Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

## Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

**Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :**

- Comment ce médicament pourrait influer sur votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament pourrait influer sur votre capacité à avoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce médicament peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** simultanément pendant au moins **1 semaine** après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- Vous ne devez pas prendre de contraceptifs hormonaux (p. ex., des pilules contraceptives) à moins que votre équipe de soins de santé vous informe que cette méthode est sûre. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les solutions contraceptives les plus efficaces pour vous.
- N'allaitez pas pendant ce traitement et pendant au moins **5 jours** après votre dernière dose de ce médicament.

## Comment dois-je conserver et manipuler les médicaments de ce traitement en toute sécurité?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

### Comment toucher votre médicament oral contre le cancer en toute sécurité?

#### Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.
- Avalez chaque pilule en entier. Ne l'écrasez pas et ne les mâchez pas.

#### Si vous êtes un aidant :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas touché le médicament.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.
- Ne touchez pas les médicaments oraux contre le cancer si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

### Que faire si le médicament entre en contact avec votre peau ou vos yeux?

#### En cas de contact avec la peau :

- Lavez votre peau avec beaucoup d'eau et de savon.
- Si votre peau rougit ou devient irritée, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

#### En cas de contact avec les yeux :

- Rincez immédiatement vos yeux à grande eau. Laissez l'eau s'écouler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

## Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du lapatinib. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez du lapatinib.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Diarrhée</b></p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p><b>Quels signes sont à surveiller?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou semaines suivant votre traitement.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Si vous avez la diarrhée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé.</li> <li>Ne mangez pas d'aliments ou de boissons contenant des édulcorants artificiels (comme du chewing-gum ou des boissons « diet »), du café et de l'alcool, jusqu'à ce que votre diarrhée ait cessé.</li> <li>Mangez plusieurs repas légers au lieu de deux ou trois gros repas.</li> <li>Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins.</li> <li>Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, un procédé appelé réhydratation par voie orale.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 heures de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de 7 fois par jour).

<b>Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)</b>	
<b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>	<b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 heures de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de 7 fois par jour).</li> </ul> <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la <a href="#">diarrhée</a> pour de plus amples renseignements.</p>	

<b>Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)</b>	
<b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>	<b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>
<p><b>Éruption cutanée, peau sèche et démangeaisons</b></p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p><b>Quels signes sont à surveiller?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certaines zones de votre peau pourraient être rugueuses, craquelées ou peler.</li> <li>Vous pourriez voir apparaître des rougeurs et avoir une sensation de chaleur, comme après un coup de soleil.</li> <li>Vous pourriez avoir des sensations de démangeaisons, de brûlures, de piqûres ou de sensibilité extrême au toucher.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Prévention et traitement de la peau sèche :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un soin hydratant sans parfum.</li> <li>Protégez votre peau du soleil et du froid.</li> <li>Appliquez une protection solaire contre les UVA et UVB avec un indice SPF de 30 ou plus.</li> <li>Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buvez chaque jour 6 à 8 tasses de liquides sans alcool, sans caféine, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins.</li> </ul> <p><b>Dans de rares cas, l'éruption cutanée peut être grave et peut faire cloquer ou peler votre peau. Cela peut aussi entraîner l'apparition de marques ayant parfois l'aspect d'une cible sur votre peau. Si c'est le cas, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</b></p>	
<p><b>Nausée et vomissements</b></p> <p>(Ces symptômes sont généralement légers)</p> <p><b>Quels signes sont à surveiller?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez également vous sentir étourdi.</li> <li>Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivants votre traitement.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <p><b>Prévention de la nausée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter.</li> <li>Si on vous a donné des médicaments antinauséeux, prenez-les selon ce qui a été prescrit, même si vous n'avez pas envie de vomir.</li> <li>Buvez des liquides clairs et mangez des petits repas légers. Prenez l'air et reposez-vous.</li> <li>Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte.</li> <li>Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool.</li> </ul> <p><b>En cas de nausée ou vomissements :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenez vos médicaments antinauséeux (au besoin) selon ce qui a été prescrit.</li> <li>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur <a href="#">la nausée et les vomissements</a> pour de plus amples renseignements.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.

<b>Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)</b>	
<b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>	<b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parlez à votre équipe de soins de santé si : <ul style="list-style-type: none"> <li>la nausée persiste au-delà de 48 heures;</li> <li>les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.</li> </ul> </li> </ul>	

<b>Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)</b>	
<b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>	<b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>
<p><b>Fatigue</b></p> <p>(Ces symptômes sont généralement légers)</p> <p><b>Quels signes sont à surveiller?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) tous les jours ou presque.</li> <li>Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité.</li> <li>Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin.</li> <li>Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage, ou pour s'occuper des enfants et animaux de compagnie.</li> <li>Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a demandé d'en boire plus ou moins).</li> <li>Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la <a href="#">fatigue</a> pour de plus amples renseignements.</p>	
<p><b>Maux de tête légers</b></p> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenez des médicaments contre la douleur (p. ex., l'acétaminophène), au besoin.</li> <li>Lisez la section ci-dessus : « <b>Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?</b> » avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>), de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), du naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui nécessite un traitement ou agraver votre risque d'hémorragie.</li> </ul> <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la <a href="#">douleur</a> pour de plus amples renseignements.</p> <p><b>Si vous présentez soudainement des maux de tête graves, obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</b></p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
<p><b>Perte de la densité capillaire ou chute des cheveux</b></p> <p><b>Quels signes sont à surveiller?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vos cheveux pourraient commencer à être plus fins ou à tomber pendant ou après le traitement.</li> <li>Dans la plupart des cas, vos cheveux repousseront après le traitement, mais la texture ou la couleur peuvent changer.</li> <li>Dans de très rares cas, la perte des cheveux peut être permanente.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez une brosse douce.</li> <li>Évitez les vaporiseurs capillaires, décolorations, colorations et permanentes.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela vous perturbe.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p><b>Manque d'appétit</b></p> <p><b>Quels signes sont à surveiller?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perte d'intérêt dans la nourriture ou absence de sensation de faim.</li> <li>• Perte de poids.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez de manger vos aliments préférés.</li> <li>• Mangez des petits repas tout au long de la journée.</li> <li>• Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids.</li> <li>• Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit.</li> </ul> <p>Voir notre brochure sur la <a href="#">perte d'appétit</a> pour de plus amples renseignements.</p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
<p><b>Changements des ongles</b></p> <p><b>Quels signes sont à surveiller?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La couleur de vos ongles pourrait changer, ou vous pourriez ressentir de la douleur, avoir les cuticules enflées, ou constater un décollement des ongles.</li> <li>• Vos ongles reviendront progressivement à la normale après la fin du traitement.</li> </ul> <p><b>Que faire?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydratez vos ongles et cuticules.</li> <li>• N'utilisez pas de vernis à ongles ni de faux ongles jusqu'à ce que vos ongles aient retrouvé leur état normal.</li> <li>• Portez des gants pour les tâches ménagères ou le jardinage.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

**D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.**

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- jaunissement de la peau ou des yeux, urines inhabituellement sombres ou douleur abdominale du côté droit;
  - irrégularité des pulsations cardiaques, pertes de connaissance ou gonflements des jambes, des chevilles et du ventre;
  - douleur thoracique, difficulté à respirer ou toux comportant du sang;
  - signes d'allergie comme de la fièvre, des démangeaisons, une éruption cutanée, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement dans la poitrine ou dans la gorge;
  - ecchymoses ou saignements inhabituels;
  - fièvre (température orale de 38,3 C/100,9 F) ou plus en tout temps, OU 38 C (100,4 F) ou plus pendant au moins une heure, frissons, sensation de chaleur ou de malaise.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

## Remarques

September 2025 Updated/revised information sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*