

Fiche d'information sur les médicaments

leuprolide (leu-pro-li-de)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): À action brève : Lupron^{MD}; à action prolongée : Lupron Depot^{MD}, Eligard^{MD}

Présentation: suspension ou solution pour injection.

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement du cancer de la prostate et du sein.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement des troubles cardiaques (notamment une irrégularité des pulsations cardiaques), une anémie (baisse du nombre de globules rouges), le diabète, une perte ou un amincissement du tissu osseux, des convulsions, ou si vous avez des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- Cette mesure ne s'applique peut-être pas directement dans votre cas, mais la prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocif pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément pendant la prise de ce médicament.** Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez ce médicament.

- Effets sur la fertilité: Probable

Comment ce médicament est-il donné?

- Eligard^{MD} est injecté sous la peau par votre médecin ou votre infirmière.
 - Lupron Depot^{MD} (à action prolongée) est injecté dans un muscle par votre médecin ou votre infirmière.
- Lupron^{MD} (à action brève) est injecté sous la peau, généralement par vous-même ou votre soignant.
- Des schémas posologiques variables sont utilisés. Consultez votre spécialiste des soins de santé pour savoir à quelle fréquence ce médicament vous est administré.
- N'oubliez pas de rendre visite à votre médecin pour vos injections répétées. Parlez à votre spécialiste des soins de santé pour savoir quels sont les médicaments et les accessoires que vous devez apporter lors de votre prochaine visite.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Pour les douleurs légères :
 - Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - Avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), parlez-en à votre équipe de soins de santé étant donné que ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.
 - Si vous prenez régulièrement de l'aspirine, par exemple en raison d'un trouble cardiaque, vous ne devez pas cesser de le faire sans en parler tout d'abord à votre équipe de soins de santé.
 - Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre. **Téléphonez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison aucun médicament non utilisé. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.
- Suivez les instructions de stockage tel qu'indiqué sur l'emballage.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires courants surviennent généralement chez plus d'un patient sur dix. D'autres effets secondaires sont moins courants mais ils peuvent être graves. Vous pourrez ne pas présenter tous les effets secondaires indiqués ci-après.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p>Réactions au site d'injection (rougeurs, démangeaisons, bleus, légères éruptions cutanées ou enflure)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elles sont généralement légères et disparaissent après quelques jours. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Mal de tête, douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin, en suivant ses instructions. • Autrement, prenez de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) au besoin pour les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou pharmacien quelle est la dose appropriée dans votre cas. • Reposez-vous souvent, mais de l'exercice léger est possible. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Enflure légère des bras et des jambes; gonflement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surélever les pieds lorsqu'en position assise. Adopter un régime faible en sel. • Éviter les vêtements trop ajustés. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se reposer souvent, faire une sieste au besoin. Se déplacer lentement au lever. • Manger des repas équilibrés et boire beaucoup de liquides. L'exercice 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
léger peut aider. <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas conduire un véhicule motorisé ni opérer de machinerie lourde si vous vous sentez fatigué. 	
Éruptions cutanées <ul style="list-style-type: none"> • Évitez le soleil; appliquez une crème solaire, portez un chapeau et couvrez la peau exposée. • Utilisez un hydratant tous les jours. • <i>Une éruption cutanée sévère peut se produire sur le corps/ membres des cloques ou desquamation de la peau, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence.</i> 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Autres symptômes de faibles taux de testostérone <ul style="list-style-type: none"> • Impuissance, baisse de libido • Enflure ou douleurs aux seins • Infections urinaires • Ostéoporose • Les changements d'humeur (par exemple, en sentant déprimé) Augmentation de la transpiration et sensations de chaleur (bouffées de chaleur) <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine (le thé, le café, le cola), le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur. • Faites de l'exercice régulièrement, tenez au frais, habillez-vous avec des vêtements légers, buvez beaucoup d'eau. Peut s'améliorer avec le temps. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Aggravation des symptômes (douleur à l'endroit de la tumeur, douleur osseuses graves, douleur importante au dos, difficultés à uriner ou mauvais contrôle de la vessie ou des intestins) <ul style="list-style-type: none"> • Augmentation des dimensions de la prostate et aggravation des symptômes du cancer qui peut être prononcée. • Ces effets apparaissent généralement au cours des deux premières semaines ou au début du traitement. • Si vous présentez des douleurs osseuses graves, une aggravation des difficultés à uriner, une insensibilisation importante ou des difficultés à faire des mouvements, téléphonez immédiatement à votre médecin. 	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
Problèmes de foie	Obtenez soins

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
(sensibilité du côté droit de l'abdomen, jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée)	médicaux d'urgence sans délai
Problèmes cardiaques (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure des jambes/chevilles/ventre, essoufflement)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Blocage d'une artère (vaisseau sanguine) dans le cœur, le cerveau, la poitrine, l'abdomen ou les membres. Le blocage peut entraîner un accident vasculaire cérébral (perte soudaine de la vue, de la parole ou de l'usage des membres) ou une crise cardiaque (douleurs dans la poitrine, essoufflement) ou des douleurs dans la poitrine, l'abdomen ou les membres	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Problèmes cardiaques (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure des jambes/chevilles/ventre, essoufflement)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Hémorragie dans le système digestif (Porter attention à la présence de sang rouge ou semblable à des grains de café dans les vomissements, ou à la présence de sang rouge ou noir semblable à du goudron dans les selles)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Obstruction intestinale (intense douleur au ventre, ballonnements, grave constipation)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Changements d'humeur (peuvent être sévères) <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de parler avec la famille et les amis. Continuez de bien vous alimenter, de faire de l'exercice et garder de bonnes habitudes de sommeil. • Parlez-en à votre médecin si cela dure plus de deux semaines ou si vous avez des pensées suicidaires 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Problèmes pulmonaires (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Convulsions	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/infomed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.

August 2016

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
Un caillot sanguin (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Glycémie élevée (soif accrue et besoin fréquent d'uriner) <ul style="list-style-type: none"> • Mesurez votre glycémie si vous êtes diabétique. 	Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)
Réaction allergique (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge; peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Douleur aux os; Perte osseuse	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
Saignement ou problèmes de flux sanguin de (dans) la glande pituitaire (Mal de tête sévère soudain, changements de vision, perte de conscience)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.