

Fiche d'information sur les médicaments

irinotecan liposomal (i-RIN-o-te-can lip-o-SOM-al)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Onivyde®

Présentation: suspension mélangé dans les (plus) grands sacs de liquides

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement du cancer du pancréas en combinaison avec d'autres médicaments.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Informez votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez déjà eu des troubles de santé importants, comme :
 - ◊ des problèmes hépatiques, cardiaques ou pulmonaires;
 - ◊ si vous prenez d'autres médicaments;
 - ◊ si vous avez des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a **un risque** que vous-même ou votre partenaire puissiez être enceinte, vous devez:
- ► **Vous devez utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer d'utiliser des méthodes de contraception pendant au moins **1 mois (pour les femmes) ou 4 mois (pour les hommes)** après votre dernière dose, sauf indication contraire de votre équipe de soins de

santé. Pour choisir les meilleures méthodes pour vous ou votre partenaire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

- Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez ce médicament ou **1 mois** après le dernier dose.
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine.
- Votre médecin peut vous conseiller de prendre le lopéramide (Imodium™) pour diarrhée tardive.
- Dans ce cas, assurez-vous d'avoir une réserve de lopéramide disponibles, car la diarrhée doit être traitée dès que possible.
- Votre équipe de soins de santé peut vous demander de suivre les instructions pour le lopéramide (Imodium™):
 - ◊ Pour **diarrhée tardive (plus de 24 heures après votre dose)**, au premier signe de selles molles ou lorsque les selles sont plus fréquentes que d'habitude, **prenez 2 comprimés (4 mg) immédiatement, puis prenez 1 comprimé (2 mg) toutes les 2 heures. Pendant la nuit, vous pouvez prendre 2 comprimés (4 mg) toutes les 4 heures.**
 - ◊ Continuez de prendre le lopéramide jusqu'à ce que votre diarrhée ait arrêté pendant 12 heures

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez manger ou boire de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement pour ne pas accroître les effets secondaires.
- Pour les douleurs légères:

- Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie.
 - Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
 - Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre l'un de ces médicaments. Ils peuvent masquer la fièvre.
 - **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)	
<p>Diarrhée (apparition tout au début et d'autres effets secondaires apparaissant):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparaît pendant la perfusion ou au plus tard un jour après • D'autres symptômes incluent la transpiration excessive, des crampes abdominales, le nez qui coule, yeux larmoyants, plus de salive dans la bouche, le visage ou le cou rinçage ou élèves repérées. • Parlez-en tout de suite à votre équipe de soins de santé si cela se produit. Ces symptômes peuvent être contrôlés par l'administration de médicaments. <p>Diarrhée (apparition tardive; peut être grave):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commence un ou plusieurs jours après l'administration de votre dose. • Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit. • Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p> <p>Si la diarrhée dure/persiste plus de 24 heures tout en prenant des</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)	
<p>gomme à mâcher, boissons « diète », café et alcool).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas. • Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale. <p>Voir la fiche Diarrhées pour en savoir davantage.*</p>	<p>médicaments d'antidiarrhée, ou si vous avez de la fièvre demandez l'aide de secours d'urgence tout de suite.</p>
<p>Nausées et vomissements</p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement. Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter lorsqu'elles surviennent.</p> <p>Pour prévenir les nausées:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool. <p>Si vous avez des nausées ou des vomissements:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé. <p>Voir également la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.*</p>	<p>Veillez communiquer avec votre équipe de soin de santé si les nausées durent plus de 48 heures ou si vous vomissez plus de 24 heures.</p>
<p>Anomalie des épreuves du foie faites en laboratoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Parlez-en alors à votre équipe de soins de santé. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
<p>Déséquilibre en sel</p> <p>Cet effet peut provoquer des contractions musculaires, un état de faiblesse grave, des crampes, des épisodes de confusion et une irrégularité des pulsations cardiaques.</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p>Manque d'appétit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez ne pas avoir envie de manger ou perdre du poids. • Essayez de manger les aliments que vous aimez et de prendre de petits repas pendant toute la journée. • Vous devrez peut-être prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids corporel. • Si vous manquez d'appétit, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Voir également la fiche Manque d'appétit pour en savoir davantage.* 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux. • Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage). • Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué. <p>Voir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.*</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)	
<p>Amincissement ou perte des cheveux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servez-vous d'une brosse douce et évitez les fixatifs, les décolorants, les teintures et les permanentes. • Dans la plupart des cas, vos cheveux repousseront après le traitement, mais leur texture ou leur couleur peut changer. 	
<p>Saignements ou bleus inhabituels</p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p>Fièvre, frissons, infection</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie, procédure médicale ou avant d'aller chez le dentiste. <p>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche « Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) »</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p>Caillot sanguin</p> <p>Les caillots sanguins peuvent provoquer des douleurs, un gonflement et un durcissement de la veine dans la région du corps qui est touchée.</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai</p>

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/infomed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.

October 2017

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)	
<p>Le caillot sanguin peut être plus grave et obstruer une artère ou une veine (vaisseaux sanguins) et provoquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un caillot sanguin dans vos poumons : vous pouvez commencer à tousser, avoir de la difficulté à respirer, présenter des douleurs dans la poitrine ou cracher du sang • Un caillot sanguin dans votre cerveau (AVC) : vous pouvez avoir de la difficulté à voir, à parler ou à vous servir de vos bras et de vos jambes. • Un caillot sanguin dans votre coeur (crise cardiaque) : vous pouvez éprouver des douleurs dans la poitrine, être essoufflé et présenter des douleurs dans le ventre ou les bras. 	
<p>Ulcération de la bouche</p> <p>Vous pourrez présenter des ulcérations rondes, douloureuses, blanches ou grises à l'intérieur de la bouche. Elles peuvent apparaître sur la langue, les lèvres, les gencives ou à l'intérieur de vos joues. Dans les cas les plus graves, elles peuvent entraîner des difficultés à avaler, à manger ou à se brosser les dents. Elles persistent généralement une ou deux semaines.</p> <p>Pour prévenir les ulcérations de la bouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez soin de votre bouche en vous brossant les dents délicatement et en utilisant de la soie dentaire. • Rincez-vous souvent la bouche. N'utilisez pas un rince-bouche comportant de l'alcool. • Essayez plutôt un rince-bouche maison • Mélangez 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1 cuillère à thé de sel dans 4 tasses (1 L) d'eau. <p>Si vous avez des ulcérations dans la bouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous constatez l'apparition d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, ou si vous avez des douleurs quand vous avalez. • Évitez les aliments chauds, épicés, acides, résistants ou croquants. Votre médecin pourra vous prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcérations et prévenir les infections. <p>Voir la fiche Soins de la bouche pour en savoir davantage.*</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible</p>

D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:

- difficulté à respirer ou crachats de sang;
- douleur au bas du dos, gonflement, besoin d'uriner moins fréquent que d'habitude et prise de poids inhabituelle;
- signes d'allergie (p. ex., fièvre, rougeurs, démangeaisons, éruptions cutanées, gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, respiration sifflante, oppression dans la poitrine et la gorge).

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.