

# médroxyprogestérone

(med-roxie-pro-JESS-té-rone)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

**Autre nom(s):** Provera®

**Présentation:** comprimé dans plusieurs concentrations, formes et couleurs

## Pourquoi devez-vous prendre ce médicament?

- Pour le traitement de cancer du sein ou de l'endomètre.

## Avant son administration

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez une maladie du foie, des problèmes cardiaques ou oculaires, des saignements vaginaux anormaux, le diabète, ou si vous avez des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque élevé d'apparition d'autres formes de cancer (généralement quelques années plus tard) ou de caillots sanguins. Certains médicaments administrés contre le cancer peuvent accroître ces risques, surtout s'ils sont administrés pendant une période prolongée. Vous devriez discuter avec votre médecin de vos préoccupations à propos de ce médicament.
- Ce médicament contient une petite quantité de lactose. Si vous ne pouvez pas tolérer du lactose, parlez à votre médecin ou pharmacien.

## Grossesse et allaitement

- Medroxyprogesterone peut être nocif pour le fœtus; vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte.
- S'il y a DES RISQUES que vous deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez:
  - ▶ **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous ne devez pas prendre des contraceptifs oraux comme méthode contraceptive si vous êtes traitée en raison d'un cancer du sein. Vous devez continuer d'utiliser des méthodes de contraception jusqu'à **six mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.

- Si vous devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement à l'aide de ce médicament.
- Effets sur la fertilité: Peu probablement

## Comment ce médicament est-il administré?

- Avalez en entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Prenez la dose environ à la même heure à chaque jour
- Si vous oubliez une dose, prenez-la s'il est (au cours) moins de 12 heures de la dose manquée, sautez autrement et prenez votre dose suivante comme programmé. Ne doublez pas la dose pour rattraper la dose oubliée.

## Pendant la prise de ce médicament

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, ce qui peut en réduire l'efficacité ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre médecin et pharmacien connaissent tous les médicaments que vous prenez (vendus avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou avant de cesser de le faire, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Sécurité et conservation

- Conservez ce médicament à la température ambiante, dans son emballage original, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

## Effets secondaires et que faire

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires, et d'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous présentez des effets secondaires inhabituels ou qui vous incommode, parlez-en à votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants</b>	
<p><b>Mal de tête, douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin, en suivant ses instructions.</li> <li>• Autrement, prenez de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>) au besoin pour les</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>

<p>douleurs légères. Demandez à votre médecin ou pharmacien quelle est la dose appropriée dans votre cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reposez-vous souvent, mais de l'exercice léger est possible.</li> </ul>	
<p><b>Douleurs ou crampes au ventre, ballonnements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traitez la constipation ou la diarrhée.</li> <li>• Peuvent avoir d'autres causes; consultez le médecin ou l'infirmière si la douleur est grave, ne disparaît pas ou empire.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b>Enflure légère des bras et des jambes; gonflement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surélever les pieds lorsqu'en position assise. Adopter un régime faible en sel.</li> <li>• Éviter les vêtements trop ajustés.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b>Saignements vaginaux et les symptômes de faibles taux d'oestrogène</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sécheresse vaginale (peut être accompagnée de pertes ou de saignements)</li> <li>• Perte de mémoire</li> <li>• Effets émotionnels (dépression, par exemple); baisse de libido</li> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière si cela vous dérange.</li> </ul> <p><b>Symptômes de faibles taux de testostérone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impuissance</li> <li>• Enflure ou douleurs aux seins</li> <li>• Baisse de libido</li> <li>• Infections urinaires</li> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière si cela vous dérange.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<b>Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères</b>	
<p><b>Blocage d'une artère</b> (vaisseau sanguine) dans le cœur, le cerveau, la poitrine, l'abdomen ou les membres. Le blocage peut entraîner un <b>accident vasculaire cérébral</b> (perte soudaine de la vue, de la parole ou de l'usage des membres) ou une <b>crise cardiaque</b> (douleurs dans la poitrine, essoufflement) ou des douleurs dans la poitrine, l'abdomen ou les membres</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Un caillot sanguin</b> (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Problèmes cardiaques</b> (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure des jambes/chevilles/ventre, essoufflement)</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>

## medroxyprogesterone

<p><b>Réaction allergique</b> (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge; peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament)</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Fractures des os</b> (effet à long terme)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Être à l'affût de toute douleur osseuse intense ou inhabituelle, dont au dos, aux hanches, aux poignets ou à d'autres os.</li> <li>• Votre médecin pourrait mesurer votre densité osseuse régulièrement.</li> <li>• Pour prévenir cela, votre médecin pourrait vous dire de prendre des suppléments de calcium et de vitamine D ou d'autres médicaments prescrits pour traiter l'ostéoporose. Discutez avec votre médecin avant de prendre ces suppléments.</li> <li>• Obtenir des soins médicaux d'urgence si vous avez une fracture osseuse (importante douleur osseuse, incapacité de bouger)</li> <li>• Vous pouvez en savoir davantage sur la santé des os par l'alimentation et les habitudes de vie dans le dépliant sur la Santé des os chez les femmes ménopausées*.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b>Problèmes oculaires</b> (vision trouble ou autre changement inhabituel à la vue)</p>	<p>Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)</p>

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*