

Fiche d'information sur les médicaments

mesna (MES-na)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Marques génériques disponibles, Uromitexan^{MD}

Présentation: Solution transparente incolore

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament?

- Pour prévenir troubles du tractus urinaire ou les dommages à la vessie provoqués par les médicaments contre le cancer cyclophosphamide ou ifosfamide.
- Le mesna n'est pas un médicament contre le cancer.

Avant son administration

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des allergies.

Comment ce médicament est-il administré?

Injection

- Votre infirmière en chimiothérapie injectera le mesna dans l'une de vos veines à des périodes déterminées avant, pendant et après le traitement à l'aide de cyclophosphamide ou d'ifosfamide.

Oral

- On vous demandera peut-être de boire une solution de mesna plutôt que de recevoir une injection. Le mesna doit être pris à des périodes déterminées qui vous seront indiquées par votre médecin. Lisez attentivement les instructions et assurez-vous de bien les comprendre.
- Le mesna peut être pris avec des aliments ou l'estomac vide.
- Pour masquer le goût, chaque dose de mesna peut être mélangée à du jus ou à une boisson au cola immédiatement avant de la prendre. Vous devez prendre la dose au complet.

Pendant la prise de ce médicament

- Assurez-vous que votre médecin et pharmacien connaissent tous les médicaments que vous prenez (vendus avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou avant de cesser de le faire, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

- Si vous avez un diabète et si vous vous servez d'un test des cétones de l'urine pour contrôler votre niveau de glycémie, vous devez être prudent les journées où vous prenez du mesna. Le mesna peut fausser les résultats des tests de cétones. La couleur de la réaction est rouge pourpre plutôt que pourpre.

Sécurité et conservation

- Conservez ce médicament à la température ambiante, dans son emballage original, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

Effets secondaires et que faire

Le mesna ne provoque généralement pas d'effets secondaires. Comme il est administré avec des médicaments chimiothérapeutiques comme la cyclophosphamide ou l'ifosfamide, la majorité des effets secondaires peuvent être reliés à la chimiothérapie. Consultez également les fiches d'information sur la cyclophosphamide et l'ifosfamide.

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous souffrez d'effets secondaires dérangeants et inhabituels, discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p>Goût inhabituel (avec l'usage oral)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mâcher de la gomme ou sucer des glaçons peut aider. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Douleurs ou crampes au ventre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traitez la constipation ou la diarrhée. • Peuvent avoir d'autres causes; consultez le médecin ou l'infirmière si la douleur est grave, ne disparaît pas ou empire. 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration
<p>Diarrhée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir quelques jours à quelques semaines après la dose administrée ou après le début du traitement. • Boire beaucoup de liquides clairs. Éviter les aliments chauds, piquants et frits, les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine et le jus d'orange et de prunes. • Adopter une alimentation faible en fibres (bananes, riz blanc, compote de pommes, rôties faites de pain blanc). • Prendre des médicaments contre la diarrhée si votre médecin vous en donne. • Voir aussi le dépliant sur la diarrhée.* 	Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration

<p>Nausées et vomissements (plus fréquentes avec l'usage oral)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peuvent survenir quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement. • Buvez des liquides clairs et évitez les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Prenez des antinauséux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre médecin. • Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.* 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Sensation qui rappelle la grippe (fièvre, frissons sans signe d'infection comme un mal de gorge, la toux ou éruptions cutanées avec ampoules)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir de quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement. • Ces effets secondaires peuvent disparaître à mesure que votre corps s'habitue au médicament. • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière si ces sensations vous dérangent. • Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (TylenoIMD) au besoin. 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Bouffées de chaleur, rougeur du visage (avec injection)</p>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p>Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons (peuvent être grave dans certains cas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez le soleil; appliquez une crème solaire, portez un chapeau et couvrez la peau exposée. • Utilisez un hydratant tous les jours. • <i>Une éruption cutanée sévère peut se produire sur le corps/ membres des cloques ou desquamation de la peau, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence.</i> 	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
<p>Réactions au site d'injection (rougeurs, démangeaisons, bleus, légères éruptions cutanées ou enflure)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mentionnez ces signes immédiatement à l'équipe soignante dès qu'ils surviennent, puisque le médicament peut endommager ou irriter les tissus s'il s'écoule de la veine pendant l'injection. 	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p>Problèmes oculaires (sécheresse, rougeur, irritation, douleur, larmoiement, sensibilité à la lumière, vision trouble ou autre changement inhabituel à la vue)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez de porter des lentilles de contact quand vous prenez ce médicament 	<p>Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez essayer les gouttes artificielles ou les onguents pour soulager la sécheresse. Communiquez avec votre médecin si cela devient irritant. 	
Palpitations, des étourdissements ou légère baisse de la pression artérielle (avec injection)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
Réaction allergique (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge; peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament)	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.