

nivolumab / relatlimab

Prononciation: nye-VOL-ue-mab / rel-AT-li-mab

Autre nom(s): Opdualag ^{MD}

Présentation: liquide mélangé dans de plus grands sacs de liquide

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

Nivolumab/relatlimab est utilisé pour traiter un type de cancer de la peau appelé mélanome.

Nivolumab/relatlimab est un médicament d'immunothérapie. Pour en savoir plus sur l'immunothérapie, cliquez [ici](#).

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- des maladies immunitaires (telles que la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus),
- des problèmes dans les glandes productrices d'hormones (telles que la thyroïde, l'hypophyse ou les glandes surrénales),
- le diabète,
- des problèmes hépatiques, rénaux ou pulmonaires,
- des infections actives,
- une transplantation d'organe ou de cellules souches, ou
- des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

Ce médicament est injecté par voie intraveineuse (dans une veine). Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître le calendrier de votre traitement.

Si vous avez manqué votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

À FAIRE pendant le traitement

- ✓ **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- ✓ **INFORMEZ** votre équipe de soins de santé si vous présentez ou avez eu une infection grave.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- × **NE CONSOMMEZ PAS** de produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- × **NE PRENEZ PAS** d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre ou des produits de santé naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- × **NE COMMENCEZ PAS** de thérapies complémentaires ou parallèles, comme l'acupuncture ou des médicaments homéopathiques sans en parler à votre équipe de soins.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Il est peu probable que ce médicament interagisse avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments ou des produits de santé naturels, mais informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :

- des médicaments avec ou sans ordonnance, ou toute autre drogue, le cannabis/la marijuana par exemple (à titre médical ou récréatif);
- des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.

Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un de ces traitements.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

OU

 - 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous **DEVEZ** immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé par rapport aux sujets suivants :

- comment ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle
- comment ce traitement pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez simultanément utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** jusqu'à au moins **5 mois** après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaites pas pendant ce traitement et pendant au moins **5 mois** après votre dernière dose.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Nivolumab / relatlimab fait travailler plus fort votre système immunitaire. C'est votre système immunitaire qui se bat contre les infections et votre cancer.

Lorsque votre système immunitaire travaille plus fort, vous pouvez ressentir des effets secondaires dans vos intestins, votre foie, vos poumons, votre peau, vos reins, vos hormones et autres organes.

Ces effets secondaires peuvent être légers ou, dans de rares cas, devenir graves ou mettre votre vie en danger.

Ils peuvent survenir pendant votre traitement ou des semaines ou des mois après la fin de celui-ci.

Les effets à surveiller sont les suivants :

- diarrhée
- nouvelle toux
- problèmes respiratoires
- éruption cutanée
- tout autre symptôme nouveau

Si vous présentez des effets secondaires, parlez-en immédiatement à votre équipe de soins de santé. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement urgent.

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lors d'un traitement par nivolumab / relatlimab. Il les énumère des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lors d'un traitement par nivolumab / relatlimab.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Fatigue Quels sont les signes à surveiller? • Sensation de fatigue ou de manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? • Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) presque tous les jours. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage, ou pour s'occuper des enfants et animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a demandé d'en boire plus ou moins). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.	
Maux de tête, douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères Quels sont les signes à surveiller? • Maux de tête légers • Nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires, ou sensation de douleur généralisée. Que faire? • Prenez des médicaments (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. • Lisez la section ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, j'ai des douleurs, des maux de tête ou je fais de la fièvre ? » avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui nécessite un traitement ou aggraver votre risque d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la douleur pour de plus amples renseignements.	
Éruption cutanée, peau sèche et démangeaisons Quels sont les signes à surveiller? • Vous pourriez voir apparaître des rougeurs et avoir une sensation de chaleur, comme après un coup de soleil. • Vous pourriez avoir des bosses sur la peau, des sensations de démangeaisons, de brûlures, de piqures ou une sensibilité extrême au toucher. Que faire? Prévention et traitement de la peau sèche : • Utilisez un soin hydratant sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez une protection solaire contre les rayons UVA et UVB avec un indice de facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez chaque jour 6 à 8 tasses de liquides sans alcool et sans caféine, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. Dans de rares cas, l'éruption cutanée peut être grave si : • L'éruption couvre plus d'un tiers de votre peau (par exemple, tout le tronc, ou un bras ET une jambe) ou • L'éruption provoque des cloques ou une desquamation de la peau. Si cela se produit, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement aux urgences.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils. Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe de soins pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Diarrhée Quels sont les signes à surveiller? - Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou semaines suivant votre traitement. Que faire? Si vous avez la diarrhée : - Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé. - Évitez les aliments ou boissons avec édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool jusqu'à ce que la diarrhée cesse. - Mangez plusieurs repas légers au lieu de 2 ou 3 gros repas. - Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. - Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire 6 à 8 tasses de liquides par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, procédé appelé réhydratation par voie orale. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la diarrhée pour de plus amples renseignements. Dans de rares cas, votre diarrhée peut être sévère en raison de l'inflammation des intestins si : - Vous avez du sang dans vos selles; - Vous avez plus de 4 selles (faire caca) par jour (si cela n'est pas normal pour vous). Si cela se produit, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement aux urgences.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils. Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe de soins pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Nausées et vomissements (Ces symptômes sont généralement légers) Quels sont les signes à surveiller? • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez également vous sentir étourdi. • Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. Que faire? Pour prévenir la nausée : • Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter. • Si on vous a donné des médicaments antinauséeux, prenez-les selon ce qui a été prescrit, même si vous ne ressentez pas une envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et mangez de petits repas légers. Prenez l'air et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. En cas de nausée ou vomissements : • Prenez vos médicaments antinauséeux (au besoin) selon ce qui a été prescrit. • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure Nausée et vomissements pour de plus amples renseignements. • Parlez à votre équipe de soins de santé si : ◦ la nausée persiste au-delà de 48 heures ◦ les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures	Contactez votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.
Manque d'appétit Quels sont les signes à surveiller? • Perte d'intérêt dans la nourriture ou absence de sensation de faim. • Perte de poids.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez de petits repas tout au long de la journée. • Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids. • Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la perte d'appétit pour de plus amples renseignements.	
Toux et essoufflement Quels sont les signes à surveiller? • Vous pourriez présenter une toux et vous sentir essoufflé. • Les symptômes généralement associés à la toux sont les suivants : ◦ respiration sifflante ou souffle court ◦ écoulement nasal ◦ maux de gorge ◦ brûlures d'estomac ◦ perte de poids ◦ fièvre et frissons • Dans de rares cas, ces symptômes peuvent être graves et associés à une douleur dans la poitrine, à des difficultés respiratoires ou à une expectoration contenant du sang suite à une toux. Que faire? • Prenez votre température pour savoir si vous faites de la fièvre. Lisez la partie ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou si je fais de la fièvre? » • En cas de fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence. • Si vous présentez une toux grave avec une douleur dans la poitrine, avez des difficultés respiratoires ou que vous toussiez du sang, obtenez immédiatement une aide médicale.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, et que vous faites de la fièvre ou avez de graves symptômes, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Changements dans l'activité de la thyroïde Des changements au niveau de la thyroïde peuvent survenir quelques semaines ou quelques mois après votre traitement. Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre activité thyroïdienne de façon régulière à l'aide d'un test sanguin. Quels sont les signes à surveiller? Thyroïde sous-active : • Prise de poids inhabituelle • Manque d'énergie ou sensation de fatigue. • Sensation de froid rapide • Peau sèche, ongles ou cheveux qui se cassent facilement. • Constipation (défécation [caca] moins fréquente qu'à l'accoutumée) Thyroïde hyperactive (rare) : • Perte de poids inhabituelle. • Sentiment d'anxiété, d'irritabilité ou de troubles du sommeil • Transpiration abondante et difficultés à supporter les températures élevées • Augmentation de l'appétit • Selles (caca) plus fréquentes que d'habitude. • Faiblesse (surtout dans les bras et les cuisses) • Battements de cœur rapides ou irréguliers. Que faire? • Votre équipe de soins de santé peut vous prescrire des médicaments pour traiter votre thyroïde sous-active ou hyperactive. Si vous constatez des changements de poids en même temps que l'un des autres symptômes énumérés, parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que possible.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus vite possible (aux heures d'ouverture).

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Changements de couleur de la peau Quels sont les signes à surveiller? - Éclaircissement de la couleur de votre peau. Cela peut se manifester par des plaques (également connues sous le nom de vitiligo). Que faire? - Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Constipation Quels sont les signes à surveiller? - Défécation moins fréquente qu'à l'accoutumée. - Selles dures et petites comme des boulettes. - Nécessité de pousser fort et de faire un effort pour expulser des selles. - Maux ou crampes d'estomac. - Ventre ballonné, sensation de trop-plein ou inconfort. - Fuites de selles liquides. - Éructations et flatulences importantes. - Nausées ou vomissements. Que faire? Prévention de la constipation : - Mangez plus d'aliments riches en fibres comme les fruits à peau, les légumes-feuilles et les céréales entières. - Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquides par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. - Soyez actif. Une activité physique peut vous aider à aller régulièrement à la selle. - Si vous prenez des médicaments opioïdes contre la douleur, demandez à votre équipe de soins de santé si vous pouvez manger plus de fibres.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Traitement de la constipation : Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis 2 à 3 jours, vous aurez peut-être besoin de prendre un laxatif (un médicament qui vous aidera à aller à la selle). Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous pouvez faire. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la constipation pour de plus amples renseignements.	
Infection Quels sont les signes à surveiller? - En cas de sensation de chaleur ou de malaise (par exemple, si vous avez des frissons ou que vous commencez à tousser), vous devez vérifier votre température pour déterminer si vous faites de la fièvre. - Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD} l'acétaminophène, ou Advil^{MD}, ou l'ibuprofène). - Ne mangez pas et ne buvez rien de chaud ou froid juste avant de prendre votre température. Vous faites de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de : 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. Que faire? - Lavez-vous les mains souvent pour prévenir les infections. - Consultez votre médecin avant toute vaccination, opération, intervention médicale ou visite chez le dentiste. - Gardez un thermomètre numérique à la maison pour pouvoir vérifier facilement si vous faites de la fièvre.	Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Si vous faites de la fièvre : Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.	

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez **l'un** des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Pipi plus abondant que d'habitude et sensation de soif intense
- Signes d'allergie comme une éruption cutanée sévère, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement dans la poitrine ou dans la gorge, pendant ou peu après l'administration du médicament

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

February 2025 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.