

Fiche d'information sur les médicaments

oBINutuzumab (oh-bi-nue-too-z-ue-mab)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Gazyva^{MD}

Présentation: Solution mélangée à de plus grands sacs de liquide

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de cancers du sang comme la leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou le lymphome non hodgkinien (LNH) folliculaire.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :
 - ◊ Des troubles cardiaques ou pulmonaires;
 - ◊ Une hépatite ou des troubles hépatiques;
 - ◊ Une infection active ou des antécédents d'infections;
 - ◊ Des allergies.
- Informez-la également si vous prenez d'autres médicaments.
- Si vous prenez des médicaments pour faire baisser votre tension artérielle, votre équipe de soins de santé vous demandera peut-être d'arrêter de les prendre avant votre consultation. Communiquez avec votre équipe de soins de santé.
- Avant de commencer le traitement, votre médecin vous prescrira des analyses de sang pour vérifier si vous avez été exposé au virus de l'hépatite B.
- Les personnes atteintes d'un cancer présentent un risque accru de développer d'autres formes de cancer ou des caillots sanguins. Certains médicaments contre le cancer peuvent augmenter ces risques, en particulier s'ils sont pris pendant longtemps. Parlez de vos préoccupations concernant ce médicament avec votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
janvier 2021 Page 1 of 7

Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- L'administration de ce médicament chez les hommes ou les femmes peut être néfaste pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.
- S'il y a le moindre risque de grossesse, vous et votre partenaire devez simultanément :
- ► **Utiliser deux méthodes contraceptives efficaces** pendant la durée du traitement et pendant **18 mois** après la dernière dose du médicament. Discutez-en avec votre équipe de soins de santé.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement et pendant les **18 mois** après la fin de votre traitement.
- Ce médicament peut nuire à la fertilité (capacité à tomber enceinte).

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine.
- Avant votre traitement à base d'obinutuzumab, des médicaments vous seront administrés pour prévenir toute réaction allergique.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Bien qu'il soit peu probable que d'autres médicaments nuisent à votre traitement, vérifiez que votre équipe de soins de santé est informée de tous les médicaments que vous prenez (avec ou sans ordonnances, tisanes et suppléments). Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un d'entre eux.
- **Pour les douleurs et maux légers et en cas de fièvre légère :**
 - ◊ Si vous vous sentez mal, vérifiez votre température avant de prendre des médicaments contre la douleur ou la fièvre. Ils pourraient masquer la fièvre.
 - ◊ Vous pourriez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - ◊ L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, AAS), y compris l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter ces médicaments.
 - ◊ **Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement au service d'urgence le plus proche.** Consultez la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accentuer les effets secondaires et nuire à l'efficacité de votre traitement. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires suivants ont été observés chez des personnes prenant de l'obinutuzumab en association avec d'autres médicaments de chimiothérapie, donc certains de ces effets peuvent être causés par la chimiothérapie.

Vous pourriez ne pas observer tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Réaction allergique (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des médicaments vous seront administrés pour prévenir ou traiter cette réaction. Cette réaction peut se produire après le premier traitement. • Vous pourriez présenter les symptômes suivants : fièvre, rougeurs de la face et du cou, démangeaisons, éruptions cutanées, gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, respiration sifflante et serrement dans la gorge et la poitrine. • Ces symptômes peuvent survenir pendant votre perfusion ou des heures voire des semaines après l'administration de votre médicament. • Les réactions tardives peuvent inclure les symptômes susmentionnés, mais également des douleurs musculaires et articulaires, l'enflure des ganglions lymphatiques, des douleurs au ventre, des nausées et vomissements ou la diarrhée. 	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Faible numération plaquettaire (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surveillez les signes de saignements (comme des saignements du nez ou des gencives inhabituels) ou des hématomes apparaissant facilement (ce qui est rare). • Dans de très rares cas, des symptômes graves peuvent survenir. Si vous constatez des selles de couleur noire, une urine de couleur rouge ou rose, du mucus rouge ou brun lorsque vous toussiez, des maux de tête intenses et un état de confusion ou des saignements qui ne s'arrêtent pas, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement au service d'urgence le plus proche. <p>Consultez la brochure sur la faible numération plaquettaire pour de plus amples renseignements.</p> <p>Fièvre, frissons, infection (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU • 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. <p>Pendant la chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre numérique chez vous et prenez votre température si vous vous sentez chaud ou mal (p. ex. frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD}, acétaminophène, Advil^{MD} ou ibuprofène). • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou froid juste avant de prendre votre température. • Lavez-vous les mains souvent. • Consultez votre médecin avant toute vaccination, opération, intervention médicale ou visite chez le dentiste. 	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
janvier 2021

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche. Consultez la brochure sur la neutropénie (faible taux de neutrophiles) pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Résultats anormaux aux tests de la fonction hépatique (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela arrive. • Votre médecin pourrait vérifier votre fonction hépatique régulièrement à l'aide d'un test sanguin. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
<p>Résultats anormaux aux tests de la fonction rénale (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez constater un gonflement, une miction faible ou l'absence d'urine, ou une prise de poids inhabituelle. Si vous observez ces signes, téléphonez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche. • Pour éviter les problèmes de vessie ou de rein, buvez beaucoup d'eau ou d'autres liquides. Votre médecin peut vous demander de boire au moins 6 à 8 tasses (2 litres) de liquides par jour lorsque vous recevez votre traitement, sauf indication contraire. • Votre médecin peut vérifier votre fonction rénale régulièrement. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Toux et essoufflement (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Vous pourriez avoir de la toux et un essoufflement sans aucun signe d'infection, comme des maux de gorge ou une congestion nasale.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous rencontrez l'un des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Arythmie cardiaque, essoufflement, pertes de connaissance ou gonflement des jambes ou du ventre;
- Douleur soudaine et intense dans votre poitrine, votre ventre ou votre bras;
- Gonflement ou durcissement d'une veine de votre bras ou jambe;
- Difficultés respiratoires ou présence de sang dans la toux;
- Perte de mémoire, sensation de confusion, perte d'équilibre ou difficulté à bouger les jambes ou les bras;
- Douleurs articulaires et fièvre;
- Douleurs dans le bas du dos, enflure, miction moins importante qu'à l'accoutumée et prise de poids inhabituelle;
- Douleur intense au ventre pouvant irradier dans le dos;
- Apparition d'un deuxième ou d'un nouveau cancer (votre médecin parlera de cela et surveillera cela avec vous).

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.