

Fiche d'information sur les médicaments

octréotide (oc-tré-o-tide)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Marques génériques disponibles, Sandostatin^{MD}, Sandostatin^{MD} LARTM

Présentation: suspension de longue durée – kit LAR; courte durée - la solution incolore disponible en ampoules ou en fioles multidoses

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament?

- Pour contrer divers symptômes comme les diarrhées graves ou les bouffées de chaleur. Ces symptômes peuvent apparaître avec certaines formes de cancer du tractus gastro-intestinal.

Avant son administration

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé important, plus particulièrement des allergies.
- Octreotide peut être nocif pour le fœtus.
- Si vous allaitez, si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez devenir enceinte, dites-le à votre médecin.

Grossesse et allaitement

- Vous ne devez pas prendre octreotide si vous êtes enceinte. S'il y a **DES RISQUES** que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même et votre partenaire devez: ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise d'octreotide. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.

- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement avec octreotide.
- Effets sur la fertilité: Peu probablement

Comment ce médicament est-il administré?

- L'octréotide à **courte durée** est administré par injection sous la peau (auto-administration)
- Le **suspension de longue durée** est administré par injection dans un muscle (par votre médecin ou votre infirmière).
- N'oubliez pas de vous rendre chez votre médecin pour vos injections répétées. Demandez à votre spécialiste des soins de santé quels sont les médicaments et les fournitures que vous devez apporter avec vous lors de votre prochaine visite.

Pendant la prise de ce médicament

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, ce qui peut en réduire l'efficacité ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous de remettre à votre médecin et à votre pharmacien la liste complète de tous vos médicaments et suppléments alimentaires et de leur indiquer tous les changements, ce qui comprend les médicaments vendus avec ou sans ordonnance, les vitamines et les herbes médicinales. Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou supplément, ou avant de cesser de le faire, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sécurité et conservation

- Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, à l'écart de la chaleur, de la lumière ou de l'humidité. Gardez-le au réfrigérateur et ne pas le congeler. L'octréotide à **courte durée** peut être conservé à température ambiante pendant une période maximale de deux semaines.
- Jetez les ampoules partiellement utilisées. Ne pas jeter les médicaments non utilisés à la maison. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient éliminés sans danger.
- Il importe d'éliminer correctement les contenants de médicament, les aiguilles et les seringues. Les ampoules, les aiguilles et les seringues ne doivent jamais être réutilisées. Elles doivent toujours être éliminées dans un contenant résistant aux perforations. Demandez l'aide de votre pharmacien.

Effets secondaires et que faire

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-

être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous souffrez d'effets secondaires dérangeants et inhabituels, discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires les Plus Courants	
<p>Diarrhée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir quelques jours à quelques semaines après la dose administrée ou après le début du traitement. • Buvez beaucoup de liquides clairs. Éviter les aliments chauds, piquants et frits, les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine et le jus d'orange et de prunes. • Adoptez une alimentation faible en fibres (bananes, riz blanc, compote de pommes, rôties faites de pain blanc). • Prenez des médicaments contre la diarrhée si votre médecin vous en donne. • Voyez aussi le dépliant sur la diarrhée.* • Il peut y avoir un excès de matière grasse dans les selles. 	<p>Contactez votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent</p>
<p>Nausées et vomissements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peuvent survenir quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement. • Buvez des liquides clairs et évitez les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. • Prenez des anti-nauséeux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. • Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre médecin. • Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.* 	<p>Contactez votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent</p>
<p>Réactions au site d'injection (rougeurs, démangeaisons, bleus, légères éruptions cutanées ou enflure)</p>	<p>Contactez votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent</p>
Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères	
<p>Problèmes de foie (jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée)</p>	<p>Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence</p>
<p>Hypoglycémie (sensation de faim, tremblements, étourdissements, nervosité, faiblesse, confusion)</p>	<p>Contactez votre médecin si les</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Mesurez votre glycémie si vous êtes diabétique. • De la limonade sucrée, des comprimés de glucose ou des bonbons peuvent vous aider à augmenter la glycémie dans des cas légers. • Si vous êtes confus ou inconscient, votre aidant devra obtenir des soins médicaux d'urgence immédiatement. 	effets secondaires sont graves ou s'ils persistent
<p>Réaction allergique (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament. 	Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence
<p>Malabsorption</p>	Contacter votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent
<p>Problèmes à la vésicule biliaire (douleur et sensibilité intenses en haut du ventre à droite; la douleur peut rayonner jusqu'à l'épaule droite ou au dos, vomissements, jaunissement de la peau ou des yeux)</p>	Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence
<p>Problèmes cardiaques (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure, essoufflement)</p>	Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence
<p>Glycémie élevée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesurez votre glycémie si vous êtes diabétique. 	Contacter votre médecin si les effets secondaires sont graves ou s'ils persistent
<p>Un caillot sanguin (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)</p> <p>Blocage d'une artère (vaisseau sanguine) dans le cœur, le cerveau, la poitrine, l'abdomen ou les membres. Le blocage peut entraîner un accident vasculaire cérébral (perte soudaine de la vue, de la parole ou de l'usage des membres) ou une crise cardiaque (douleurs dans la poitrine, essoufflement) ou des douleurs dans la poitrine, l'abdomen ou les membres</p>	Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence
<p>Problèmes du pancréas (douleur accrue au centre du ventre qui peut irradier au dos, perte d'appétit ou de poids)</p>	Vous avez besoin immédiatement de soins médicaux d'urgence

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.