

Fiche d'information sur les médicaments

pamidronate

 (pa-mi-dro-nate)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Marques génériques disponibles, Aredia^{MD}

Présentation: Gélule rouge-brun

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour soulager les douleurs osseuses et prévenir les fractures dans certains cas de cancer.
- Pour traiter un excès de calcium dans le sang causé par certains types de cancer.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- des troubles rénaux, cardiaques ou oculaires;
- des faibles taux de calcium ou de vitamine D;
- des plaies buccales;
- des problèmes dentaires (y compris le port d'un dentier);
- des allergies;
- ou si vous avez des soins dentaires prévus.

Si vous prenez d'autres médicaments (comme la calcitonine ou d'autres bisphosphonates) pour des problèmes osseux, parlez-en à votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre le pamidronate.

Informez votre dentiste que vous prenez du pamidronate.

N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de la part de votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
février 2024

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur es sujets suivants :

- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre capacité à avoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce médicament peut être nocif pour le fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez simultanément utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** pendant au moins **6 mois** (recommandation générale) après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine. Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître votre régime de traitement.
 - ◊ Il est généralement administré à intervalles réguliers dans les cas de cancer touchant les os, avec ou sans chimiothérapie.
 - ◊ Le pamidronate est généralement administré en une seule dose pour éliminer l'excès de calcium dans le sang.
- Votre médecin pourra vous administrer des liquides complémentaires pour s'assurer que vos reins éliminent correctement l'excès de calcium de votre organisme.
- En vue de prévenir la baisse des concentrations de calcium pendant la prise de pamidronate, votre médecin pourra vous conseiller de prendre des suppléments de calcium et de vitamine D. Ne prenez pas de calcium ou de vitamine D si vous avez ou avez eu des concentrations élevées de calcium dans le sang. Consultez votre équipe de soins de santé avant de prendre ces suppléments.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou d'autres produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments ou des produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer des effets secondaires graves.
- Informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :
 - Des médicaments et toutes les autres drogues, tels que le cannabis/la marijuana (médical ou récréatif) avec ou sans ordonnance
 - Des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments
- Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un d'entre eux.

À FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

Dans de rares cas, certaines personnes peuvent avoir des problèmes de mâchoire, de dents ou de bouche lors de l'utilisation de pamidronate.

- VEILLEZ à dépister tout problème de mâchoire, de dents ou de bouche. Il se peut que vous ayez des douleurs et des gonflements, une mauvaise cicatrisation des plaies buccales, un écoulement inhabituel des gencives, un déchaussement des dents et une sensation d'engourdissement ou de lourdeur dans la mâchoire.
- COMMUNIQUEZ avec votre équipe de soins de santé le plus rapidement possible si vous présentez l'un de ces symptômes.
- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de recevoir des soins dentaires.
- MAINTENEZ une bonne hygiène dentaire et faites des bilans réguliers chez votre dentiste pour prévenir des problèmes de la mâchoire.

À NE PAS FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- NE CONDUISEZ PAS, n'utilisez pas de machines et n'effectuez aucune tâche qui nécessite d'être attentif et vigilant si vous vous sentez fatigué ou somnolent.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du pamidronate. Certains des effets secondaires peuvent être liés à la chimiothérapie étant donné qu'ils sont apparus chez des patients qui prenaient du pamidronate pendant une chimiothérapie.

Ce tableau énumère les effets secondaires, des plus courants au moins courants. Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez du pamidronate.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Maux de tête, symptômes pseudo-grippaux</p> <p>Vous pourriez avoir l'impression d'avoir la grippe pendant environ 2 jours après avoir reçu votre traitement de pamidronate. Ces symptômes pseudo-grippaux ne sont pas nécessairement le signe d'une infection.</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez ressentir des frissons, des maux de tête et des douleurs musculaires. • Vous pourriez ressentir de la fatigue et une perte d'appétit. • Les symptômes peuvent apparaître à tout moment après l'administration de votre traitement. Ils disparaissent généralement lorsque votre corps s'habitue au médicament. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez votre température pour savoir si vous avez de la fièvre. Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de : <ul style="list-style-type: none"> ◦ 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
février 2024

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence. 	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires, ou sensation de douleur généralisée. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. • Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la douleur pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Toux et essoufflement</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez présenter une toux et vous sentir essoufflé. • Les symptômes généralement associés à la toux sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Respiration sifflante; ◦ Écoulement nasal; ◦ Maux de gorge; ◦ Brûlures d'estomac; ◦ Perte de poids; ◦ Fièvre et frissons. • Dans de rares cas, ces symptômes peuvent être graves et associés à une douleur dans la poitrine, des difficultés respiratoires ou une toux contenant du sang. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez votre température pour savoir si vous avez de la fièvre. • Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence. • Si vous présentez une toux sévère avec une douleur dans la poitrine, des difficultés respiratoires ou que vous tousez du sang, obtenez immédiatement une aide médicale. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à joindre votre équipe de soins de santé pour obtenir des conseils, et que vous avez de la fièvre ou des symptômes graves, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.</p>
<p>Perte d'appétit</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perte d'intérêt dans la nourriture ou absence de sensation de faim. • Perte de poids. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez des petits repas tout au long de la journée. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids. • Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. <p>Voir notre brochure sur la perte d'appétit pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Quantité excessive ou insuffisante de sel dans votre corps</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spasmes musculaires, crampes, faiblesse, contractions musculaires ou convulsions. • Arythmie cardiaque, confusion ou changements de la tension artérielle. <p>Que faire?</p> <p>En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	<p>En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>
<p>Douleurs ou crampes d'estomac</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleurs ou crampes dans le ventre. • La constipation et la diarrhée peuvent causer des douleurs au ventre. <p>Que faire?</p> <p>Si la douleur est intense, s'aggrave ou ne disparaît pas, discutez avec votre équipe de soins de santé des autres causes possibles.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Brûlures d'estomac, douleurs gastriques, ballonnements</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleur ou sensation de brûlure au milieu ou en haut de la poitrine. Cette sensation peut s'aggraver en position allongée ou penchée ou lorsque vous avalez. • Goût amer ou acide dans la bouche. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buvez des liquides clairs et mangez des petits repas légers. • Ne mangez pas d'aliments épicés, gras ou acides. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. • Évitez de fumer ou d'être entouré de fumeurs. • Restez debout ou assis après les repas. Ne vous allongez pas. • Élevez la tête de votre lit d'environ 15 à 20 cm (6 à 8 po). Vous pouvez utiliser des oreillers supplémentaires pour cela. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous rencontrez l'un des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Vision floue ou autres changements de la vision;
- Douleur à l'oreille, écoulement de l'oreille, otites récidivantes;
- Rythme cardiaque irrégulier, douleurs dans la poitrine, évanouissement ou gonflement des jambes;
- Douleur dans le bas du dos, enflure, miction moins importante qu'à l'accoutumée et prise de poids inhabituelle;
- Jaunissement de la peau ou des yeux, urines inhabituellement sombres ou douleur abdominale du côté droit;
- Douleur osseuse sévère ou inhabituelle, notamment dans le dos, les hanches et le poignet;
- Signes de réaction allergique : démangeaisons, éruptions cutanées, gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, et serrement dans la gorge et la poitrine;

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
février 2024 Page 8 of 10

- Convulsions;
- Saignements des gencives, saignements de nez inhabituels, apparition d'ecchymoses supérieure à la normale, sang dans les urines ou les selles, saignements importants ou qui ne s'arrêtent pas;
- Sensation de grande fatigue, essoufflement ou faiblesse inhabituelle, teint pâle, mains et pieds froids.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

February 2024 Updated/revised information sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.