

Fiche d'information sur les médicaments

pazopanib (pa-ZO-pa-nib)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Votrient^{MD}

Présentation: comprimé

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de certaines formes de cancer du rein ou des tissus mous

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement:
 - ◊ une maladie cardiaque, des troubles du rythme cardiaque,
 - ◊ une hypertension, des hémorragies ou des troubles de la coagulation,
 - ◊ des troubles de la thyroïde ou du foie,
 - ◊ un diabète,
 - ◊ si vous avez reçu récemment une chirurgie ou si une chirurgie est prévue,
 - ◊ ou si vous avez des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocif pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même et votre partenaire devez:
 - ▶ **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament et pendant **8 semaines** après la fin du traitement (pour les femmes) et pendant **2 semaines** après la fin du traitement (pour les hommes). Les hommes doivent utiliser des condoms lors de leurs activités sexuelles avec des partenaires féminins qui sont ou peuvent devenir enceintes. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement avec pazopanib.
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte).

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est généralement pris une fois par jour, par la bouche.
- Vous ne devez pas couper, broyer ou mastiquer les comprimés, ce qui pourrait accroître les effets secondaires.
- Avalez les comprimés entiers, avec un verre d'eau, l'estomac vide, une heure avant ou deux heures après avoir pris des aliments ou d'autres médicaments. Ne prenez pas les comprimés au moment des repas pour éviter d'accroître les risques d'effets secondaires.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la s'il reste plus de 12 heures avant la dose suivante. Autrement sautez cette dose et prenez votre dose suivante comme prévu. Ne doublez pas la dose pour rattraper la dose oubliée.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Vous ne devez manger ou boire de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement pour ne pas accroître les effets secondaires.
- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.

- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- **Pour les douleurs légères ou la fièvre:**
 - Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre des médicaments pour les douleurs ou la fièvre. Ils peuvent masquer la fièvre.
 - Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
 - L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
 - **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison aucun médicament non utilisé. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 personnes sur 100)	
<p>Diarrhées</p> <p>Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement.</p> <p>Si vous avez des diarrhées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit. • Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. gomme à mâcher, boissons « diète », café et alcool). • Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas. • Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale. <p>Voir la fiche Diarrhées pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Concentration élevée ou faible de sucre dans le sang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez avoir soif et uriner plus souvent. • Votre médecin pourra contrôler la concentration de sucre dans votre sang. On vous demandera peut-être de modifier votre alimentation ou de prendre des médicaments pour traiter la concentration élevée de sucre dans votre sang. • Vérifiez périodiquement la concentration de sucre dans votre sang si vous avez un diabète. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible.</p>
<p>Tension artérielle élevée (peut être grave)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez périodiquement votre tension artérielle. Votre médecin pourra vous prescrire un médicament pour traiter l'hypertension artérielle. • Si vous avez des maux de tête graves, des étourdissements graves ou si vous perdez connaissance, vous devez recevoir immédiatement des 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 personnes sur 100)	
soins médicaux d'urgence étant donné qu'il peut s'agir d'un signe que votre tension artérielle est trop élevée ou trop faible.	
<p>Changements de la couleur des cheveux ou de la peau (généralement un éclaircissement)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La coloration revient à la normale après la fin du traitement 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela vous perturbe.
<p>Concentrations anormales des enzymes pancréatiques (lipase, amylase)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin pourra contrôler périodiquement ces concentrations à l'aide d'une analyse sanguine. • Si vous avez des douleurs dans l'abdomen, communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.
<p>Nausées et vomissements (généralement légers)</p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement.</p> <p>Si vous avez des nausées ou des vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool. • Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé. <p>Voir également la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.</p>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.
<p>Changements dans l'activité de la thyroïde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cet effet peut survenir quelques semaines ou quelques mois après l'administration de votre traitement. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre thyroïde à l'aide d'une analyse sanguine. <p>Activité insuffisante : portez attention à un gain de poids inhabituel qui s'accompagne des effets suivants : sensation de fatigue ou baisse de l'énergie, peau sèche, ongles ou cheveux qui se brisent facilement, sensibilité au froid.</p>	Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 personnes sur 100)	
<p>Déséquilibre en sel</p> <p>Cet effet peut provoquer des contractions musculaires, un état de faiblesse grave, des crampes, des épisodes de confusion et une irrégularité des pulsations cardiaques.</p>	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 personnes sur 100)	
<p>Maux de tête, douleurs légères dans les articulations, douleurs ou crampes musculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (TylenolMD), contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous. • Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (AdvilMD, MotrinMD), du naproxène (AleveMD) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.
<p>Perte d'appétit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez ne pas avoir envie de manger ou perdre du poids. • Essayez de manger les aliments que vous aimez et de prendre de petits repas pendant toute la journée. • Vous devrez peut-être prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids corporel. • Si vous manquez d'appétit, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Voir également la fiche Perte d'appétit pour en savoir davantage. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.
<p>Toux, essoufflement</p> <p>Vous pourrez présenter une toux et vous sentir essoufflé sans aucun signe d'infection, par exemple des maux de gorge ou une congestion nasale.</p>	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 personnes sur 100)	
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux. • Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé. • Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage). • Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué. <p>Voir la fiche Fatigue pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Anomalie des épreuves du foie faites en laboratoire (peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Parlez-en alors à votre équipe de soins de santé. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine. 	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p>Saignements ou meurtrissures inhabituels (peuvent être graves)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vos selles pourront être noires, vous pourrez cracher du sang, votre urine pourra présenter du sang, des taches rouges ou mauves pourront apparaître sur votre peau ou vous pourrez avoir des hémorragies qui ne cessent pas. • Ils peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement. • Ils peuvent être provoqués par la baisse du nombre de plaquettes (type de cellules sanguines). • Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents molle. • Soyez prudent et évitez de vous couper ou de vous blesser. • Avant de recevoir une chirurgie ou de voir un dentiste, consultez votre médecin. • Voir la fiche Baisse du nombre de plaquettes pour en savoir davantage. 	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 personnes sur 100)	
<p>Douleurs ou crampes dans l'abdomen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous souffrez de constipation ou de diarrhées, elles peuvent provoquer des douleurs dans votre abdomen. • Si la douleur est grave et si elle s'accroît ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les autres causes possibles. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.
<p>Étourdissements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourrez vous sentir la tête légère. • En cas d'étourdissements, étendez-vous. • Relevez-vous et déplacez-vous lentement quand vous vous sentirez mieux. • Vous ne devez pas conduire un véhicule moteur ni utiliser de la machinerie si vous vous sentez étourdi. 	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.

D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:

- Douleur, gonflement ou durcissement d'une veine dans un bras ou une jambe
- Maux de tête graves, confusion, perte soudaine de la vue, difficulté à parler ou à bouger vos bras ou vos jambes
- Faiblesse d'un côté du corps
- Douleur sévère soudaine dans le haut du dos, qui monte dans votre cou ou descend dans votre dos, alors que vous ne vous êtes pas blessé
- Douleur dans la poitrine, irrégularité des pulsations cardiaques ou douleur dans les bras
- Difficulté à respirer ou crachats comportant du sang, voix rauque ou éraillée
- Palpitations inhabituelles au niveau de la poitrine ou du ventre
- Douleur grave dans l'abdomen et modification de l'évacuation des selles, difficulté à avaler
- Gonflement du ventre et des jambes, la diminution ou l'interruption du débit urinaire ou un gain de poids inhabituel
- Signes d'une infection, notamment des frissons, une fièvre (vous faites de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est de 38,3°C/ 100,9°F ou plus en tout temps OU de 38,0°C/ 100,4°F ou plus pendant au moins une heure)

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

August 2023 Updated Rare side effects section (Mise à jour de la section « Effets secondaires rares »)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

août 2023

Page 9 of 9