

Fiche d'information sur les médicaments

pegaspargase (peg-AS-par-gase)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Oncaspar^{MD}

Présentation: Solution claire pour injection mélangée à de plus grands sacs de liquide

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de certains types de cancers du sang (p. ex., leucémie aiguë lymphoblastique) ou lymphomes

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :

- des caillots ou des troubles sanguins;
- du diabète;
- des troubles rénaux, hépatiques ou pancréatiques;
- des allergies (ou si vous avez une intolérance à l'asparaginase).

N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de la part de votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce médicament peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez simultanément **utiliser deux méthodes efficaces de contraception** pendant au moins **6 mois** après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- Ce médicament peut réduire l'efficacité de la contraception hormonale, comme la pilule contraceptive. Si vous décidez d'utiliser une méthode de contraception hormonale, pensez à utiliser également une méthode de contraception mécanique ou non hormonale (comme les préservatifs). Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaites pas pendant ce traitement.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans un muscle ou par intraveineuse (dans une veine) Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître votre régime de traitement.
- Si vous avez raté votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

Prévention des réactions allergiques

Avant l'administration de votre premier traitement, des médicaments pourraient être prescrits pour prévenir toute réaction allergique.

Il existe différents types de médicaments pour empêcher les réactions allergiques. Ils sont appelés :

- antihistaminiques (comme la diphenhydramine ou Benadryl^{MD});
- analgésiques/antipyrétiques (comme l'acétaminophène ou Tylenol^{MD});
- bloqueurs H2 (comme la ranitidine ou la famotidine);
- corticostéroïdes (comme la prednisone).

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022

Pour prévenir le syndrome de lyse tumorale (SLT)

Le SLT peut survenir lorsqu'un grand nombre de cellules cancéreuses meurent rapidement et que votre corps ne peut pas s'en débarrasser assez rapidement. Le SLT peut vous rendre très malade. Demandez à votre équipe de soins de santé si vous êtes à risque pour le SLT.

Si vous êtes à risque pour le SLT, vous pouvez recevoir des médicaments avant votre traitement à la pégaspargase pour aider à le prévenir.

Ces médicaments sont appelés anti-uricémiants (comme l'allopurinol), ou autres.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou d'autres produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments ou des produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer des effets secondaires graves.
- Informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :
 - ◊ des médicaments, avec ou sans ordonnance, ainsi que toute autre drogue, telle que le cannabis/la marijuana (médicale ou récréative);
 - ◊ des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.
- Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un de ces produits.

Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments contre la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène [Tylenol^{MD}] ou l'ibuprofène [Advil^{MD}]).
 - ◊ la fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat;
 - ◊ si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir que vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous vous sentez chaud ou mal (p. ex., frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps;
- OU
- 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.

Si vous avez de la fièvre :

- **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous. **L'acétaminophène (Tylenol^{MD})** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.
- **Parlez à votre équipe de soins avant de prendre** de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.
- Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

À FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- **PENSEZ À DEMANDER** à quelqu'un de vous conduire à l'hôpital puis de vous ramener chez vous les jours de traitement. Vous pourriez ressentir une somnolence ou des étourdissements après votre traitement.

À NE PAS FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du pegaspargase. Ce tableau énumère les effets secondaires des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez du pegaspargase.

Effets secondaires (au moins 10 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Troubles hépatiques Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre fonction hépatique à l'aide d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne causent généralement aucun symptôme. Quels signes sont à surveiller? • Dans de rares cas, vous pouvez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Ces signes peuvent être graves. Que faire? En cas de symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence.	Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022

Effets secondaires (au moins 10 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Douleurs ou crampes dans le ventre Quels signes sont à surveiller? • Douleurs ou crampes dans le ventre. • La constipation et la diarrhée peuvent causer des douleurs au ventre. Que faire? • Si la douleur est intense, s'aggrave ou ne disparaît pas, discutez à votre équipe de soins de santé des autres causes possibles.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Diarrhée Quels signes sont à surveiller? • Selles molles, liquides, non moulées pendant les jours ou semaines suivant votre traitement. Que faire? Si vous avez la diarrhée : • Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou recommandé. • Évitez les aliments ou boissons avec édulcorants artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), le café et l'alcool. • Mangez plusieurs repas légers au lieu de deux ou trois gros repas. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. • Parlez à votre équipe de soins de santé si vous n'arrivez pas à boire 6 à 8 tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, un procédé appelé réhydratation par voie orale. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de 7 fois par jour).	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 24 h de prise de médicaments antidiarrhéiques ou si votre diarrhée est aiguë (plus de 7 fois par jour).

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022

Effets secondaires (au moins 10 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la diarrhée pour de plus amples renseignements.	
Hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang) Quels signes sont à surveiller? • Vous pourriez avoir une sensation de soif. • Vous pourriez uriner plus souvent qu'à l'accoutumée. • Vous pourriez vous sentir fatigué ou somnolent. Que faire? • Votre équipe de soins de santé pourrait réaliser une analyse sanguine pour vérifier votre taux de sucre dans le sang (glycémie). • On pourrait vous demander de modifier votre régime alimentaire ou de prendre un médicament pour faire descendre votre glycémie. • Si vous avez du diabète, contrôlez régulièrement votre glycémie. Votre équipe de soins de santé pourrait vous demander de la contrôler plus souvent qu'à l'accoutumée.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus vite possible (aux heures d'ouverture)
Taux d'enzymes du pancréas supérieur à la normale dans votre sang (lipase, amylase) Quels signes sont à surveiller? • Ces changements n'entraînent généralement pas de symptômes. • Dans certains cas, vous pourriez ressentir une douleur au centre du ventre pouvant irradier dans le dos. Que faire? • Votre équipe de soins de santé pourrait réaliser des analyses sanguines pour contrôler vos taux d'enzymes pancréatiques. Si vous présentez des symptômes, obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.	Consultez votre équipe de soins de santé si vous présentez des symptômes. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022

Effets secondaires (au moins 10 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Réactions allergiques Quels signes sont à surveiller? - De la fièvre, des démangeaisons, une éruption cutanée, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement dans la poitrine ou dans la gorge. - Cela peut survenir pendant ou peu de temps après que votre traitement vous a été administré, et peut être grave. Que faire? - Informez immédiatement votre infirmière si vous ressentez des signes de réaction allergique pendant ou juste après votre traitement. - Consultez votre équipe de soins de santé si vous présentez une légère réaction cutanée.	En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence

D'autres effets secondaires rares, mais graves, sont possibles.

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- signes d'infection (par exemple, sensation de malaise, nouvelle toux) ou de la fièvre; vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de 38,3 C (100,9 F) ou plus en tout temps ou 38 C (100,4 F) ou plus pendant au moins une heure;
- selles de couleur noire, ou sang dans les selles, saignements vaginaux abondants, urine de couleur rouge ou rose, ou saignements qui ne s'arrêtent pas;
- confusion;
- perte soudaine de la vue, difficulté à parler ou à utiliser ses bras ou ses jambes;
- douleur thoracique;
- difficulté à respirer, crachats de sang;
- douleur, gonflement et durcissement d'une veine de votre bras ou jambe;
- mal de tête sévère, évanouissement;
- convulsions;
- hallucinations (voir ou entendre des choses qui n'existent pas);
- engourdissement grave, picotements ou sensation de brûlure des doigts, des orteils ou d'autres parties du corps, douleur ou difficulté à bouger;
- douleur soudaine et intense dans le ventre;
- nouvelle douleur au bas du dos avec gonflement, volume d'urine moins important que d'habitude et prise de poids inhabituelle;

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022 Page 8 of 9

- contractions musculaires, faiblesse grave ou crampes;
- rythme cardiaque irrégulier ou rapide.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

December 2022 Updated/revised info sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
décembre 2022