

## Fiche d'information sur les médicaments

## procarbazine (pro-CAR-ba-zine)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

**Autre nom(s):** Matulane<sup>MD</sup>

**Présentation:** Capsules de gélatine

### Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement des lymphomes et des cancers qui prennent naissance dans le cerveau.

### Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez reçu une radiothérapie, si vous souffrez d'alcoolisme ou si vous avez des allergies.
- Procarbazine peut être nocif pour le fœtus.
- Si vous allaitez, si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez devenir enceinte, dites-le à votre médecin.
- Les patients atteints d'un cancer sont exposés à des risques plus élevés de développer d'autres cancers ou des caillots sanguins. De plus, certains médicaments contre le cancer peuvent accroître ces risques. Vous devriez en parler avec votre médecin.

### Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- Vous ne devez pas prendre procarbazine si vous êtes enceinte. S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même et votre partenaire devez: ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de Procarbazine. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement.
- Effets sur la fertilité: Oui

## Comment ce médicament est-il donné?

- Prenez exactement tel que prescrit par votre docteur. Assurez-vous que vous comprenez les instructions.
- Avalez en entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Prenez la dose environ à la même heure à chaque jour
- Vous ne devez pas écraser ni ouvrir les capsules.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la s'il est (au cours) moins de 12 heures de la dose manquée, sautez autrement et prenez votre dose suivante comme programmé. Ne doublez pas la dose pour rattrapper la dose oubliée.

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Il est très important de suivre les restrictions alimentaires pour éviter la nourriture et les boissons contenant de la tyramine, de la caféine et de l'alcool (communiquez avec Télésanté Ontario au 1-866-797-0000 ou consultez un diététicien pour obtenir plus d'information sur le un régime faible en tyramine.
- VOUS NE DEVEZ PAS boire de boissons alcooliques pendant la prise de procarbazine ni pendant une période de 10 à 14 jours après la prise des dernières capsules.

## Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

## Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous souffrez d'effets secondaires dérangeants et inhabituels, discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<b>Cauchemars, hallucinations, confusion, insomnie</b>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas
<p><b>Sensation qui rappelle la grippe</b> (fièvre, frissons sans signe d'infection comme un mal de gorge, la toux ou éruptions cutanées avec ampoules)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut survenir de quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement.</li> <li>• Ces effets secondaires peuvent disparaître à mesure que votre corps s'habitue au médicament.</li> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière si ces sensations vous dérangent.</li> <li>• Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>) au besoin.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas
<p><b>Ulcères buccaux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardez une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les dents régulièrement avec une brosse à soies souples ou une Toothette<sup>MD</sup>.</li> <li>• Utilisez un rince-bouche sans alcool régulièrement, surtout après les repas et au coucher.</li> <li>• Essayez de se rincer la bouche avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude : une demie cuillerée à thé dans une tasse (250 mL) d'eau</li> <li>• Évitez les aliments chauds, épicés, acidulés, durs ou croquants.</li> <li>• Consultez votre médecin ou votre infirmière dès que vous remarquez des ulcères dans la bouche ou sur les lèvres, ou si vous avez du mal à avaler. Votre médecin pourrait prescrire un rince-bouche pour soulager les</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus vite possible

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>ulcères buccaux et prévenir l'infection.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyez également le dépliant sur les Soins buccaux.*</li> </ul>	
<p><b>Saignements ou bleus inhabituels</b></p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p><b>Fièvre, frissons, infection</b></p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU</b></li> <li>• <b>38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure</b></li> </ul> <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons).</li> <li>• Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre.</li> <li>• Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température.</li> <li>• Lavez-vous souvent les mains.</li> <li>• Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie ou avant d'aller chez le dentiste.</li> </ul> <p><b>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre.</b> Pour plus d'informations, consultez la fiche «<a href="#">Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs)</a> ».</p>	<p>Obtenez une aide médicale d'urgence</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

<b>Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)</b>	
<b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>	<b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>
<p><b><i>Nausées et vomissements</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent survenir quelques heures à quelques jours après la dose administrée ou après le début du traitement.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et évitez les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer.</li> <li>• Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte.</li> <li>• Prenez des antinauséux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter.</li> <li>• Communiquez avec votre médecin si les nausées durent plus d'une journée ou s'il y a des vomissements.</li> <li>• Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.*</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas
<p><b><i>Picotement ou engourdissement des orteils ou des doigts, faiblesse</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent revenir lentement à la normale après la fin du traitement.</li> <li>• Communiquez avec le médecin ou l'infirmière si vous avez du mal à attacher des boutons, à écrire, à prendre de petits objets, si vous éprouvez de la douleur, ou bien des ennuis avec le mouvement.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas
<p><b><i>Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sensibilité à la lumière/aux rayons du soleil (ou d'autres rayons avec UV) se produit rarement (les résultats dans les rougeurs sur les régions exposées).</li> <li>• Évitez le soleil; appliquez une crème solaire, portez un chapeau et couvrez la peau exposée.</li> <li>• Utilisez un hydratant tous les jours.</li> </ul>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas

<b>Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)</b>	
<b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>	<b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>
<p><b><i>Problèmes de foie</i></b> (jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée)</p>	Obtenez une aide médicale d'urgence

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

<b>Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)</b>	
<b>Effet secondaire et mesure à prendre</b>	<b>Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé</b>
<b>Réaction allergique</b> (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge)	Obtenez une aide médicale d'urgence
<b>Problèmes pulmonaires</b> (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez une aide médicale d'urgence
<b>Problèmes du pancréas</b> (douleur accrue au centre du ventre qui peut irradier au dos, perte d'appétit ou de poids)	Obtenez une aide médicale d'urgence
<b>Problèmes cardiaques</b> (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure, essoufflement)	Obtenez une aide médicale d'urgence
<b>Un caillot sanguin</b> (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang)	Obtenez une aide médicale d'urgence

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*