

Fiche d'information sur les médicaments

riTUXimab (solution intraveineuse) (rit-tu-xi-mab)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Rituxan^{MD}, Truxima^{MC}, Riximyo^{MC}, Ruxience^{MC}, Riabni^{MC}

Présentation: Solution transparente incolore mélangée dans de plus grands sacs de liquide

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement des cancers du sang, comme le lymphome non hodgkinien ou la leucémie lymphoïde chronique (LLC).
- Le rituximab existe sous forme de médicament biosimilaire. Consultez la brochure sur les [médicaments biosimilaires](#) pour de plus amples renseignements.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :
 - ◊ une maladie rénale ou hépatique (y compris l'hépatite);
 - ◊ une maladie pulmonaire (y compris la tuberculose);
 - ◊ des problèmes cardiaques ou un AVC;
 - ◊ des allergies.
- Il est important de prévenir votre médecin si vous prenez d'autres médicaments. Si vous prenez des médicaments pour faire baisser votre tension artérielle, vous devrez peut-être suspendre la prise d'une dose avant votre visite pour recevoir votre traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé avant de venir.
- Avant de commencer votre traitement, votre médecin peut réaliser une analyse sanguine pour vérifier si vous avez été exposé au virus de l'hépatite B.
- Les personnes atteintes d'un cancer présentent un risque accru de développer d'autres formes de cancer ou des caillots sanguins. Certains médicaments contre le cancer peuvent augmenter ces risques, en particulier s'ils sont pris sur une longue période. Si vous avez des inquiétudes concernant ce médicament, faites-en part à votre équipe de soins.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023 Page 1 of 9

N'oubliez pas de:

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé des sujets suivants :

- Comment ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce traitement pourrait influencer sur votre fertilité (capacité à concevoir un enfant).

Ce traitement peut être nocif pour un enfant à naître. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et pendant un délai de **12 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement et pendant les **6 mois** après votre dernière dose de ce médicament.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est administré par voie intraveineuse.
- Si vous ne ressentez aucun effet adverse grave après la prise du médicament, les doses suivantes peuvent être administrées sur une période plus courte.
- Des médicaments visant à prévenir une réaction vous seront toujours administrés avant votre dose de riTUXimab.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Parlez à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez (avec ou sans ordonnance, produits de phytothérapie et suppléments). Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un de ces traitements.

Pour les douleurs et maux légers et en cas de fièvre légère :

- Si vous vous sentez mal, vérifiez votre température avant de prendre des médicaments contre la douleur ou la fièvre. Ils pourraient masquer la fièvre.
- Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
- L'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, AAS), y compris l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Consultez votre équipe de soins de santé avant de prendre ou d'arrêter ces médicaments.
- **Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement au service d'urgence le plus proche.** Consultez la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accentuer certains effets secondaires et nuire à l'efficacité de votre traitement. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pouvez ne pas présenter l'ensemble des effets secondaires mentionnés. Vous pourriez également présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Réaction liée au médicament</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les symptômes les plus courants comprennent la fièvre, les frissons, les rougeurs, les démangeaisons, les éruptions cutanées, les étourdissements, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, et une sensation de serrement dans la gorge et la poitrine. • Ces symptômes peuvent survenir pendant ou peu après l'administration du traitement. Ils se manifestent généralement pendant l'administration de la première et de la deuxième dose. • Si vous observez l'un de ces symptômes, parlez-en immédiatement à votre équipe de soins de santé. 	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restez actif et essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) tous les jours ou presque. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Mangez bien et hydratez-vous en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre médecin vous a demandé de boire plus ou moins). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué. <p>Consultez la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Communiquez avec votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Nausée et vomissements (symptômes généralement légers)</p> <p>Ces symptômes peuvent survenir dans les heures ou les jours suivant votre traitement.</p> <p>En cas de nausées ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments antinauséux conformément aux prescriptions de votre médecin. • Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé, etc.) et évitez l'alcool. • Consultez votre équipe de soins de santé si les médicaments antinauséux prescrits ne sont pas efficaces contre votre nausée et les vomissements. <p>Consultez la brochure sur la nausée et les vomissements pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Communiquez avec votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>Maux de tête, douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos antalgiques selon ce qui a été prescrit par votre médecin. • Vous pouvez prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) au besoin contre les douleurs et maux légers. Demandez à votre médecin ou pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous. • Parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent augmenter les risques d'hémorragies. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère qui peut aider. 	<p>Communiquez avec votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Faible numération plaquettaire dans le sang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surveillez les signes de saignements (comme des saignements du nez ou des gencives inhabituels) ou des hématomes apparaissant facilement (ce qui est rare). • Dans de très rares cas, des symptômes graves peuvent survenir. Si vous constatez des selles de couleur noire, une urine de couleur rouge ou rose, du mucus rouge ou brun lorsque vous toussiez, des maux de tête intenses et un état de confusion ou des saignements qui ne s'arrêtent pas, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement au service d'urgence le plus proche. <p>Consultez la brochure sur la faible numération plaquettaire pour de plus amples renseignements.</p> <p>Fièvre, frissons, infection (comprend les infections moins courantes qui surviennent lorsque le système immunitaire est affaibli, comme les infections virales)</p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU • 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. <p>Pendant votre traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gardez un thermomètre numérique chez vous et prenez votre température si vous avez chaud ou que vous vous sentez mal (p. ex., frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD}, acétaminophène, Advil^{MD} ou ibuprofène), car ils pourraient masquer la fièvre. • Ne consommez pas de boissons ni d'aliments chauds ou froids juste avant de prendre votre température. • Lavez-vous régulièrement les mains. • Consultez votre médecin avant toute vaccination, opération chirurgicale, intervention médicale ou visite chez le dentiste. 	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.</p> <p>Consultez notre brochure sur la neutropénie (faible taux de neutrophiles) pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons</p> <p>Les éruptions cutanées peuvent être graves dans de rares cas, et faire peler ou cloquer votre peau. Si c'est le cas, vous devez obtenir immédiatement une aide médicale d'urgence.</p> <p>Prévention et traitement de la peau sèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un soin hydratant. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez une protection solaire contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30. 	<p>Communiquez avec votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>Symptômes grippaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez avoir de la fièvre, des frissons et des douleurs musculaires sans aucun signe d'infection, comme un mal de gorge, de la toux ou une éruption cutanée. • Les symptômes peuvent apparaître à tout moment après l'administration de votre traitement. Ils disparaissent généralement lorsque votre corps s'habitue au médicament. • Vérifiez votre température pour vous assurer que vous n'avez pas de fièvre. Si vous n'avez pas de fièvre, vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}) pour vous sentir mieux. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous. Si vous avez de la fièvre, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche. 	<p>Communiquez avec votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023 Page 7 of 9

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fourmillements ou engourdissement des doigts et orteils</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'engourdissement peut s'atténuer petit à petit après la fin de votre traitement. • Communiquez avec votre équipe de soins de santé si vous avez du mal à fermer des boutons, écrire, ramasser de petits objets, vous déplacer ou si vous ressentez une douleur. 	Communiquez avec votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
<p>Tension artérielle basse (hypotension), étourdissements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ces symptômes peuvent survenir lorsque le médicament vous est administré. Si vous observez l'un de ces symptômes, parlez-en immédiatement à votre équipe de soins de santé. • Si vous vous sentez étourdi ou mal, allongez-vous pour éviter de tomber. Levez-vous et commencez à bouger doucement une fois que vous vous sentez mieux. • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez étourdi. 	Communiquez avec votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous constatez l'UN des symptômes suivants, vous devez en parler à votre fournisseur de soins de cancérologie ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- arythmie cardiaque, douleurs dans la poitrine ou pertes de connaissance, enflures;
- essoufflement ou difficultés respiratoires, présence de sang dans la toux;
- douleur, gonflement ou durcissement d'une veine de votre bras ou jambe;
- difficulté à parler ou à bouger, troubles de la mémoire, problèmes de vue, maux de tête intenses ou convulsions;
- maux de ventre soudains et intenses ou ballonnements;
- signes de troubles rénaux comme des douleurs dans le bas du dos, un gonflement dans votre corps, une miction faible ou une absence d'urine, ou une prise de poids inhabituelle récente;
- crampes et contractions musculaires, faiblesse inhabituelle, évanouissements, confusion ou agitation;
- jaunissement de la peau et des yeux, urine rouge foncé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023 Page 8 of 9

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

October 2023 Updated " How will this medication affect sex, pregnancy and breastfeeding" section (Mise à jour de la section « Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement? »)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
octobre 2023 Page 9 of 9