

siltuximab

Prononciation: sil TUX i mab

Autre nom(s): Sylvant^{MD}

Présentation: solution; mélangé dans les (plus) grands sacs de liquides

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

- Pour le traitement de la maladie de Castleman multicentrique chez les adultes qui ne sont pas infectés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH, virus responsable du SIDA) ni par l'herpès-virus humain 8 (HHV-8).

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement:
 - ◊ des infections, y compris des antécédents d'hépatite B, le VIH ou l'herpès,
 - ◊ si vous avez une pression artérielle élevée ou un taux de cholestérol élevé,
 - ◊ ou si vous avez des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament est injecté dans une veine.
- On pourra vous donner un ou plusieurs médicaments avant le siltuximab pour prévenir des réactions

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre médecin et votre pharmacien connaissent tous les médicaments que vous prenez (vendus avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments), plus particulièrement la cyclosporine, le tacrolimus et la warfarine. Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou avant de cesser de le faire, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

OU

 - 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous **DEVEZ** immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous. **L'acétaminophène (Tylenol^{MD})** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a **des risques** que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez:
 - **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de siltuximab. Les pilules contraceptives peuvent être moins efficaces lorsqu'ils sont pris avec siltuximab. Envisager une autre méthode de contraception. Vous devez continuer d'utiliser des méthodes de contraception jusqu'à **3 mois** après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement à l'aide de ce médicament.
- Ce médicament est peu susceptible de réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
Fièvre, frissons, infection (peuvent être graves) Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est : • 38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU • 38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie : • Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons). • Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre. • Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température. • Lavez-vous souvent les mains. • Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie, procédure médicale ou avant d'aller chez le dentiste. Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre. Pour plus d'informations, consultez la fiche « Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs) »	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)	
Diarrhées Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement. Si vous avez des diarrhées : • Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit. • Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. gomme à mâcher, boissons « diète », café et alcool), jusqu'à ce que votre diarrhée ait cessé. • Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas. • Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale. Voir la fiche Diarrhées pour en savoir davantage.*	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Gonflement léger dans les bras et les jambes Pour prévenir le gonflement léger : • Adoptez une alimentation à faible teneur en sel. • Évitez les vêtements serrés. Si vous présentez un gonflement dans les jambes, gardez vos pieds élevés quand vous êtes assis.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 sur 100 personnes)	
Éruptions cutanées, assèchement de la peau, démangeaisons cutanées Les éruptions cutanées peuvent être graves et, dans de rares cas, entraîner la présence de cloques sur la peau ou une desquamation. Si cet effet apparaît, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence. Pour prévenir et traiter l'assèchement de la peau • Utilisez un produit hydratant pour la peau. • Protégez votre peau contre le soleil et le froid • Appliquez un écran solaire offrant une protection contre les UVA et les UVB et un FPS d'au moins 30.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Picotements ou engourdissement dans les doigts et les orteils • Vous pourrez vous rétablir lentement après la fin de votre traitement. • Si vous avez de la difficulté à boutonner vos vêtements, à écrire, à ramasser de petits objets ou si vous avez des douleurs ou des difficultés à vous déplacer, parlez-en à votre équipe de soins de santé.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Nausées et vomissements (généralement légers) Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement. Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter lorsqu'elles surviennent. Pour prévenir les nausées : • Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool. Si vous avez des nausées ou des vomissements : • Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé. Voir également la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage.*	Veillez communiquer avec votre équipe de soin de santé si les nausées durent plus de 48 heures ou si vous vomissez plus de 24 heures.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 sur 100 personnes)	
Transpiration nocturne • Évitez les déclencheurs comme les aliments épicés, l'alcool et la caféine (thé, café et boissons gazeuses). • Faites régulièrement de l'exercice. Avant de faire de nouveaux exercices, demandez à votre équipe de soins de santé quels sont ceux qui sont bons pour vous. • Il peut également être utile de cesser de fumer. • Restez au frais, portez des vêtements légers ou en plusieurs couches que vous pouvez retirer facilement et buvez beaucoup de liquides sauf si on vous a donné des indications contraires.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Douleurs ou crampes dans l'abdomen • Si vous souffrez de constipation ou de diarrhées, elles peuvent provoquer des douleurs dans votre abdomen. • Si la douleur est grave et si elle s'accroît ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les autres causes possibles.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Destruction rapide des cellules au début du traitement • Si cet effet est léger, il peut provoquer de la goutte et des douleurs articulaires. Dans certains cas graves, il peut entraîner de la fièvre, des troubles du rein, des épisodes de confusion et menacer votre vie. • Votre médecin pourra vous prescrire des médicaments pour prévenir ces effets. • Buvez beaucoup de liquides (6 à 8 tasses par jour, sauf indication contraire) et urinez fréquemment.	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
Concentration anormale de cholestérol ou de graisse dans le sang Votre médecin pourra contrôler périodiquement votre concentration de cholestérol à l'aide d'une analyse sanguine.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Déséquilibre en sel Cet effet peut provoquer des contractions musculaires, un état de faiblesse grave, des crampes, des épisodes de confusion et une irrégularité des pulsations cardiaques.	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 sur 100 personnes)	
Tension artérielle élevée • Vérifiez périodiquement votre tension artérielle. Votre médecin pourra vous prescrire un médicament pour traiter l'hypertension artérielle. • Si vous avez des maux de tête graves, des étourdissements graves ou si vous perdez connaissance, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence étant donné qu'il peut s'agir d'un signe que votre tension artérielle est trop élevée ou trop faible.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Saignements ou bleus inhabituels (peuvent être graves) Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.	Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai
Constipation Pour traiter la constipation : • Si vous n'avez pas eu de selles depuis deux ou trois jours, vous devrez peut-être prendre un laxatif. Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous pouvez faire. Voir la fiche Constipation pour en savoir davantage.*	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Anomalie des épreuves rénales en laboratoire • Les signes de trouble rénaux comprennent un gonflement, la diminution ou l'interruption du débit urinaire ou un gain de poids inhabituel. Si vous présentez ces symptômes, communiquez avec votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche. • Afin de prévenir des troubles de vessies ou de reins, votre médecin pourra vous demander de boire au moins 6 à 8 tasses (2 L) de liquide par jour pendant votre traitement, sauf indication contraire. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement votre fonction rénale.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
Effets Secondaires moins courants (10-24 sur 100 personnes)	
Maux de tête, étourdissements, douleurs légères dans les articulations ou les muscles • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin. • Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol^{MD}), contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous. • Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie. • Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave
Anomalie des épreuves du foie faites en laboratoire • Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Si vous présentez ces symptômes, communiquez avec votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche. • Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine.	Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez l'un des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Signes d'une réaction allergique comme une fièvre, des démangeaisons, une éruption cutanée, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue et un sentiment d'oppression dans la poitrine et la gorge
- Essoufflement
- Douleur soudaine grave ou sensation de plénitude dans l'abdomen

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

March 2025 Updated/revised information sheet (Fiche d'information mise à jour/révisée)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.